






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
488/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
488/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
488/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
488/A/1

488⁽¹⁾ A
L XLVIII

16/

Philippus a Felipino
ARS DE DOSIBVS

4653 *— mille & cing*
MEDICINARVM,

ET ALIA

PRAESTANTISSIMORVM

Medicorum monumenta;

**quæ omnia in sequenti
pagina indicantur.**



Accessit & Index locupletissimus in calce Operis.



PATAVII,

Apud Gratosum Perchacinum

M. D. IXXIII.

*Curio me dicit p. Silpionius
a felipino 1528
m. d. i. xiii. i. xiii.
D. Medici*

MATTHAEI CVRTII De Dosibus,
De septimestri partu. De febribus.

FRANCISCI CASSIANI Quæstio de se-
ctione venæ in pleuritide.

BENEDICTI VICTORII Faurentini De
Dosibus,

BARTHOLOMAEI Montagnanæ De
Dosibus.

GVLIELMI RONDALITII De ponderi-
bus, & iusta quantitate medicamentorū.


THOMAE DE GARBO De Reductio-
ne medicinarum ad actum, & de Gradi-
bus earundem.

GRATIOSVS

PERCHACINVS

candido Lectori

S. D.



I Pythagoræ
notissima illa
μετεωρύχως α-
liquam fidem
meretur ve-
rissimilem cer-
tè eā hoc ma-

ximè facit argumentum, cum vi-
deamus hæc nostra tempora, plu-
rimos in varijs artibus viros ita
excellentes, partim habuisse, par-

A 2 tim

~~Summa istius præfationis~~
~~per~~
16578

tim adhuc habere, qui cū ipsis pri-
mis earundem artium inuentori-
bus, iure optimo comparari possint,
quasi horum anima nunc in istorū
corpora transmigrarint. Nolo
autem hic longa serie omnes enu-
merare, tum quod res hac huius
loci non sit, tum quod in immen-
sum nostra cresceret oratio, sed
tantum aliquorum, qui in arte
medica, omnium calculis, ad sum-
mum fastigium, hac nostra ætate,
peruenerunt, breuem faciam men-
tionem. Quid quæso præstantius
desiderari potest, quàm sunt isti
Viri, quorum opuscula typis no-
stris diligenter excussa, candide
Lector, nunc tibi legenda damus?

Si

*Si singulorum meritas laudes enu-
merare vellem, singula volumina
mihi conscribenda essent, nec un-
quam par huic oneri esse possem.
Sat erit aliquid de Curtio hic com-
memorare, quem artem medicam
hoc nostro seculo instaurasse, om-
nes, etiam qui malè de eo sentiunt,
fatentur, cumque Poeta dicat,*

*Non minor est virtus, quàm quærere parta tueri,
Ideo tantum debemus Curtio, qui
collapsam artem medicam instau-
rauit, ac errorum tenebris sepul-
tam iterum in lucem produxit,
atque priori nitori miserè deturpa-
tam restituit, quantum primis il-
lis huius artis authoribus, qui &
fundamenta artis iecerunt, ac tan*

A 3 dem

dem totam artis fabricam pul-
chro ordine construxerunt. Le-
gimus Romanum illum Cur-
tium, quia patriam suam ab hia-
tu illo, sese in eum precipitem dan-
do, liberarit, omnium laudibus ce-
lebratum, & adhuc in hodiernum
usque diem virtus ipsius ab omni
planè macula est immunis. Sic
medica resp. in cælum usque, ut
hunc nostrum Curtium extollat,
est necesse, qui turpissimos tales
hiatus, & fætidus innumeros er-
rores in arte medica agnovit, &
funditus abolevit. Testantur de
hac Curtij excellenti eruditione,
monumenta plurima, tum mor-
tua tū viua, quæ totus orbis nunc
quo-

quoque reuerenter habet & obseruat. In omnium manibus sunt libri à Curtio editi, Doctissimi denique Viri, quos nunc in arte medica adhuc superstites veneramur, omnes ferè ex schola Curtij prodierunt. Hic est equus ille Troianus, ex quo non milites gregarij sed prestantissimi Duces sunt progressi. Hæc est schola ista Pythagoræ, quæ nihil nisi diuina ingenia toti orbi communicauit. Res ipsa loquitur, ideo discipulorum nomina silentio præteribo, præsertim cum sine adulationis suspitione eorum laudes à me decantari non possent, quam tamen procul semperq; à me abesse velim. Hæc de

A 4 Cur-

Curtio breuissimè dicta sufficiant.
Sic nemo est cui Francisci Cassiani
celeberrimum nomen non perue-
nerit ad aures, Omnium ore etiā
prædicatur insignis eruditio Bene-
dicti Victorij Fauentini: Nec de-
nique Bartholomæi Montagnanæ
amplissima fama unquam apud
doctos & bonos interibit. Quid
vero de Rūdalitio hic in medium
adducam? Eruditi aliquot iuue-
nes Germani, qui in schola Mon-
tis Pessulani cum dicto Rundali-
tio familiariter viuentes, intelle-
xerunt ex eo, ipsum nihil in isto
opusculo de dosibus, quod Papiæ
antea excussum fuerat, pro suo
agnoscere, ita ut inde occasionem
sum-

sumpserit, libellum de hoc argu-
mento conscribendi, quem postea
Lugduni, sub patrocinio Episco-
pi Montis Pessulani, edidit. Hunc,
priori isto neglecto, & ipse
tibi, candide Lector, offerre ma-
lui, ut germana ἡ γνήσια, non au-
tem spurij fœtus ex nostra officina
prodirent. Quis vero hic Run-
dalitius sit, omnibus doctis consta-
re scio. Plurimi profecto solo ip-
sius nomine moti, in extremam il-
lam Galliæ oram ad ipsum audien-
dum proficisci non verentur, sicut
nec Galenum, nec eo priores, in
Ægyptum pigritè transcurrere,
ut inde optimis literis onusti ad
suos reuerterentur. Opus de pi-
scibus

scibus à Rundalio editum non-
ne authorem immortalitate dona-
uit? Sed præterea si *Anatomicum*
desideras, hic solertem dabit, in
chirurgia summas apud omnes
meretur laudes, in doctrina sim-
plicium primarijs meritò annume-
rari potest, in morbis denique om-
nibus curandis neminem habet se-
cundum, sicut testantur omnes nō
nisi doctissimi quique ipsius disci-
puli, & testabuntur alij quoq; qui
æqui iudices esse volent. Pellæ ur-
bis nomen obscurum semper man-
sisset, nisi ipsa Alexandrum istum
Regem, qui à rerum suarum ge-
starum magnitudine non Ma-
gnus sed Maximus dici merue-
rat,

rat, genuisset: Ita & Montem
Pessulanum Rundalitiis, alum-
nus gratissimus, apud omnes red-
didit maxime insignem, alioquin
perpetua nocte & silentio inuolu-
tum. Sed nescio quo fastidio mor-
tales presentia bona prosequun-
tur, & ut Poeta inquit,

Virtutem incolumem odimus,
Sublatam ex oculis quærimus inuidi,

Quia fortassis oculi nostri splendo-
re Virtutis excæcati, minus de-
xtrè de ea iudicantes, faciunt ut
tandem in minori apud nos sit exi-
stimatione. Sic quoq; nunc Run-
dalitio sui non desunt æmuli, qui
nomen ipsius calumnijs obscurare
nituntur. Salva tamen semper
Run-

*Rundalitia sua durabit authori-
tas, & illa, quam laboribus suis
acquisuit & adhuc acquirit, im-
marcescibilis gloria, cumque iu-
dicium melius posteritatis erit, ut
Poeta ait, ideo spero & doctam
posteritatē huius Viri nomen gra-
ta semper memoria celebraturam.
Præter hoc novum Rundalitiij opu-
sculum, offero tibi, candide Le-
ctor, nunc & alia duo, antea nun-
quam edita, & à Thoma filio Dy-
ni conscripta, quorum primum
de reductione Medicinarum ad
actum, secundum verò de gradi-
bus earundem, iucundas & uti-
les disputationes & dogmata in
se comprehendunt, sicut melius
ista*

ista à te agnosci quàm à me descri-
bi possunt. Habui autem illa ip-
sa, à doctissimo iuvene Iulio Cæsa-
re Romanello Monopolitano, qui
non inuitus precibus meis, cum
ab ipso hos libellos peterem, locum
dedit. Spontè enim quoque in hoc
unicum incumbit, & occasiones
omnes sedulò inuestigat, ut sibi tan-
dem fenestra de re literaria benè
merendi aperiatur. Hunc ipsius
generosum animum facile agno-
scent omnes, partim ex his duo-
bus opusculis, partim ex alijs plu-
rimis, quæ aliquando ex sua biblio-
theca humano generi communi-
cabit, ut ita & erudita posteritas
eū publica priuatis semper præpo-
sitis-

fuiffe grata cum laude fit celebra-
tura. Hoc te celare nolui, ut scias
quid ex officina Ioannis Baptista
Turlini, Typographi Ticinensis,
primum acceperis, & quid nunc
ex mea tibi offeratur. Quod si hoc
meum studium tibi gratum fuis-
se, & me cum meis conatibus apud
te gratiosum verè esse intellexero,

Munera te dicam magna dedisse mihi,

& sic facies, ut tua erga me be-
nevolentia memor, optimos quosq;
libellos tibi ex officina mea sim pro-
laturus. Bene vale & me, ut
omnes tui studiosos soles, amore
complecti perge.


IOANNIS FRANCISCI

RIPENSIS IN LIBRVM

de ponderibus .

A D D. G. RONDALETIVM

Medicum præstantissimum.



Viderat æquoreis, magnus Neptunus in vndis
Iura prius toto te posuisse freto :
Squammigerumq; genus placidas duxisse per vndas
(Quis puter) ad patuli littora curua soli :
Vt tua, fluminibus neglectis, iussa capebant :
Atque petant nutu, nomina vera, tuo .
Vnde pater tumidum, Neptunus, summus aquarum
Iudicii captus dexteritate boni ,
Consortem pelagi, liquidæ te fecit & vndæ :
Ingenii poterant hæc monumenta tui.
Non satis hæc : iusta terrasque balance gubernas,
Dum monstras Medico pondera certa choro.
Quanta Machaoniis essent discrimina rebus ,
Constaret numeris ni bene fulta suis .
Hæc tibi quæ certam promittit planta salutem,
Corpora neglecto pondere sana necat .
Hanc partem medicæ retulisti primus in artem
Tam bene præteritis non lucubrata viris .
Vt non sollicitè præbentem pharmaca, ne 've
Propositum fallat pendula libra bonum.

Hunc

Hunc vigili doctum relegit qui mente libellum,
Et voluit facili nocte dieque manu:
Ergo dum fluuiis Mugil verlatum in undis,
Astutus mediis & Melanurus aquis.
Atque Altræa vagam librat dum pondere lancem,
Seruet quo placidos, conterat atque reos.
Inclita florebit meritorum fama tuorum,
Qua sol Eois splendet & Hesperiiis.

*Ita . . . Curtio qui Clementia
Pontificia Medicus fuit scribit
Paulus Jovius Lib. 32. Sistorianus
Jocatus, summa libertate nonnullis, gratias
agerent Curtio Medico, qui firma vitam
valetudine, innatis membrorum robore
prævalidum, in multa spe longioris vite
novis præceptis, et commutata vita
ratione dubio procal occidisse crede-
batur:*

MATTHAEI

MATHEI CVRTII^I

AD TYRVNCVLOS

dosandi methodus.



VPIENS dare Iuueni
bus breuem practican-
di modum, decreui ali-
qua de modo dosandi
dicere, circa quæ tria fa-
ciam: Primo dicam de
modo dosandi syrupos:
Secundo dicam de dosi
medicinarum simpliciũ
solutiuarum & compo-
sitarum: Tertio de ele-

ctuariis, clysteribus, & aliis ad actum practicũ facien-
tibus. De syrupis primo dico, quòd communiter Pra-
cticales dant vnciam vnã & mediam syrup. & aqua-
rum vnc. 3. in dupla scilicet proportionem ad syrupũ,
quandoque tamen dant vsque ad vnc. 2. syrup. Nec
me latet, quòd Gherard. de solo voluit, quòd dentur
vnc. 4. syrupi, & vnc. 6. aquarum, & in hanc senten-
tiam cõcurrit Matheus de gradibus super nono Almã
foris, communis tamen sententia est, quòd dentur
vncia vna & media syrup. & 3. aquarum: qui modus
sumitur à Galeno primo Reg. acut. comment. 42.
nec alibi reperitur. Concludamus ergo, quòd com-
muniter Practicales dant vnc. vnã & mediam,

B

vel

Mathei Curtij

vel vnc. duas syrapi, & tres aquarum: & hoc habet veritatem, siue vnus, siue duo dentur syrapi, siue etiam tres: Nam quandoque habemus vnā intentionem, quandoque duas, quandoque tres. Exemplum primi, si intentio Medici fuerit alterare malam complexionem calidam dabit vnc. vnā & mediam syrapi endi. & vnc. tres aquæ endi. Exemplum secundi, si intentio Medici erit ad duo, v. g. ad remouendam malam complexionem calidam, & ad aperiendum, tunc ratione remotionis malę complexionis calidę dabimus syrup. de endi. cum aqua endi. ratione autem apertionis dabimus syrup. bisantinum cum aqua foeniculi, sic ordinando. Recipe syrup. de endi. vnc. vnā, syrapi bisantini vnc. mediam, aquarum endiuia vnc. duas, foeniculi vnc. vnā, misce & fac syrupum. Exemplum tertii, si intentio Medici fuerit ad tria, v. g. ad remouendam malam complexionem calidam, & ad aperiendum, & ad incidendum, tunc dabimus tres syropos, scilicet de endiua ad remouendam malam complexionem calidam cum aqua endi, pro apertione bisantinum cum aqua foeniculi, pro incisione acetosum cum aqua acetosæ, sic ordinando.

Recipe	(syrup. de endi. (syrup. bisantini (syrup. acetosi.	an. vnc. mediam
--------	--	-----------------

Aquarum	(endiuia (foeniculi (acetosæ.	an. vnc. vnā.
---------	--	---------------

Misce & fiat syrupus

Nota, quòd plurimum aqua proportionatur syrupo, aliquando tamen cogitur Medicus vt remoueat
malam

malam complexionem calidam, vel frigidam syruporum exhibere aquas nō proportionatas syrupis, exempli gratia, si ordinauero syrupum de epithimo, vel de stecade, ordino cum istis syrupis aquam tendentem ad frigiditatem, ut puta, violarum, vel endi. ut remoueat mala complexio calida syruporum, licet aquę non sint proportionatę syrupis, quia syrupi sunt calidi, & aquę frigidę, ista tamen relinquuntur iudicio Medici. Notandum tamen est, quod sicut exemplum dedi de istis, possumus per alios syropos, & per alias aquas discurrere secundum quod Medico videbitur. Notandum etiam, quod semper possumus ponere aquas cordiales in syrupis, ut confortetur virtus regitiua & vitalis, quę residet in corde, sicut Rex in regno, ut est omnium illustriss. Medicorum sententia. Concludamus ergo, quod in ordinando syropos, non debemus ordinare nisi vnciam vnam & mediam syrupi, vel vnc. duas ad plus, raro tamen, vel syruporum: & vnc. tres aquę, vel aquarum, exempli gratia sic dicendo. Recipe syrupi de endiuiā, syrupi acetosi, & mellis ros. col. an. vnc. med. aquarum endiuię, acetosę, absinthii an. vnc. vnam, misce & fiat syrup. pro vna vice, & sicut exēplificaui in istis syrupis & aquis, ita & de aliis.

Syrupi digerentes materiam cholicam.

Hepar.

Syrup. de endiuiā, succo endiuię, cicorea.

Cor.

Syrup. de succo acetosę, de acetos. citri, de buglossa.

Pectus.

Syrup. violatus, iuiubinus, iuleb violatum.

Stomachum.

Syrup. nenupharinus, de portulaca, de mirto, iuiub

B 2 Mes.

Mathei Curtij

Mef. roſatum, acetofus ſimp. de oxifacharo.

Caput.

Syrup. roſatus, de granatis, violatus, de papauere, nenupharinus, roſatus, de bugloſſa.

Aque digerentes materiam cholericam.

Hepar.

Aq. endiuia, epatica, cucurbita, cuſcute, cicoreæ ſolatri, plantaginis.

Cor.

Aq. acetofæ, bugloſſæ, boraginis, violarum, nenupharis roſarum, cicoreæ.

Caput.

Aq. lactuæ, nenupharis, ſem. co. frig. papaueris roſarum.

Stomac.

Aq. acetofæ, roſarum, plantaginis.

Pectus.

Aq. violarum, portulacæ, de iuiubis, iuleb violatum, nenupharis ſem. co. frig. bugloſſæ.

Syrupi digerentes materiã melancholicam.

Caput.

Syrup. de biſantiis, de lupulis, de ſtechade, de betonica
Hepar & Splen..

Syrup. de epithimio, de lupulis, de fumo terræ, de borag. bugloſſæ, de biſantiis, oximel ſimp. cõp. ſquil.

Cor.

Syrup. de pomi comp. de ſapor, de ſapa, de biſantitiis, de thymo, de epithimo, boraginis, bugloſſæ.

Stomachum.

Syrup. biſantinus.

Aque

De Dosibus

3

Aquæ digerentes materiam melancholicam.

Hepar.

Aq. lupulorum, de fumo terræ, de buglossa.

Splen.

Aq. scolopendriæ epithimi.

Cor.

Aq. boraginis, & buglossæ.

Syrupi digerentes materiam flegmaticam.

Cerebrum.

Syrup. lupulorum, florum sambuci, genistæ, de stecha
de, de duabus radicibus.

Stomac.

Syrup. de menta, mellis ros. col. oximel simp. oximel
comp. de absinthio, squill.

Hepar.

Syrup. de duabus radicibus, de eupatorio, acetosus
diarodon, acetosus compo.

Cor.

Syrup. bysantinus, de cortice citri, de pomis compo.
de borag. de buglossa, mel. ros. col. omnia oximelia

Pectus.

Syrup. de bisantitiis, de thimo, acetosus de prima rad.
de liquiritia, de hyssopo, de calamento, de prassi
oximel simplex, compo. squill.

Matrix.

Syrup. de matricaria, de artemisia.

Aquæ digerentes materiam phleg.

Stomac.

Aquæ absinthii, mētæ, ruthæ, apii, camomillæ, fenicul.

B 3

Pectus

Mathei Curtij

Pectus.

Aq. capillorum veneris, hyssopi, prasii, buglossæ.

Caput.

Aq. maioranæ, saluiæ, rorismarini, betonicæ.

Hepar.

Aq. prasii, scabiosæ, eupathorii, saluiæ, apii, foeniculi, absinthii.

Renes, & vesicam.

Aq. asparagorum, agrimonie.

Cor.

Aq. mellis, agrimonie, asparagi.

Matrix.

Aq. artemisie, pulegii, rutæ, matricarie.

Digestiua sanguinis non ponuntur, quia sanguinis cum putrescit, transit in choleram. Satis ergo est posuisse digestiua aliorum humorum. Sunt tamen nonnullæ, quæ sanguinem purificant. vt

Aq. capillorum veneris, absinthii, lactuce, lupulorum, boraginis, lactis caprini, fumiterræ, buglossæ, succi rosarum, cicoreæ.

Medicinæ purgantes choleram.

Nunc principaliter dicamus de dosi medicinarum solutiuarum. Et primo de simplicibus, secundo de compositis. Medicinæ simpl. choleram soluentes, sunt rhabarbarum cal. & siccæ complexionis in secundo grad. Cuius dosis in substantia apud communiter praticantes est drag. tres, vel drag. tres & med. cum spica, vel squinanto eius correctiuo. Exempli gratia. Recipe rhabarbari electi drag. tres, vel drag. tres & med. spicæ vel squinanti drag. vnam, puluerizentur omnia

De Dosibus

4

omnia subtiliter, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violari vnc. vnam. Notandum est, quod si velles dare hanc medicinam in fluxibus, debes facere hanc decoctionem in rebus stipticis, vtputa cum decoctione facta ex granis myrti, sumach, sem. plantaginis, acetosæ, mirabolanorum, in aqua plantaginis. Dosis rhabarbari in infusione est drag. sex vel septem cum eius correctione, vt, Recipe rhabarbari electi drag. sex vel septem, spicæ, vel squinanti m. vnum, contundantur omnia grosso modo, & infundantur per vii. horas in suff. q. vini odoriferi, deinde fiat omnium fortis expressio, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam.

De Manna.

Manna conueniens dosis, quæ complexionis æqualis est, plus tamen ad caliditatem declinans, est vnc. duæ, vel vnc. duæ & med. vt, Recipe mannæ electæ vnc. duas, vel vnc. duas & med. dissoluatur cum decoctione communi florum & fructuum, & fiat potus.

De Casia.

Casia æqualis complexionis ad latus caliditatis declinantis humidaq; in primo dosis est, drag. xi. vel xii. vt, Recipe casia nouiter extractæ, bonæ & pinguis drag. xi. vel xii. dissoluantur cum decoctione florum & fructuum, & fiat potus: cui adde syrupi violati vnc. vnam: & si volueris dare eam in forma boli, sic ordinetur. Recipe casia nouiter extractæ drag. xi. vel xii. & cum zuccaro fiat bolus.

De Scamonea.

Dosis scamonæ, quæ est calida & sicca in tertio est g. vii. vel viii.

B 4

De

Mathei Curtij

De Tamarindis.

Dosis tamarindorum, secundum Mesuem est ab vnc. ii. ad v. in infusione vel decoctione, vt, Recipe tamarindorum vnc. duas, infundantur in vnc. x. aquæ lactis, & bulliant ebullitione vna, & fricentur manibus, & exhibeantur, siue colata siue non, & eorum complexio est frigida & sicca in secundo.

De Aloe.

Aloes cal. in secundo, sicca in tertio, dosis in substantia est drag. vna, in infusione autem drag. duæ.

De succo Rosarum.

Dosis succi rosarum frig. in primo, sicci in secundo, vel in infusione ipsarum recentium, est ab vnc. vna vsque ad vnc. duas cum zuccaro: numero dosis est ab vnc. duabus vsque ad quinque.

Nunc dicamus de medicinis purgantibus & educen-
ribus phlegma: & primo de Agarico, qui est calid.
in primo, & sicca in secundo. Cuius dosis in substan-
tia est dragma vna, vel vna & med. cum suo correcti-
uo, scilicet cum tertia parte salis gemmæ scrupu. vno
puluerizato & dissoluto cum decoctione florū & fru-
ctuum & fiat potus, cui addatur mellis ros. col. vnc.
vna. Dosis Agarici in infusione est à drag. vna &
med. vsque ad duas, exempli gratia. Recipe Agarici
drag. vnam & med. vel drag. duas, salis gemmæ scru-
pu. duos, puluerizentur & infundantur per septem ho-
ras in suff. q. oximelis simp. deinde fiat omnium fortis
expresio, & cum decoctione florum & fructuum fiat
potus, cui adde mel. rosa. cola. vnc. mediam.

De Turbit.

Dosis Turbit calid. in tertio, in substantia & in infu-
sione est sicut Agarici, correctiuumque ipsius est in
Zinziberis secunda pars.

De

De Dosibus.

5

De Coloquintide.

Dosis coloquintidis, quæ est calida & sicca in tertio est à kirach vi. vsque ad decem, eius correctiuum, secundum Mesuem, est mastix.

De Emblicis.

Emblicorum dosis in substantia est ab aureis duobus vsq; ad tres: in infusione verò à tribus vsq; ad sex, quorum cōplexio est parum frig. sicc. in primo ordine.

De Bellericis.

Bellericorum dosis est sicut dosis emblicorum, & cidoniorum.

De Euphorbio.

Euphorbii, quod est calid. & siccum in secundo, dosis est, secundum Mesuem, à mirach. vno vsque ad tres, secundum alios autem à g. iiii. vsque ad xii. & corrigitur cum mastice, & spica.

De Hermodactilis.

Dosis hermodactilorum, quorum complexio est calida & sicca in primo, ad secundum est à drag. duab. vsque ad v. aut plus secundum fortitudinem patientis corrigitur cū aqua mellis, aut lactis, spica, aut mastice.

De succo Cucumeris asinini.

Dosis succi cucumeris asinini, qui est calidus & siccus in tertio, est à g. x. vsque ad scrupu. vnum, dosis pulueris eius radice est à gr. vsq; ad drag. iiii. corrigitur & preparatur adiungēdo ei aliquid de dragagāto.

De Serapino.

Dosis serapini est à drag. med. vsque ad aureum, datur cum aqua rutæ, aut endiuixæ.

De Opoponace.

Opoponacis, cuius complexio est calida & sicca in tertio, radix vero ipsius in secundo, dosis est ad drag. vnam vsque ad ii.

De

Mathei Curtii

De Mesereon .

Dosis ipsius, secundum Mesuem, est à drag. quinq; vsque ad vnc. vnam, & in concoctionibus & pulueribus kirach ii. vsque ad v. eius malicia frangitur infundendo per diem vnum in aceto, aut lacte dulci, aut acetoso. Extinguitur eius malitia cum malignitate sua, cum succo portulacæ, & propriè cum succo endiuia, secundum Mesuem cap. primo. Mirabolani etiam frangunt virtutem eius.

Medicinæ purgantes melancholiam .

Nunc dicamus de medicinis soluentibus melancholiam, & primo de Mirabolanis Indis, quorum complexio frigida in primo, & sicca in secundo, quorum dosis in substantia est à drag. ii. vsque ad iiii. in infusione vero à iiii. vsque ad x. educunt melancholiam & chole-ram adustam.

De lapide Lazuli .

Dosis lapidis Lazuli, seu stellati abluti est à drag. vna vsque ad duas, corrigitur & præparatur super lapidem, vel in mortario lapideo teritur & lauatur trecies cum aqua, & sic similiter vtendo lauetur decies cum aqua rosata, & administretur cum aqua buglossæ, & vino odorifero: eius complexio calida est in secundo & sicca in tertio.

De lapide Armeno .

Lapis armeni calid. in primo datur sicut lazuli, & ita præparatur & corrigitur.

De Sena.

Dosis Senæ in infusione & potione est ab aureis iii. vsque ad drag. vnam, secundum Mesuem, in pluribus: secundum alios autem est à drag. duabus vsq; ad drag. quinque

que, corrigitur & præparatur, si addatur tantum
 in zinziberis, aut salis gemmæ, & sic administratur:
 tur cū aqua decoctionis florum boraginis, buglossæ,
 stilorum, macis, & cardamomi: & potest decoqui
 magna quantitate cum brodio carniū, vel pulli
 que trituratione, & brodium illud sine molestia o-
 gratur cum incidentibus & aperientibus, sicut cum se-
 nibus foeniculi, anisforum, dauci, zinziberis, cinamo-
 n, & gariofilorum: & quandoq; administratur cum
 sua mellis, aut cum decoctione passularum. Estque
 na calid. in principio secundi, & sicca in primo: fo-
 t autem eius calida sunt in primo.

De Epithimo.

Dosis Epithimi in pulvere est ā drag. tribus vsque
 ā drag. vii. potus eius in decoctione est ā drag. v. ad
 sed non sumatur in quantitate, & parum sustinet de-
 coctionem: corrigitur si addatur tertia pars salis gem-
 mæ, vel salis Indi, & debet incorporari cum oleo amig-
 dalino dulci, & quandoque administratur cum deco-
 ctione mirabolanorum, mellis, & passularum. Eius
 complexio calida est & sicca in secundo, secundum ve-
 o Gal. calid. est in tertio.

De medicinis solutiuis compositis.

Restat videre modum de dosi medicinarum soluti-
 varum compositarum, pro quo primo est notandum,
 quod in qualibet medicina solutiua debemus adhibere
 aliquid quod habeat vim conforrandi cor, quia est
 sententia omnium illustrium Medicorum, præcipue
 Mes. in correctione medicinarum cap. de debilitate sto-
 machi post purgationem cap. decimo, can. tertio, in-
 quit, Non prætermittas aliquo modo quin conforre-
 tur

Mathei Curtii

tur cor, qui est thesaurus vitæ. Secundo nota, quòd quando volumus euacuare ab aliquo membro particulari, debemus euacuare cum illa medicina solutiua, quæ respicit illud membrum, vel debemus ponere cū medicina solutiua aliquid directiuum ad membrum, vt puta, si velimus euacuare à capite, debemus ponere in decoctione flores stechados arabici, & facere decoctionem in aqua capitali, vt est aqua bethonice, vel saluiæ: & sicut dico de capite, sic debet intelligi de aliis membris. Tertio nota, quòd solutiue composita sunt in duplici doctrina, nam quædam sunt lenitiuæ & vacuant leniendo, quædā fortes & educunt attrahendo, & ista attrahētia sunt fortiora, vt inferius declarabimus.

De medicinis lenientibus.

Diaprunis non solutiuis valet in materia cholerica, manna, & cassia: similiter in materia cholericā, quanuis & in aliis, & ista sunt simplicia elect. de sebesten, diacatholicon, diacassia, hæc valēt in oī materia.

De solutiuis compositis choleræ.

Diaphenicon, electuarium de succo rosarum, elect. rosa. Mes. Diacidonium chologogum, electuarium de pfilio, diaprunis solut. diarosa. cum rab. elect. de elescoph, elect. Indum, diarosa. cum turbith.

De solutiuis compo. melancholiam.

Confectio hamech, puluis senæ præparata, diasenæ Nico. Quarto nota, quòd in conficiendo medicinam solutiua, semper debes ponere lenitiuum suum, sicut est

est sententia Io. Mes. de compilatione medicinarum cap. 1. Inquit .n. lenitas nempe medicinis associata, & propriè violentarum virtutum ipsas ad latus incolumitatis declinare facit. Dos lenitiuarū est à drag. quatuor, vsq; ad drag. vi. & ponimus drag. quatuor, vel quatuor & med. ad plus solutiui fortis cum lenitiuo, exempli gratia. Si voluero ordinare medicinam euacuantem choleram, sic dicam, Recipe diacatholiconis drag. v. diapheniconis drag. vnam, elect. de succo ros. drag. duas, electuari de psilo semi. drag. misce, & cum decoctione florum & fructuum facta in aqua endiuix & buglossæ fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam. Ecce quomodo ibi drag. v. lenitiui, & drag. tres & med. solutiui fortis adsunt, & virtus huius medicine dirigitur ad hepar, & respicit cor mediante decoctione facta in aquis appropriatis. Si voluero euacuare materiam phlegmaticam, sic dicam. Recipe diacatholiconis drag. v. electuarii Ind. drag. duas, diapheniconis drag. vnam & med. misce, & cū decoctione florum & fructuum facta in aqua buglossæ & foeniculi fiat potus, cui adde mellis ros. col. vnc. med. Si autem intentio mea fuerit euacuare melancholiam, sic dicam. Recipe diasenæ lenitiui drag. v. confectionis hamech drag. duas, diasenæ Nico. drag. vnam & med. misce, & cum decoctione florum & fructuū facta in aqua scolopēdriæ & buglossæ fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnā : & sicut dico de his solutiuis, ita poteris facere medicinas ex aliis solutiuis.

De medicinis, quibus communiter Practi-
cantes vtuntur.

Nunc intendimus ponere aliquas, quibus commu-
niter

Mathei Curtii

niter practiꝑantes vtuntur, & primo dicam de medicinis compositis choleram soluentibus.

Potio Rhabarbari in infusione.

Recipe rhabarbari boni & electi scrupulos tres, spicæ scrup. vnum, incidantur minutim & terantur, deinde infundantur per septem horas in suff. q. vini odoriferi in hyeme, in estate autem in aqua end. postea fiat fortis expressio, in qua dissolue diacatholiconis, vel mannæ, vel cassiæ drag. v. elect. de succo ros. drag. duas elect. de psilio drag. vnam, misce, & cum decoctione florum & fructuum facta in aqua buglossæ & endiuivæ fiat potus, cui adde syrapi violati vnc. vnâ.

Potio Rhabarbari in substantia.

Recipe Rhabarbari drag. duas, spicæ scrup. vnum & med. puluerizentur subtiliter, quibus adde diacatholiconis, aut alterius lenitiui drag. v. confectionis de dactilis elect. de succo ros. an. scrup. duos, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrapi violati vnciam vnam.

Potio alia Rhabarbari in cura dissenterivæ.

Recipe corticum mirabolanorum citrinorum leniter tostorum drag. tres, terantur grosso modo, & cū vnc. viii. aquæ plantaginis fiat decoctio vsque ad consumptionem medietatis, in qua dissolue rhabarbari torrefacti & puluerizati dragmas duas, squinanti scrup. vnum & med. misce cidoniorum vnc. vnam, & fiat potus.

Potio

Potio alia Rhabarbari in cura diffenteria.

Recipe corticum mirabolanorum citrinorum chebulorum an. vnc. vnam & med. terantur groffo modo, & cum vnc. viii. aquæ plantaginis fiat decoctio vſque ad conſumptionem medietatis, in qua diſſolue rhabarbari torrefacti & puluerizati drag. duas, ſquinganti ſcrup. vnum, miue cidoniorum ſacharatę vnc. vnam, & fiat potus.

Potio Mirabolanorum in infuſione.

Recipe mirabolanorum citrinorum drag. quatuor, ſpicæ ſcrup. med. puluerizentur & infundantur per ſex horas in vnc. vna & med. decoctionis paſſularum, deinde fiat fortis expreſſio, in qua diſſolue elect. de ſucco roſ. vel diaprunis ſolutiui drag. tres, caſſiæ electæ vel mannæ drag. ſex cum decoctione florum & fructuum in ſero caprino fiat potus, cui adde ſyrupi violati vnciam vnam.

Potio Mirabolanorum in ſubſtantia.

Recipe mirabolanorum citrinorum drag. duas, ſpicæ g. v. torrefiant aliquantulum ſuper laminam fereā calidam, & ſubtiliter puluerizentur, & cum vino cidoniorum, vel ſyrup. mirtino ad vnc. ii. & aqua plantaginis quantum ſufficit fiat potus.

Potio familiaris & vſitata.

Recipe caſſiæ nouiter extractæ, vel mannę, vel diaprunis non ſolutiui drag. ſex, elect. de ſucco roſ. vel
dia-

Mathei Curtii

diaprunis solu.drag.iii. & med. & cum decoctione florum & fructuū fiat potus, cui adde sirupi violati vnc.i.

Potio alia vſitata .

Recipe Rhabarbari electi drag. vnam, ſpicæ ſcrup. vnum, puluerizentur groſſo modo & infundantur per ſeptem horas in ſuff. q. aquæ endi. in eſtate, in hyeme vero in vino odorifero albo. Item recipe agarici electi drag. vnam, ſalis gemmæ ſcrup. vnum, puluerizentur groſſo modo, & infundantur per ſeptem horas in ſuff. q. oximelis ſimplicis, deinde fiat omnium fortis expreſſio, in qua diſſolue mannæ electæ vnc. vnam, conſect. de daſtilis, elect. de ſucco roſ. an.drag.vnam, miſce & fiat potus, cui adde ſirupi violati vnc. vnam.

De medicinis compoſitis ſoluentibus phlegma.

Nunc dicamus de medicinis compoſitis ſoluentibus phlegma, & prius de Agarico in ſubſtantia. Recipe Agarici albi, leuis, & frangibilis drag. vnam, ſalis gemmæ, zinziberis an. ſcrup. med. quibus adde mannæ, vel diacatholiconis drag.v. electua. Indi, miſce, & cum decoctione florum & fructuum & paſſularum facta in aqua meliſſæ & fœniculi fiat potus, cui adde mel liſ roſati collati vnc.vnam.

Potio Agarici in infuſione .

Recipe Agarici ſcrup. iii. zinziberis, ſalis gemmæ an. ſcrup. med. puluerizentur in ſuff. q. vini albi odoriferi, vel oximelitis ſimplicis, vel aliqua aqua ex digeſtiuis phlegmatis, deinde fiat fortis expreſſio, in qua diſſolue

dissolue cassiæ electæ, vel mannæ, vel alicuius alterius electuarii lenitiui drag. v. electuarii Indi drag. ii. & cum decoctione florum & fructuum facta in aqua mellis & foeniculi fiat potus, cui adde mellis rosati collati vnciam vnam.

Potio Turbith in infusione.

Recipe Turbith boni, mundati, & mediocriter triti scrup. iiii. zinzib. scrup. elect. Indi scrup. ii. vel ii. & med. terantur & infundantur per horas viii. in suff. q. vini albi odoriferi, vel in decoctione passularum, vel in aliqua ex aquis digestiuis phlegmatis, deinde fiat fortis expressio, in qua dissolue cassiæ nouiter extractæ, vel mannæ, vel alterius lenitiui drag. v. electuarii Indi drag. ii. misce, & cum decoctione prædicta fiat potus, cui adde mellis ros. collati vnc. vnam.

De medicinis cōpositis melancholiā soluētibus.

Recipe cassiæ nouiter extractæ vnc. vnam, confectionis hamech drag. iii. misce, & cum saccharo fiat bolus.

Alia potio.

Recipe diacatholicorum, vel diasenæ lenitiui drag. xi. diasenæ Nico. drag. iii. & med. misce, & cum decoctione florum & fructuum epithimi, folliculorum senæ facta in aqua boraginis fiat potus, cui adde sirupi violati vnc. vnam. Et nota, quod medicina in forma boli potest fieri in quacunque materia siue cholerica, siue phlegmatica cū lenitiuis & solutiuis apropiatis. Nota, quod dosis lenitiui & solutiui potest aliquantulum

C augere,

Mathei Curtii

augere & diminui, secundum fortitudinem & debilitatem tam ægrotantis, quàm medicinæ .

De Pilulis .

Restat iam dicendum de Pilulis. Dosis pilularum, secundum communiter Practicantes, est drag. vna, & plus vel minus, secundum materiam simplicium ingredientium ipsas, & secundum fortitudinem & debilitatem morbi, & virtutem patientis, quia aliquando acuius ipsarum virtutem cum diagridio, vt, Recipe pilularum aggregatiuarum scrup. ii. diagridii g. ii. bene puluerizati, misce, & fac pilul. numero v. vel plus, vel minus, secundum fortitudinem & virtutem, vt supra, relinquitur autem hoc periti Medici.

Pilulæ choleram euacuantes .

A capite.

Pilulæ Aureæ Mes. siue quibus Nic. Arabicæ Mes.

Ab epathe.

De Rhabarbaro Mes.

A toto .

Aggregatiuæ .

Pilulæ euacuantes phlegma.

A capite.

De hiera cum agarico, siue hiera Nico. Cocchie Almanso. De hiera simp. Gal. Fetidæ Nic. & Mes. siue quibus Nic. De opoponace Mes. De euphorbio Mes. Arabicæ Nico. Assaiareth Bar. Mō.

A pectore.

De Dosibus.

10

A Pectore.

De Agarico Mes. Agaricus trociscatus.

A Stomacho.

Elephantina Mes. De Mastice Mes. Stomatica Mes.
De Mastice Cono.

A iuncturis.

De hermodactili. Mes. De serapino Mes. Artetica Nic.
Ab hydropo.

Alletercon.

Ab oculis.

Lucis Mes:

De pilulis euacuantibus melancholiam.

Ab hepate, & splene.

Inda Mes. De fumo terræ. De lapide lazuli. De
lapide Armeno.

Nota, quod si non habuero præparatas pilulas ab aliquo membro euacuantes, accipiam pilulas ab aliquo membro euacuantibus cum aliquo directiuo ad illud membrum, à quo vellem euacuare. Nota item, quod pilula, quæ dantur ad minorationem materiæ, debent dari in minori dosi, quam dantur ad eradicationem, unde cum dantur ad eradicationem datur drag. i. sufficit autem ad minorationem scrupu. duos.

De medicinis non solutiuis.

Nunc tria principaliter dicamus de dosi medicinarum non solutiuarum: & primo de elect. & confect. & etiam de aliis sequentibus. Electuarium differt à confect. nam electuarium fit ex saccharo, vel melle, aut
C 1 syrupo

Mathei Curtij

syrupo : confectio verò fit ex saccharo solum dissolutum in aliqua aqua : dicitur electuarium quasi ex pluribus electum : confectio autem quasi cum aliis factio vel compositio. Nota diligenter, quòd in compositione electuaria pro qualibet lib. zucha. vel mellis, aut syrup. antiquitus ponere solebant drag. iii. pulveris : nunc autem Aromatarii pro qualibet libr. zuch. vel mellis, vel syrupi, ponunt in electuariis vnc. ii. pulveris, & hoc faciunt ut electuaria sint magis gustui delectabilia. In confectioibus solidis Aromatarii nostri temporis pro lib. zucha. in confectioibus drag. vi. pulveris, ita quòd pro drag. i. pulveris dant vnc. ii. zuchari. Antiquitus verò solebant in lib. zuchari ponere drag. iii. pulveris, exempli gratia, Si voluerò ordinare electuarium secundum antiquos, sic dicam. Recipe specierum aromatici ros. specierum diarodonis abbatis an. vnc. med zuchari dissoluti in aqua ros. lib. vnam, fit confectio solida in rotulis. Exemplum secundum Aromatarios nostri temporis. Recipe specierum aromatici rosarum, specierum diarodonis abbatis an. vnc. iiii. zuchari dissoluti in aqua ros. fiat confectio in forma solida in rotulis. Nota insuper, quòd dosis communis electuaria est à drag. iii. ad drag. iiii. sequendo de elect. non solutiuis. Dosis verò communis confectiois nō solu. est à drag. quattuor ad drag. quinque, & plus & minus secundum diuersas relationes. Nota etiam, quòd electuaria & confectioes non solut. debent dari ante cibum per duas horas, & hoc est consuetudo apud Practicantes : & hoc habet veritatem de elect. confortantibus stomachum : electuaria verò confortantia caput debent exhiberi post coenam per horam ad quantitatem fabæ. Restat modo videre de electuariis, & confectioibus appropriatis

tis vnicuique membro particulari.

Electuaria calida confortantia caput.

Pliris aromaticon, Aurea Alexandrina, Theriaca fermentata, Mitridatum, Diaconis, Dialibanus.

Diacastoreum, Diarrhodon, Zuccharum viol. Theodorinum, Confect. anacardina, Confectio de musco, Diambra, Acori conditi, Zuccharum rosatum, Loch de papauere, Cōseruam florum nenu. Chebuli cōditi.

Electuaria calefacientia Splenem.

Diacalamentum, Conseruæ saluiæ, Conseruæ florum stechados.

Loch de squilla, Dialisophos, Dianthos.

Conseruæ florum rorismarini, Loch sanum & expertum, Loch de pulmone vulpis.

Electuaria calefacientia Cor.

Electuarium de gemmis, Confectio de xiloaloes, Aromaticum muscatum.

Gallia muscata, Diamargariton, Confectio de musco, Electuarium lærificans, Confectio de cino.

Cortices citri conditi, Dianthum seu Dianthos, Cōditum de buglossa, Cōserua buglossæ, elect. de pomis.

Electuaria calefacientia Stomachum.

Theriaca fermentata, Diaciminum, Diamuscum, Rosata nouella.

Diazinziber, Diatrio pipereō, Mitridatū, Diagalāga

C 3

Aroma-

Mathei Curtii

Aromaticum rosatum, Aromaticum nardinum,
Zinziber conditum.

Electuaria calefacientia Hepar.

Diaciminum, Diacalamentum, Diacinamomum,
Diacostum.

Electuaria calefacientia Matricem.

Diacalamérú, Trifera magna, Cōfectio de acetosis.
Confectio de xiloaloe, Diambra, Electuariū ducis.
Diacinamomum, Electuarium dulce.

Electuaria calefacientia Iuncturas.

Confectio anacardina, Conserua rorismarini, Con-
serua florum stichados.

Diacorus, Acori conditi.

Diazinziber, Conserua saluix.

Electuaria infrigidantia pectus.

Zuccharum violatum, Diagragantum frigidum.

Loch de fursure simplic. Diapapauer.

Diapenidion sine speciebus calidis.

Electuaria infrigidantia Cor.

Zuccharum rosatum, Triasandali, Manus crist.

Diagalanga, Diacurcuma, Diabuglossatnm.

Diarrhodon abbatis, Confectio de acetosis,
Dialacca.

Electua-

De Dosibus.

12

Electuaria infrigidantia Hepar.

Zuccharum rosatum, Triasandali.
Trifera magna, Zuccharum violatum.
Diacoston, Diacoppon.

Electuaria infrigidantia Splenem.

Triasandali, Zuccharum violatum, Zuccharum rosatum.
Conseruæ florum stichados, Diarrhodon.

Electuaria infrigidantia Stomachum.

Zuccharum rosatum, Zuccharum violatum.
Diarrhodon descriptione communi, Diacitonion
sine speciebus.

Electuaria infrigidantia Iuncturas.

Diarrhodon, Succum rosatum.
Zuccharum violatum, Triasandali.

De Trociscis.

Restat modo videre de Trociscis: est autem Trociscus rotunda compositio cum quadam depressione ad similitudinem magni lupini, communis dosis trociscorum præter eos, qui oppiati sunt, est à drag. vna & media, vsque ad drag. ii. licet sit melius non transcendere vi. Trocisci autem apertiui non debent exhiberi vltra quantitatem scrup. vnus, aut drag. med. Medicina sub forma trociscorum diutius conseruiatur,

C 4

quàm

Mathei Curtij

quàm sub forma pilularum, aut electuاريorum, aut cōfectionum, aut coctionum: exempli gratia, si voluerō ordinare compositionem vnam trociscorum, sic dicam. Recipe mastice cinamomi electi, gariofiorum, coriandrorum præparatorum, calami aromatici an. drag. med. fiant trocisci cum syru. de mentha, vel cum aliqua aqua appropriata intentionem Medici, dummodo pondus vnius trocisci non excedat drag. med. & debent exsiccare in umbra. Vnde si voluerō ordinare pilulas, sic dicam. Recipe trociscorum supra ordinatorum drag. vnam, puluerizentur, & cum zuccharo dissoluantur in aqua menthæ, aut in aliqua alia secundum intentionem, & fiat confectio in rotulis trium dragmarum pro qualibet, similiter dicā de decoctionibus.

De clysteribus.

Restat modo videre de clysteribus, multiplex autē est clystere quodam lenitium, quod fit in febribus calidis, vt, Recipe florum maluæ, blitis, violarum, mercurialis, hordei an. m. med. fiat decoctio in suff. q. aque ad consumptionem tertiæ partis, deinde fiat colatura, de qua accipe libr. vnam, cassiæ nouiter extractæ, zucchari rubri an. vnc. vnam, olei violari vnc. quattuor, vitelli oui nu. i. salis drag. iii. fiat clystere, vel enema. Quoddam est clystere lauatiuum, quod fit hoc modo. Recipe aquæ hordei, vel brodii pulli, in quo decoctum sit hordei libr. vna, zucchari rubri vnc. i. & med vitelli oui num. i. fiat clystere sine sale & sine oleo, & fiat post exhibitionem medicinæ solutiue scammonate. Quoddam sit clystere partim lauatiuum, & partim solutiuum, vt. Recipe florum maluæ, cammomillæ an. manip. med. fiat decoctio in suff. q. aquæ, de qua accipe
lib.

lib. vnam cassiæ nouiter extractæ, hieræ picræ, zucchari rubri an. vnc. med. olei camomelini, aut violati vnc. quatuor, salis drag. iii. vitelli oui nu. i. misce & fac clystere, vel sic Recipe brodii pulli, in quo sit camomilla decocta lib. vna cassiæ, hieræ pigræ, vel benedictæ, zucchari rubri an. vnc. med. mellis rosati col. vnc. ii. olei camomelini, vel violati vnc. iii. salis drag. iii. vitelli oui nu. i. misce, & fac clystere: & hæc duo enemata conueniunt febribus calidis, vbi sit aliqua materia phlegmatica, ventosa, & biliosa.

Quoddam est clystere constrictiuum, vt Recipe rosarum rubearum balaustrorum, hordei torrefacti, granorum myrti an. manip. med. contundantur, & bulliant in suff. q. aquæ cum castrati donec caput sit coctū. Deinde fiat colatura, de qua sumat lib. i. boli armeni, sanguinis draconis an. scrup. i. olei rosa. omphacini vnc. ii. pinguedinis renum caprarum vnc. i. misce, & fiat enema cum vitello vnius oui assati dissoluti in brodio dicto, & istud enema conuenit in fluxu maxime diuretico: possunt etiam consimilia clysteria multiplicari secundum intentionem Medici.

Quoddam est clystere carminantium forte, vt, Recipe rerum carminantium an. manip. med. fiat decoctio in suff. quantitate aquæ vsq; ad consumptionem tertiæ partis: deinde fiat colatura, de qua recipe lib. vnam benedictæ, zucchari rubri an. vnc. i. mellis ros. col. vnc. ii. olei de lilio vel ruthæ vnc. iii. salis drag. iii. misce, & fiat enema: si autem volueris facere fortius, potes addere drag. ii. vel drag. iii. olei de baccis lauri, & istud clystere conuenit in dolore forti à materia frigida.

Quoddam est clystere fortissimum fortissime resoluens materiam phlegmaticam, & competit paralisi,

apo

Mathei Curtii

apoplexiæ, vt Recipe centauri minoris vtriusque sal
uiæ, abrotani, calamenti, origani an. m. med. anisi, ro-
rismarini, sebesten, seminis basiliconis maioris an. vnc.
med. florum stichados arabici vnc. vnam, pulpæ co-
loquintidos drag. ii. mellis anacardini, olei de casto-
reo an. quartam medietatem salis gemmæ drag. i. hic
rē picræ, ellebori albi an. drag. vi. bulliant omnia, præ-
ter hieram picram in decem libr. aquæ vsque ad con-
sumptionem medietatis, coletur, & colaturæ suman-
tur v. partes, & addatur hieræ picræ, & iniiciatur. Est
enim efficax, proprium, & vltimum. Est aliud clyste-
re commune in quacunq; dispositione leui apud mulie-
res, vt, Recipe brodii carniū, vel decoctionis mat-
violarum, hordei lib. i. zucchini rubri vnc. i. & med.
vitelli oui numero vno, olei violati vnc. iii. salis drag.
iii. misce, & fiat enema commune. Notandum tamen
est, quod enema potest variari & multiplicari secundū
varias Medicorum intentiones: sed nota, quod soluti-
ua, quæ ingrediuntur enemata fortia in secunda, sunt
doctrina: quædam enim sunt solutiua simplicia, quæ-
dam sunt solutiua compositiua: simplicia sunt vt tur-
bith, sal. gemmæ, colocintidis agaricus, & ista ponun-
tur in decoctione enematum in dosi duarum dragma-
rum, sal. gemmæ ponitur in quantitate dragm. vna.
Composita sunt, diaphenicon, hiera picra, hiera lo-
godion, electuarium de baccis lauri, benedicta,
electuarium elefscoph, electuarium Indum. De istis
possumus ponere vnciam vnam, aliquando plus, ali-
quando minus, secundum quod placet Medico. Appa-
ret igitur dosi clysteriorum, decoctio enim cōmunis
est vnc. xii. Possumus tamen ascendere ad vnc. xvi.
solutiua simplicia, quæ ponuntur in decoctione, non de-
bent transcendere drag. iii. Solutiua autem compo-
ta

De Dosibus.

14

ta debent poni ab vnc. med. ad vnc. vnam & mediam, aliquando ad vnc. duas: oleum debet esse vnc. iii. sal debet esse drag. iii. & hæc de dosi clysteriorum.

De Epithematibus.

Epithema est medicina composita ex aquis destillatis speciebus, quæ mediante panno lineo, vel laneo applicatur membro infuso in aquis prædictis. Vnde licet Epithema possit cuilibet membro applicari, tamen communiter tribus applicatur membris, cordi, hepati, & renibus. Dosis epithematum quantum ad aquas communiter est vnc. xii. Dosis verò specierum communiter est drag. vna & med. licet aliquando Practicantes plus ponant, exempli gratia, Si voluero ordinare Epithema cordiale, sic dicam. Recipe aquæ ros. bu glossæ, melissæ, acetosæ an. vnc. iii. pulueris pro epithemate cordiali drag. vnam & med. vel drag. ii. croci parum, vini maluatici vnc. i. misce, & fiat epithema pro corde. Pro hepate sic dicam. Recipe aquarum ros. endiu hepaticæ, solatri an. vnc. iii. sandali rubri drag. vnam & med. vel drag. ii. aceti vnc. vnam, misce, & fiat epithema pro hepate. Et nota, quod idem epithema potest applicari renibus, & sic apparet dosis epithematum.

De Vnguentis.

Vnguentum est, quod ex oleo, vel oleis, pulueribus & modico ceræ, vel gummi perficitur. Et sciendum, quod pro qualibet vnc. olei, vel succi, debemus ponere dragmam vnam pulueris, vel ad plus drag. vnam & med. cum modico ceræ. Nota tamen, quod vnguentum potest habere triplicem formam, nam quoddam est

Mathei Curtij

est molle, quoddam mediocre, quoddam grossum. Vnde si voluero ordinare vnguentum sic dicam. Recipe olei de absinthio, nardini, olei de mentha an. vnc. vnam, pulueris gariofilorum, masticis, calami aromatici an. drag. i. ceræ parum, & fiat vnguentum molle, vel ceræ parum, & fiat vnguentum mediocre, vel ceræ quantum sufficit, & fiat vnguentum grossum. Notandum est etiam, quod vnguentum potest fieri cum gummis, vt puta cum armoniaco serapino, sic dicendo. Recipe olei de mentha, olei nardini, olei de absinthio an. vnciam i. pulueris gariofilorum, masticis, menthæ an. vnc. vnam, armoniaci serapini dissoluti in aceto an. q. sufficit, fiat vnguentum, & sic patet dosis vnguentorum.

De Cerotis.

Cerotum est medicina dura, quæ applicatur membro fortiter adherens, vnde differt ab vnguento, quia vnguentum fit cum cera, & fit cerotum cum resina. Notandum est, quod sicuti pro qualibet vnc. olei, vel alterius liquoris damus drag. i. pulueris conficiendo vnguentum: ita etiam conficiendo cerotum, exempli gratia, si voluero ordinare cerotum, sic dicam. Recipe olei cidoniorum decoctorum, de mentha an. vnc. i. gariofilorum, masticis an. drag. i. resinę quantum sufficit, & fiat cerotum. Notandum est etiam, quod cerotum est multiplex, nam quoddam est cerebrale, & fit in forma orbiculari, quoddam est stomachale, quod fit in forma triangulari, quoddam est epaticum, quod fit in forma lunæ, vt hæc figura (quoddam est splenericum, quod etiam fit in forma rotunda, vel, vt quidam dicunt, in forma quadrata. Notandum insuper est, quod ista se habent per ordinem vnguētum, cerotum, &

& emplastrum: nam cerotum fortioris oppositionis est, quàm vnguentum: & emplastrum fortioris oppositionis est, quàm cerotum. vnde Medicus debet primum ordinare vnguentem, deinde cerotum, postea emplastrum: & sic gradatim à debilioribus ad fortiora ascendere.

De Emplastris.

Emplastrum est medicina ex multis composita & confecta, quæ aut bullierint, aut contuse fuerint, & secundum propria corpora super membro posita, & in sua substantia. Notandum, quòd primo Medicus volens ordinare emplastrum, non debet puluerizare ingredientia sicut est radix altheæ, camomille, melliloti: sed ista debet decoqui ad spissitudinem, deinde contundi, quibus contusis debet addi oleum, vel pinguedo conueniens. Notandum secundo, quòd Medicus volens ordinare emplastrum, pro quolibet m. herbarum, vel radicum, debet ponere vnc. vnam & med. olei, vel alterius liquoris, vt butiri, pinguedinis gallinæ, anatis, anseris, porci, & reliqua, exempli gratia. Recipe florum camomillæ, melliloti, sem. aneti an. m. medium, bulliant in aqua ad spissitudinem, deinde contundantur, & cum oleo de camomilla, de aneto, de lilio an. vnciam vnam fiat emplastrum: & sicut dico de oleis, possum etiam dicere de butiro, & de pinguedinibus supradictis.

De Embrocatione & Fomentis.

Embrocatio est casus aquæ ab alto, in qua bullierint herbe supra membrum læsum, & quilibet m. her-
bæ

Mathei Curtii

bæ vult lib. i. aquæ, & debent decoqui ad consumptionem medietatis, deinde fiat colatura, & postea embrocatio. Ita etiam possemus dicere de Fomentatione, sed fomentatio fit cum spongia madefacta, aut filtro madefacto in prædicta decoctione loco patienti applicata. Et sic Deo duce imponimus huic tractatui finem.

MATHEI CVRTII SENTENTIA, An partus ante septimum Mensem editus, vitalis esse possit, vel ne.

DVO proponuntur nobis dubia determinanda. Primum de puella 170. die ab hora conceptionis nata, an possit esse vitalis. Alterū an licet omnino vitalis non sit, possit aliquo certo tempore viuere. Pro quibus dissoluenais dicam, in primis apud omnes tam recētiore, quā vetustiores receptum esse, quod annus sit tempus peregrinationis integræ Solis in circulo signifero, ac trecentum sexaginta quinque dies, & horas sex contineat. Annum quoque in Menses duodecim secari, Græci, Aegyptii, Hebræi, Athenæi, Macedones, Cyprii, Bithinii, Cappadoces, & Romani fatentur: licet menses variis nominibus appellent. Menses aliquando ratione Lunę dicuntur lunares: interdum ratione Solis nomen accipiunt, solaresque dicuntur. Mensis lunaris est tempus ab vno Solis & Lunæ concursu ad alium, qui dies 29. & horas 12. continet. De quo Gal. 3. de diebus decretoriis non longe à principio sic ait. Quod autem menstruum tempus non omnino triginta diebus cōstet, sed vnius diei ferè dimidio minus Hipp. integro vno libro demonstrauit.

Quin

Quin & vulgus propè vniuersum nouit mēsem alium, quem Græci *χηλὸν* nominant, quasi mutilum & imperfectum 29. dies obtinere, alium nempè absolutum 30. Nam vniuersos duorum mensium dies 59. esse oportet. Siquidem vterque omnino trigiuta minus altera dici parte: Quemadmodum igitur annum integrum Sol absoluit. Ita Luna mensem. Idem voluit Gal. primo de morbis vulgaribus com. 2. Sic habens, vt verè Palestini computant 12. menses, efficiunt dies numero tricenos quinquagenos quaternos. Nam cū tempus à Lunæ cum Sole coniunctione vsque ad aliā quanuis coniunctionem supra dies 29. alium præterea diem dimidium assumat: idcirco duos menses continentes quinquaginta nouem dies in partes diuidunt inæquales, atque alterum dierum 30. faciunt, alterum 29. Mensem quoque esse communem amborum, Solis scilicet, & Lunæ circuitum. Dixit Aristo. 4. de generatione animali cap. vlt. quòd est tempus ab vno Solis & Lunæ concursu ad alterum. Mensis igitur lunaris, de quo antiquiores Aristotele & Galeno loquuti sunt 29. dies & dimidium continet: id quod ab Hippocrate lib. de septimestri partu clarè dicitur, quando quinque menses dies centum quadraginta septem, & dimidium alterius dici continere dixit. Dixitque dies 59. duos menses perficere. Huncque lunarem mensem exquisitè, siue exactè mensem appellat Gal. 3. de diebus decretoriis versus finem. Mensis vero solaris est totius anni pars duodecima, siquidem apud omnes annus duodecim mensibus constat, & diebus tercentum sexaginta quinque integrum annum facientibus, sex horis additis, quorum pars duodecima triginta dies excedit. Duodecies namque triginta, tercentum sexaginta faciunt. Quia si ex duodecim mensibus, quinque
vnum

Mathei Curtii

vnum supra triginta dies contineant, & septem triginta tantum totus annus absoluetur, præter horas sex: unde singulis quattuor annis cogimur diem facere intercalarem, siue interpositum. Apud nos verò annum diducimus in menses duodecim, septem vnam supra triginta dies continent, quattuor triginta tantum, & quia ad absoluendum tercentum sexaginta quinque, viginti octo dies deerant, mensis vnus 28. obtinuit: alii verò vetustiores menses annum integrantes, vel 30. vel vnum supra 30. dies continere volunt: exceptis Palestinis, annum ex 12 mensibus lunaribus constituentibus, qui tercentum quinquaginta quattuor dies faciunt: & quia ad absoluendum tercentum sexaginta quinque dies, & horas sex, defunt dies vndecim, & horæ sex, sicuti cogimur nos singulis quattuor annis diem intercalarem facere: ita coguntur ipsi singulis viginti octo mensibus intercalarem mensem facere: ita vt in octo annis tres menses faciāt intercalares. Et proinde Gal. 1. de morbis vulgaribus de mensibus annum integrantes, quos solares appellamus: dixit non esse computandos pro Lunæ ratione, sed pro ratione Solis, cum inquit. Cæterum non sunt pro ratione Lunæ menses computandi, quòd iam multis Græciæ ciuitatibus est solene, sed pro ratione Solis apud omnes antiquiores, & nationes quàmplures nemerantur, subiungit quomodo Romani vniuersum annum in menses 12. diducunt, subinde quomodo Palestini, cuius verba superius posita sunt. Postea de Palestinis & eos sequentibus loquens, ait, quare quibus hæc est ratio, mesium aliquem facere intercalarem coguntur, vt præteritorum annorum reliqua cumulent, & tēpus fiat vnus mensis &c. & licet apud Palestinos, & Græcos tempore Galeni omnes lunaribus mensibus constitueretur, & tercentum

tum quinquaginta quatuor diebus absolueretur: apud tamen antiquiores, Hippo. scilicet, & multas nationes id non obseruabatur: Quum itaque Hippo. & Arist. locuti sunt de mense lunari 29. dies & dimidium alterius diei continente, & de mense solari 30. & plus obtinente, dubitari poterat de illa conclusione, quod natus citius septimo mense vitalis esse non possit: an de lunari, an de solari mense intelligerent. Remouet hanc dubitationem Hippo. in tractatu de Septimestri partu, in primis verbis dicens. Septimo mense natum eum intelligere, qui ultra centum octuaginta duos dies natus sit, nec non & ultra anni medietatem, quæ sex mensibus solaribus absoluitur: est autem anni medietas dies 182. & horæ quindecim, & proinde de mensibus lunaribus non esse conclusionem intelligendam; sex enim menses lunares 177. dies præcise continent, & si conclusio de mensibus lunaribus intelligeretur, posset natus die centesimo septuagesimo octauo vitalis esse, id quod Hippo. non admittit. Nos autem sumus in casu longè clariore, quia puella de qua quæritur, cum nata sit die centesimo septuagesimo, siue sententia Hippo. dicta, & Arist. 7. de historia animalium cap. 4. de mense lunari, siue solari intelligatur, puella vitalis esse non potest, quæ citius 7. mense tam lunari, quam solari nata sit. Nec ignoro præter dictum mensem lunarem Gal. 3. de diebus decretoriis ponere alios duos menses lunares, vnum integræ peragrationsis Lunæ in circulo signifero, qui dies 27. & horas octo continet. Alterum quo Luna manifestè illuminata in hæc agit inferiora, qui diebus 27. vel 26. cum dimidio, secundum varios respectus constituuntur. Et si de his mensibus Hippo. & Arist. sententia intelligatur, poterit natus 170. die dici natus 7. lunari mense, & sic vitalis esse:

D

ve-

Mathei Curtij

verum hoc ad rem nihil facit, quoniam Gal. primus ad inuestigandam causam, cur dies decretorii ponendi sint, illos duos menses posuit, de quibus neque Hippo. neque Arist. nec alii Gal. vetustiores vnquam loquuti sunt, sicut neque de causa dierum criticorum quicquam dixerunt. Non igitur eorum sententia de illis mensibus, de quibus nihil loquuti sunt, intelligi potest. Restat igitur conclusio apud Hippo. & Gal. clarissima, quod puella centesimo septuagesimo die ab hora conceptionis nata, vitalis esse non possit. Id quod alio fundamento diduci potest. Hipp. in tract. de alimentis 2. de morb. vulg. sectione 3. in 6. de morb. vulg. sectione 8. vult tria tempora in foetu considerata, primum formationis, secundum motus in vtero, tertium partus, quum tempori formationis additur duplum ipsius, fit tempus motus, quum verò id duplum, quod additur, triplicatur: tunc totum tempus motus duplicatur, & fit tempus partus. Quemadmodum si foetus 35. diebus, formatur 70. additis erunt centum quinque, & tunc incipiet foetus in vtero moueri: septuaginta verò triplicatis, aut centum quinque duplicatis, erunt dies ducentum decem, & septem menses integri ac tempus partus. Dixit Hippo. foetum formari 35. diebus, 40. & 45. citius diebus 35. non posuit. Auic. 2. 3. cap. 2. minimum tempus formationis masculi dixit esse 30. dies, & minus tempus partus medietatem anni. Foetus autem formatus trigesimo die, nonagesimo mouebitur, citius centesimo octuagesimo nasci non poterit. Quare puella, de qua dubitatur, vitalis esse non poterit, quum citius centesimo octuagesimo die nata sit, opus esse iuxta regulam hanc eam esse formatam citius triginta diebus. Nunquam autem visus est abortus ante trigessimum diem perfectè formatus,

vt

vt habetur ab Aristo. 7. de histo. animal. cap. 3. & 4. degenerat animal. cap. 6. Ad id accedit, quòd puella tardius in vtero quàm masculus formatur. Obiiciet fortè aliquis dicta Hippo. esse verificanda, vt in pluribus. Tamen si absolutè, & tanquam semper vera probata sint, vt clarè habetur à Gale. 7. de diebus decretoriis cap. vlt. & clarius 6. part. aphorif. 58. illa igitur conclusio, quòd natus citius 7. mense non poterit esse vitalis, verificabitur vt in pluribus, & aliquando raro poterit oppositum contingere. Nihil autem prohibet illud rarò contingens in casu nostro verificari. Item Hippo. & Arist. nullam afferunt rationem demonstratiuam ad conclusionem illam probandam, sed tantum quod longo vsu viderunt, asseuerant, ac si dicerent, nunquam visum citius 7. mense natum viuere, igitur natus citius 7. mense viuere non potest. Qui modus nihil concludere videtur, sicut priusquam morbus Gallicus accideret, non sequebatur, nunquam visum est aliquem morbo Gallico laborasse: igitur morbus Gallicus euenire non potest. Dicendum est Hippo. summas in aphorismis, licet non tanquam semper vere dictæ sint, verificari tamen vt plurimum id, quod clarè dicit Gal. locis adductis in libro de septimestri partu, & in aliis, quibus non aphoristicè, sed longiori sermone procedit, aliter tenendum est. Ratio enim diuersitatis est, quia sententiæ aphoristicæ breuissimo sermone sunt explicandæ. Ideo Hipp. in aphorismis non curauit id, quod vt plurimum, ab eo quod semper euenit discernere. In aliis autem libris, & præcipuè in de septimestri partu clarè distinxit, cum nanq; dixisset partum viuere natum 7. mense, & ex consequenti citius natum viuere non posse: subiunxit, quod licet nati mense septimo viuere possint, vt plurimum tamen moriuntur.

D 2 tur.

Mathei Curtij

tur. Ideo debuisset dicere Hippo. de natis citius 7. mense, si aliqui nati citius 7. mense vivere possent, sensus itaq; Hipp. est, quod natus 7. mense vivere possit, licet eo tempore nati ut plurimum moriantur. Ad aliud quod obiicitur, respondetur, in Philosophia & Medicina multa esse, quæ solo experimento sciri possunt, nec ratione demonstratiua probari valent, sicut quod omne rhabarbarum bilem trahendi vim obtinet, magnes ferrum, quod omnis ignis calidus sit. Hæc enim scita sunt, sed non alia via, nisi quia semper videmus, & experti sumus ita esse. Nunquam enim vidimus ignem non calidum: Rhabarbarum, quod vim bilem purgandi non haberet: Nec magnetem, qui ferrum non attrahat. Non enim ratione probare valemus ignem calidum esse, magnetem ferrum attrahere, sed id tantum sensu & experimento concludimus, quod aut de morbo gallico dicitur, nihil ad rem facit, quia in his, quæ a casu fiunt, ut morbi, & his quæ ab arte, aperte concedimus aliquid de nouo fieri posse, & videri quod nunquam factum sit, & nunquam fuit. Quis enim dubitat monstrum fieri posse, quod nunquam fuit, & medicinam aliquam compositam ex variis simplicibus fieri, quæ nunquam fuit? quoniam tales compositiones infinitis modis variari possunt: secus autem dicendum est in rebus, quæ fiunt a natura, si vnquam dari posset ignis non calidus, aliquando talis visus esset, & si dari posset magnes sine virtute attractiua ferri, aliquando id experientia deprehendere licuisset, pari modo si fieri posset naturaliter, ut natus citius 7. mense viueret: iam quandoque istud experientia compertum fuisset: propositio namq; vniuersalis inductiuæ in omnibus suis singularibus, cuius oppositum non valet intellectus ratione concludere, pro principio certissimo tenenda est, sicut quod

quod omnis ignis calidus sit, & quod natus citius septimo mense viuere nō possit. Nunquam enim vidimus ignem non calidum, nec intellectus ratione concludere potest, ipsum viuere posse. Igitur tenendæ sunt eæ duę propositiones certissimæ, & tantam certitudinem habebimus, quod natus citius 7. mense, non viuat, sicut quod omnis ignis sit calidus, vel quod omnis magnes ferrū attrahat, vel quod oē rhabarbarum bilē purget.

Quod ad secundum dubium attinet Hippo. 3. part. apho. 12. in anni quadam constitutione dixit. Mulieres, quibus partus ad ver inest, ex quacunque occasione abortiuntur. Quæ verò pariēt, imbecilles & morbidos pariunt infantes, quare vel statim intereunt, vel tenues, & valetudinarii viuunt: contra, distinguit Hippoc. abortum à partu, adeò vt quæ abortiunt, non pariant, & quæ pariunt non abortiant, vt abortus sit intēpestius partus, non tamen sit absolutus partus, sicut homo mortuus non est homo. Idem habetur 5. part. aphorif. 5. 4. Gal. vero 15. de vsu part. cap. 7. vult partum esse, imò fœtus adeo perfectus est, vt ab vtero prodiens per os nutriri valeat. Quando verò nondum in tantam deuenit perfectionem, non partus, sed abortus erit. Quare qui intempestiuè, siue abortiu ex vtero prodeunt, non nutriuntur, nec viuunt, & proinde dixit Aristot. citius 7. mense prodiens, nullo modo viuere potest, si nullo modo constat, quod non per dies, cū nutriri non valeat. Qui vero in partu viui in lucem eduntur, & debiles admodum sunt, dicit Hipp. vel breui moriuntur, vel tenues & valetudinarii viuunt. Neque vitæ terminus certè dici potest, quoniam secundū quod natus imbecillior, aut minus imbecillis fuerit, ita longiori aut breuiori tempore viuere poterit. Quod verò abortiu, ex vtero intempestiuè prodire, non nu-

D 3 triri,

Mathei Curtii

triri, non viuere posse se inuicem consequantur, ostenditur ex Gal. qui part. 5. aphoris, 30. 33. 36. 37. 43. 52. 54. id quod Hipp. aborsum dicit, ipse foetus corruptio nem interpretatur, ita ut velit in omni aborsu foetum corumpi, & interire.

Ex his concludendum puto quod puella vigesima-
sexta Octobris 1539. proximè præteriti circa horam
quartam noctis concepta, & die tertiadecima Aprilis
anni 1540. hora 14. nata, non potuerit per dies viue-
re, & si vixerit, necesse sit fateri, quod citius concepta
fuerit, siquidem citius centesimo octuagesimo secundo
die ex utero prodiens, nec nutrir, nec viuere possit.
Dat. Bononiæ die VIII. Maii M D XL.

M A T H E I C V R T I I
Ticinenfis, Medici Excellentissimi,
De Febrium curatione.

Febbris calor est, non res calida, octauo de Ing.
primo & nono eiusdem xiiii. auctus & in ignem
mutatus primo Apho. xvi. non ex duobus compositus
cuius ratio colligi potest 1. Apho. xiiii. siccitati coniun-
ctus, 1. Apho. xvi. 1. regim. acut. xviii. & xii. & ix.
de Ing. xiiii. in corde accensus, 1. de diff. Feb. iii. & per
totum corpus transmissus viii. de Ing. in principio, 1.
de Accid. v. nisi impediatur, sicut est in Epiala ii. de dif-
feren. feb. vi. & in Liparia in lib. de inæq. int. lædens
operationes, nedum naturales, sed etiam motiuas, quia
hoc cuilibet conuenit ægritudini, in lib. Artis medi-
cinalis lxxxii. non enim æger est, nisi decumbat 1. de
dieb. criticis vi. vnde dicitur viii. de Ing. 1. quod im-
pedit ægrum, & per eam vehementer tristatur. Quæ
qui-

quidem caliditas debet esse perseverans, 1. de differē. feb. iii. non sicut caliditas irę & laboris, quando adhuc nō est impressa caliditas in facto esse in corde. Debet enim caliditas febrilis ponere in calefacto esse partem aliquam cordis. Omnis namque morbus debet esse in facto esse, secundo de accidentibus tertio. Hęc autem si salubris sit, quatuor vniuersalia tempora debet habere, sicut de omni morbo dicitur in de vniuersalibus morborum temporibus, verum est, quod aliquam potest habere imperceptionem, quod si sit insalubris, declinationem non habet 2. de Crisi. v. & ix. Ista autem quatuor tempora sunt principium, augmentum, status, & declinatio, & possunt attendi penes digestionem. Et est principium quando apparent signa occultę digestionis: augmentum quando manifestę: status quando completę: declinatio quando fit expulsio, sicut patet primo de Crisibus xvii. & xviii. Penes essentia vero & accidentia quando incipiunt est principium: quando augentur est augmentum: quando in maximo sunt vigore est status 1. de Crisibus iii. quando declinat, est declinatio. Tempora autem ista coincidunt in morbis reseruantibus, non aut in non reseruantibus iii. regim. acut. vltimo, in non reseruantibus enim tempora quoad essentiam & accidentia, præcedunt tempora quoad digestionem, & sicut sunt quatuor tempora vniuersalia, ita etiam quatuor tempora particularia in illis, quę habent paroxysmos: verum est quod secundū Gal. in de tēporibus paroxysmorum possunt fieri sex, numerando totum circuitum, cum infebricitatione, si in principio sit quō pulsus. Nam est principium inæqualitas, augmentum, status, & declinatio, & infebricitatio. Quod si sub augmento ponatur inæqualitas, & nō numeretur infebricitatio, erunt tantum quatuor, sicut

Mathei Curtii

vniuersalia, quod non sit, quia realiter principiū ab aug-
 mento non distinguatur, & sic sunt tantum tria non nu-
 merando in febricitationem, sicut est in illis, quæ ad ip-
 sam non terminantur. Hęc autem à Galeno in lib. de
 quatuor tēporibus paroxysmorū. Cognoscuntur au-
 tem tempora ex natura morbi 1. Aphor. xii. 1. de Cri-
 sib. ix. ex dispositione materię peccantis, 2. de diff. feb.
 8. tēpore anni, 2. Apho. xxv. ex anticipatione 1. Apho.
 12. primo de Crisibus iii. ex euacuatione, 1. Epid. in
 commento primi infirmi. In febres autem incurrunt
 ex causis extrinsecis calefacientibus, maxime in ephemeram,
 & magis sunt parati cholericī 8. de ingeniis 7.
 & 8. infrequentius tamen sunt febricitantes sanguinei,
 quia magis incurrunt putridas, viii. de Ing. 7. & ferē
 æque similiter in ephemeram, sicut cholericī. Sic Auic.
 prima quarti cap. de præparatione ad febres præponit
 corpora calida & humida. Quoniam autem si debet
 esse febris calor in facto esse inductus esse debet, &
 quoniam vt dicitur vi. Epid. part. vi. cap. 8. in nobis mē-
 bra sunt in triplici differentia, scilicet solida, quæ conti-
 nentia appellantur, humores qui dicuntur contenta li-
 quida, & spiritus, quidem contenta mobilia appellantur:
 Ideo sunt tres species febris diuersificatæ, secun-
 dum subiectum positū in calefacto esse, 1. de diff. feb.
 1. licet enim calor in febre debeat esse in toto, tamen
 sufficit quod in facto esse sit in vna parte cordis, & to-
 to ei correspondente. Si ergo sit in spiritibus, dicitur
 ephemera: si in humoribus, putrida: si in solidis sit,
 hectica: dicitur autem quando est in humoribus, pu-
 trida, quia humores omnes quādo in eis est calor febrilis,
 putrescunt, excepto aliquando sanguine, sed habet
 naturam ephemerarum, ix. de Ing. 1. variæ aliæ dan-
 tur febris diuisiones ab Hipp. vi. Epid. part. vi. tex. 16.
& à

& à Gal. 1. de diff. feb. 1. Sed istam diuisionem sumptam à Gal. à materia accipiemus, & penes ipsam omnium febrium, secundum mentem Hippo. & Gal. curationes explicabimus. Ab ephemeræ igitur curatione exordiamur.

De Febre ephemera, & eius curatione.

Ephemera febris, est calor in spiritibus impressus in calefacto esse, sicut primo de diff. feb. attestatur Gale. quæ si non committatur error, de se vnum diem non pertransit, tertio de Ing. in principio, & x. eiusdem secundo de causis procatarcticis fit primo de diff. feb. 3. & 2. de Crisi. ultimo. In ipsam incurrere parati sunt, qui complexionis sunt calidæ, & siccæ, s. de Ing. 8. Cognoscuntur autem ephemeræ ex istis signis, primo quod sunt à causa procatarctica, secundo quod habent ferè vrinas similes sanis, & digestas, tertio quod pulsus in declinatione sit similis sano, quarto quod calor sit suavis ad tactum, quinto quod in statu non sint sæua accidentia, sexto quod in declinatione appareat quedam irroratio ex superfuitatibus tertix digestionis. Et hæc omnia colliguntur à Gal. in primo art. curatiuæ ad Glauco. 2. & secundo de Crisi. ultimo, & primo de diff. feb. septimo & octauo de Ing. quarto.

In eius curatione sic est procedendum, quando principaliter in febribus à tribus indicationem sumamus, à causa morbi, à morbo, quæ de sui remotione indicat, & à virtute, quæ de sui cōseruatione, ut ostēdit Gale. 10. de Ing. 1. Parū de curatione eius curamus cū salubris sit, & omnibus nota, quæ & facile tolli potest, pariter ēt de virtute, quia ea est salubris, & virtutē nō proster nit. Ideò omnis cura ferè ab ipsa febre sumitur, sicuti
deci

Mathei Curtii

decimo de Ing. primo dicit Gal. Quum autem febris, vt febris, sit calida & sicca, sicut primo de regim. acut. 18. 43. & primo Apho. 16. dicit, & quum omnis cura fiat per contrarium 8. de Ing. primo, ideo de infrigidatione, & humectatione indicat, vt de Ing. 14. In hac cura quum principaliter infrigidare, & humectare intendamus. Aer ipse, à quo indicatio sumitur nono de Ing. 14. ostendit, quatum infrigidare debemus vel humectare. Si enim ipse calidus & siccus sit, maiori indigemus humectatione, & frigidatione, sin minus, minori. Quare si ipse calidus sit, debet ad frigiditatem alterari, nono de Ing. 14. Alterato igitur aere ad frigiditatem & humiditatem, si talis non sit, est eligenda domus, quæ talis sit: & Gal. dicit, q̄ debet esse subterranea, & versa ad septentrionem, aspersa cum rebus frigidis, vt rosis, camphora, & similibus: debemus respicere quæ eius causæ fuerint, quæ de sui remotione indicant, decimo de Ing. 2. quæ quidē causæ diuersæ, quomodo possunt cognosci, ostendit Gal. & in primo ad Glauco. 2. & secundo de Crisi. vlti. Si ergo fuerit in causa, Tristitia, debemus curare vt stent læti, si nimium Exercitium, debent quiescere, si Vigilia, debent dormire, & sic omnes causas debemus remouere per sua contraria, sicut octauo de Ing. tertio ostendit Gal. Remota causa (quod facile fieri potest, quum sit procatarctica, nisi sit oppilatio vel bubo, quum sæpenumero ista febris in hecticam vel putridam transeat, nisi curetur, vt in prima quarti tract. 1. cap. 5. refert Auic.) ipsi febri est attendendum: Hæc sunt ingenia, quibus vtimur in omni ephemera, sicut septimo Apho. 43. colligere possumus, verum vt dicit Paul. lib. 2. cap. 16. debemus variare & applicare, secundum q̄ à diuersis procedit causis. Nā aliquando in principio cōueniunt, vt si exustio
ne

ne facta sit, aliquando in declinatione, tamen & facta digestionem ut in catarrho ponitur, aliquando maiori aqua est levandum, aliquando minori, aliquando magis in vna mansione balnei, aliquando magis in alia debet stare, quas mansiones & virtutes x. de Ing. xi. enumerat Gal. unde sicut aliquando, secundum quod maiori humectatione, vel instauratione, vel sudore indigemus plus, vel minus: potest modo in vna, modo in alia sede stare æger. Sed quoniam nostris temporibus ordinata balnea non habemus, debemus facere ut melius possumus in domibus ordinare, nec ea in Ephemeris (in quibus præsentaneum sunt remedium) dimittere, sicut in primo art. cur ad Glauc. cap. 2. Præterea post balneum, est inunctio, quam in primo ad Glau. laudat Gal. oleum autem non debet esse frigidum, quia ut patet tertio reg. acut. 42. constipat, & sic esset periculum conversionis in putridam, sed debet esse tepidum, & miscere cum aqua tepida. Sic enim, ut dicitur secundo de Simp. 24. maiorem facit humectationem, & quoniam intentio omnis est resoluendi illos spiritus incensos, laudant Doctores frictiones, quæ diuersæ sunt, ut secundo de tuend. sani. patet, & secundum quod diuersæ diuersos habent effectus, semper tamen aliquo modo conueniunt, sic ergo balnea, frictiones, unctiones, omnibus conueniunt ephemeris. Ultima intentio est de cibo & potu, Gal. primo de diff. feb. ad Glauc. secundo laudat vinum in omni ephamera, & in 8. de Ing. tertio modo sit pauciferum, sic enim magis excretionem expellit: si ergo febris sit in corpore calido & sicco, & cum illis conditionibus, quas enumerat Gal. 8. de Ing. secundo, tunc in principio debemus dare panem maceratum in vino, sicut ibi fecit Gal. quod si non sit tale accidens, prius est balneandus, post dandus cibus primo art. cura. ad Glauc.

Mathei Curtii

Glauco. secundo : cibi autem, qui conueniunt, sunt primo ptisana alica cum pauco aceti, non crassa, pisces saxatiles, q̄ si illos habere non possis, sumendi sunt illi maxime qui non sunt in lacu, vel in oribus fluminum. Item perdices, passerres, pulli gallinacei, phasiani, pulli columborum, & alios possumus dare cibos, quos enumerat Gal. 8. de Ing. secundo. Panis quoque conuenit in furno coctus : dicit ibi Gal. & sic possumus vti his cibis, & dare magis & minus, secundum diuersas causas vnde si sit ex nimio labore, vel inedia, est dandum tantum cibi quantum potest digerere, si ex bubone, parū, si ab aliis causis, est dandus cibus mediocriter, q̄ si fiat ex obstructione, tunc dicit Gal. 8. de Ing. secundo, oportet primo vti phlebotomia, aliter alia remedia essent vana, q̄ si videamus dicit Auic. in cap. 23. q̄ sit potius oppilatio propter crassitiem materiæ, quam propter multitudinem, sic est melius vti aperientibus & incidētibz, sicut dicit Gal. ex oxymelire, & possumus miscere aliquas herbas, vt calamēthum, & pulegium, nisi sit timor nimix caliditatis, & debemus vti semper cibis aperientibus, sic enim curando ephemeram, dicit Gal. primo ad Glau. 2. remanet post 24. horas æger in totū liber cum omnibus dispositionibus sanis, & sic prohibemus, q̄ fiat interpolata putrida, quia in infebricitatione non sunt ægri in totum similes sanis. Hæc sunt, quæ conueniunt communiter omnibus ephemeris, quæ autem conueniunt singulis speciebus, vide apud Auic. hæc sunt procura ephemeræ secundum Galenum, quæ omnia etiam refert Auic.

De Febribus putridis.

Quatuor sunt in nobis humores, qui sua multitudine,

ne, vel crassitiæ, oppilationem in corpore nostro faciētes, prohibent caloris naturalis transpirationem, quo non transpirante calor noster fit extraneus, eo autem extraneo existente humorem magis aptum putredini, putrefacit: humor autem putrefactus febrem, quæ putrida dicitur, generat. xi. de Ing. 8. sine oppilatione. n. non fit febris putrida, 1. de diff. feb. tertio, nisi præcedat ephamera, vel per attractionem aeris putridi. In his namque casibus potest fieri putrida etiam non præcedēte oppilatione. Isti ergo humores non excitant febrē, nisi putrescant, 2. de diff. feb. 8. excepto sanguine x. de Ing. 3. Quum autem putrescunt vel intra venas, vel extra putrescunt: si intra, faciunt continuas 2. de Crisi. 12. & 2. de diff. feb. vlti. si extra, faciunt interpolatas, 2. de diff. feb. xi. & si intra, venas putrescunt, vel sunt in venis magis propinquis cordi, & faciunt continuas, si ne manifestis excrescentiis, vel in venis parvis remotis à corde, & sic faciunt continuas cum manifestis excrescentiis, 2. de diff. feb. vlt. q. si extra venas, vel est cholera, & sic faciunt tertianā: vel est phlegma, & sic quotidianam: vel est melancholia, & sic quartanam, 2. de diff. feb. 2. Sanguis non putrescit extra venas, solum intra venas, 2. de diff. feb. 9. Sed non facit febrem purā secundo de Crisi. 12. sic. s. quod tantum appareāt signa sanguinis, sed apparent etiam signa cholerae, 2. de diff. febr. 9. Isti quoque humores, vel sic putrescunt, q. tantum vnius humoris signa apparent, & sic fiunt febres puræ, vel apparent signa duorum humorum, & dicuntur nothæ, vel compositæ secundo de Crisi. 12. Accessiones tolluntur, secundum q. per partem post partem materia acceditur & expellitur, sicut patet in exemplo de stercore columbino, 2. de diff. feb. 5. vel secundum q. aggregatur tanta materia, vt possit stimulare virtu-

ten

Mathei Curtij

tem expulsiuam, 2. de diff. feb. vlt. hinc est, quoniam cholera hæc potest facere de tertio in tertium phlegma, quotidie melancholia, de quarto in quartum; hinc est q̄ febris à cholera est tertiana, à phlegmate est quotidiana, à melancholia quartana. Variantur autem paroxysmi, & fiunt maiores vel minores, secundum materie dispositionem, & virtutum naturalium fortitudinem, vel debilitatem, 2. de diff. feb. xi. Hæ sunt omnes species febrium putridarum, quarum cum rationes explicaturus, à cholericis, & inter cholericas ab interpolatis, & primo à pura exordiar.

De tertiana pura, & eius curatione, & in fine de tertiana continua.

Tertiana pura, quæ ex cholera fit extra venas putrescente, 2. de diff. febr. 2. & vlti. per membra sensibilia delata, 2. de diff. feb. 3. quando eius signa tantum apparent non alterius humoris, 2. de Crisib. 12. & de se de tertio in tertium affligit. Primo ad Glauc. cap. de signis febrium intermittentium, cognoscitur, quoniam septem periodos non transit, quarto Apho. 59. inuadit magno cum rigore, cum punctura rei calidæ, non cum magno frigore: terminatur per sudorem, vel per vomitum bilis, vel per vtrunque, calorem habet plurimū & acrem cum siti magna in principio, quæ post sit mitis 12. horas, non transit eius accessio ad perfectam terminatur in febricitationem, pulsus in inuasionem habet tardos, debiles, paruos, ac raros: nec aliam habent inæqualitatem, nisi quæ communiter est in omnibus febribus, & tandem in statu habet magnos, calidos, vehementes, veloces, & frequentes sine inæqualitate. Tantum habet eum, qui sequitur omnes putridas, scilicet q̄
sy-

systole sit velocior diastole, vrina est subrubea, vel sub flaua. Aduenit autem in complexione calida & sicca, regione pariter & statu cœli calidis & siccis, in iuvene exercitato, quādo vigilauit, laborauit, tristatus est, multum cogitauit, & paucō vsus fuerit cibo. Hæc sunt signa, quæ omnia vel plurima tertianam puram sequuntur, sicut colligere possumus à Gal. primo ad Glauca. capite de signis feb. intermittentium 4. Apho. 59. secundo de diff. feb. 3. secundo de Crisi. 3. & hæc febris de se periculo vacat, 4. Apho. 42. Curando ergo tertianam puram sic debemus procedere.

Cūm, vt dicit Galenus de constitutione artis medicinæ 13. & 14. in omni ægritudine debeat Medicus elicere intentiones curatiuas : secundo videre an illud fieri possit : tertio cum quibus instrumentis : Ideo primo oportet videre à quo sumantur indicationes curatiuæ in tertiana pura, & quoniam ipsa curari potest, quibus instrumentis vti debemus. Intentiones omnes curatiuæ summuntur à morbo, & à causa morbi, & à virtute, dicit Gal. 10. de Ing. primo virtus indicat de sui conseruatione, quæ fit cum similibus, 9. de Ing. 14. Morbus autem, & causa morbi de sui indicant remotione, 10. de Ing. primo Ceterum quando morbi, ac sui causa sæpe indicant de oppositis remediis : ideo videndum est à quibus primo est incipiendum. Gal. tertio de Ing. & 12. dicit, q̄ tria sunt, quæ indicant q̄ ab eis incipere debemus, scilicet illud quod habet rationem causæ, illud quod magis vrget, & illud sine quō non. Cæterū quoniam in tertiana pura, quum de se sit salubris, quarto Apho. 43. morbus ipse nec sua symptomata plurimum vrgeant, ideo ab ipsa causa (sine cuius remotione non potest curari febris) est incipiendum. Quum igitur visum sit à quibus sint sumendæ indicationes, à quibus

Mathei Curtij

quibus (primo modo etiā supposito, quòd hoc sit possibile) reperienda sunt remedia, primo pro virtute cōseruanda, quæ sunt similia complexioni, ætati, & consuetudini, nono de Ing. 14. hæc quæ sint patebit, quoniam loquitur de rebus non naturalibus. Veniendum ergo est ad remedia, quæ conueniunt ratione causæ: Causa tertianæ puræ, est cholera, sicut patet secundo de diff. feb. ultimo, & secundo de Crisi. 3. & sic est materia: Materia autem in cunctis morbis quædā est putrefacta, quædam in putrefieri, vnde debemus educere eā, quæ est iam putrefacta, & curare ne alia putrescat, xi. de Ing. 9. Duo vero ingenia sunt magna, quibus educimus materiam peccantem, phlebotomia, & pharmacia, 2. Apho. 29. Quum ergo est intentio de phlebotomia, & pharmacia, à phlebotomia est incipiendum, sexto Epid. parti. 1. lib. 5. Cuius rationem reddebat Gale. in lib. de dignosc. affectibus renum, quia sic melius humores per pharmaciam possunt educi, & hoc faciebat Hippo. quarto regi. aut 19. & 28. hoc tamen est interdum non existente maxima humorum inæqualitate, sicut dicit Auic. quarta sen primi cap. 5. quia tunc est incipiendum à pharmacia, sicut faciebat Gal. quinto de Ing. 14. & hoc est, quia virtus in principio oppressa ab humorum cacochymia non constaret, supposito tamen q̄ in tertiana pura non sit ista magna inæqualitas, ab ipsa est incipienda phlebotomia. Quum igitur natura est aggrauata, tunc est fienda phlobotomia, sicut de omnibus putridis dicit Gale. xi. de Ing. 15. Dico quando natura est aggrauata, quoniam non credo, q̄ simpliciter in omni pauca putrida sit fienda phlobotomia, quod ostendunt verba Gal. ibi quando dicit, vt natura deoneretur. Quum ergo natura est aggrauata, & æger transit 14. annos, quia prius non conuenit xi. de Ing.

Ing. 14. Quantitas autē sanguinis est sumenda à complexione, ab aeris statu, & regione, quæ enumerat Gale. xi. de Ing. 14. quod si omnia, quæ indicant de non mittendo sanguine, sint simul, nullo modo est fienda phlebotomia: q̃ si aliqua sic, aliqua non magis & minus fienda secundum dispositionem illarum conditionum, non tamen est fienda vsq; ad syncopim, nec multū copiosa, vt relinquatur aliquid pro virtute, ex quo possinus vti remediis aliis, dicit ibi Gal. Quum igitur fienda est phlebotomia, primum est videndum, an sint plurimi succi crudi, indigesti in stomacho, & intestinis, quia tunc non conuenit, 9. de Ing. quinto: illis ergo existentibus, sicut communiter modo fit, quia homines vtuntur inordinato regimine, & non habent beneficiū ventris, tunc primo est prætermittendus clyster cōmunis, vel illud, quo utebatur Gal. x. de Ing. 9. scilicet ex aqua, melle, & oleo, q̃ si etiam post clysterem, aliquid in stomacho remaneat, vel in intestinis superioribus, quia clyster non ascendit ad illas partes, 5. de Ing. xi. xiii de Ing. dist. 3. nono nisi per accidens sexto de accidentibus secundo, tunc quoniam illud quod est in illis partibus educitur per exhibita per os, quinto de Ing. xi. est danda medicina, quam vocant lenitiuam, & danda cassiæ vncia, vel duæ vnc. mannæ, q̃ si videmus, q̃ æger de se non facile soluitur, possumus addere stimulum, vt vnc. i. ellest. rosati Melue, & hæc in principio conueniunt, quia non agitant: dare autem debemus talia lenitiua per aliquod tempus ante cibum, puta per horæ vnius dimidium, sicut colligere possimus 2. de alim. cap. de prunis. His igitur remediis, eductis materiis, existentibus in stomacho & in intestinis, stomacho non pleno, sed vacuo, primo regim. acut. 33. est fienda phlebotomia, post per horas duas dandus est cibus

E

cōue-

Mathei Curtii

conueniens. Deonerata igitur natura per phlobotomiam, possumus vti leuiter prouocantibus sudorem, vrinam, vel vomitum, si natura tentet, vt quod putrefactum est, educatur, sicut facit Gal. secundo de Ing. 9. dando ptisanam, quæ hæc omnia potest facere, pariter mulsam, oxymelli decoctum, apii, & similia. Cæterū si ista non omnem materiam peccantem educere possunt, ad pharmaciam est veniendum. Sed quoniam raro est pharmacandum in principio, 1. Apho. 24. Sed digesta materia 1. Apho. 22. Imo nō apparente signo manifestæ concoctionis non est pharmacandum. Est ergo expectandum signum digestionis sic, q̄ materia appareat manifestè digesta, & hæc digestio fit à natura primo prognost. vltimo, & fit incrassando, secundo prognost. 33. & sic separando bonum à malo, quam tamen poterit etiam iuuare Medicus cum rebus roborantibus calorem naturalem, vt alterando & remouendo calorem præternaturalem, & confortando naturalem. Quum igitur signum manifestæ digestionis apparet, tunc leui aliquo pharmaco poterimus iam putrefactā & digestam materiam educere. Vnde Gal. 1. ad Glauconem de cura tertianæ puræ dabat absinthium cum melicrato, hoc etiam tempore laudat Gal. ibi balnea aquæ dulcis calida, quia aliquid educunt & alterant, quia humectant, & corpora refrigerant, q̄ si fortioribus vti volemus solutius, expectanda erit & perfecta materiæ digestio. Cæterum, quoniam vt dicit Hippo. secundo Apho. 9. corpora quum quis vult purgare, oportet fluida facere, & hoc ibi dicit Gal. fit aperiendo vias, & secando humores, & hæc digestio est, Medici, ideo oportet prius ipsam sic digerere materiā, & hoc fit cum rebus aperientibus & incidētibus: poterimus ergo dare decoctum ex apio, ex anetho, sicut in primo
ad

ad Glauco. facit Gal. in cura tertianæ puræ, & post, secundum libitum, alias herbas poterimus miscere. Verum quoniam, vt dicit Gal. 10. de Ing. primo digerenda est materia, si possibile est, etiam habenda est cura de morbo, & quoniam ista febris indicatio sumpta ad ipsa indicat de maxime frigidis, vt in primo ad Glau. dicit Gal. in hac cura, ideo cum aperientibus & incidētibz, quæ calida sunt primo Apho. 24. poterimus admiscere aliqua frigida, vnde si volumus facere syrupū, sumemus vnc. i. syrupi de endiuia, cum alio syrupo incidente, iungendo aquas, non tamen maxime incidentes, quoniam iste humor, quum de se sit subtilis non indiget maxima incisione, & eam debemus euitare ratione febris. Facta ergo digestionē materiæ, quando scilicet apparēt signa manifestæ digestionis, reſeratis humoribus, & apertis viis, tunc si natura materiam euacuat (perfectum enim est, quod quantum ad istam intentionem faciat Medicus, 1. Apho. 20.) quod si ipsam euacuationem tentet, & non perficiat: tunc sequendo motum materiæ, si sit per conuenientes regiones, primo Apho. 21. est euacuaudum. Si ergo ipsa tentet vomitum, vomitiua sunt exhibenda, si secessum, purgantia per secessum, q̄ si ipsa non tentet, licet bilis conuenienter educatur per vomitum, 4. Apho. quarto, tamē quia vomitus est motus præter naturam, melius erit eam educere per secessum, sicut etiam dicit Gal. in hac curatione. Medicamentum autem commodum in hac curatione est rhabarbarum, vt dando eius drag. i. scilicet in infusione, vel secundum diuersas intētiōes vnc. i. cassiæ & drag. ii. electuarii rosati Mesue: Debet autem dari tale medicamentum ieiuno stomacho, & completa digestionē, sicut dicit Paulus lib. vii. cap. vi. puta in summo mane, quo dato, si sit debilitas stomachi, vel

Mathei Curtii

timeamus ne aliquid inhereat gulæ, danda est subito
ptisana, secundo regim. acut. 22. & in lib. quomodo, &
quando purg. 9. licet forsan tale periculum non sit in
istis medicamentis benedictis, q̄ si daremus fortiores
medicinas, à quibus tamen quantum possumus, est ab-
stinendum, sunt admiscendæ res odoriferæ, secundo re-
gi. acut. xi. & in lib. quando purgare oportet, quando
vero medicina incipit operari, tunc nihil est dandum,
nisi completa operatione, secundo reg. acut. 12. imme-
diate tantum debet dormire, vt melius medicina actue-
tur dicit Auic. quarta primi, cap. vltimo. Quum vero
incipit operari, tunc amplius non est dormiendum, sed
leuiter deambulandum, quarto Apho. 14. perfecta o-
peratione cibandus est æger, secundo regim. acut. xiii.
dum autem sit digestio leuibus clysteribus est vtendū,
dicit Gal. primo ad Glau. cap. proprio, maxime si æger
non habet beneficium ventris: his autē omnibus per-
actis cum iunctionibus rarefacientibus, cum frictioni-
bus, cum prouocantibus sudorem, & vrinam, poterim-
us curare, vt excernantur etiam superfluitates tertiæ
digestionis, & si aliqua pars materiæ restiterit, educa-
tur, quia aliter quæ restarent, possunt facere reciduiam
secundo Apho. xii. & quoniam in istis febribus propter
decursum flauæ bilis, sæpe patitur stomachus, ideo po-
terimus vti confortantibus stomachum, vt speciebus
diarrhodon abbatis. Hæc sunt instrumēta, quibus vti
debemus indicatione sumpta à causa in hac ægritudi-
ne. Quantum autem ad morbum, est affectus præter
naturam, vt dicit Gal. in de symp. diff. primo: Omnis
autem talis affectus indicat de sui remotione per sua
contraria, octauo de Ing. 1. morbus iste est calidus &
siccus primo regim. acut. 18. & 41. Imo indicat de re-
bus frigidis, & humidis, 9. de Ing. 14. Et quoniam in
isto

isto morbo est intensa caliditas, secundo de Crisib. 3. & cura fit per contraria equalia in gradu tertio, techni 86. Ideo in eius cura uti debemus intense refrigerantibus, & humectantibus, sicut dicit Gale. 1. ad Glauco. de cura tertianæ puræ. Sed quo pateat quæ sint conuenientia in tali febris, percurrendum est per sex res non naturales: Virtus autem de sui conseruatione indicat, 9. de Ing. 14. quæ conseruatur etiam cum debito regimine sex rerum non naturalium: ideo pro complemento curationis est deueniendum ad sex res non naturales. Sex sunt res, quas Medici non naturales appellat, quæ si debite applicentur sanitatis causæ sunt, si indebitè ægritudinis. Quarum qualitas, & quantitas, & tēpus in quo conueniunt, oportet Medicum considerare, sicut dicit Gal. in lib. artis medicinalis octauo: harum autem primus est aer, ut dicit Gale. nono de Ing. 14. quum semper nobis occurrat, nec vlllo pacto ipsum euitare possumus, & est vnus de illis, à quo sumuntur indicationes curatiuæ: ideo maximam curam de ipso habere oportet: quum igitur in egroto illam intemperiem tollere intendamus quod fit per contrarium, ut dicit Gal. in lib. de artis med. 86. & affectus iste sit calidus & siccus: Vnde debet declinare aer versus frigidum & humidum. Si ergo naturaliter sit talis, debemus illum eligere, q̄ si non habemus sic, ut communiter est, quando fiunt istæ febres, debemus ipsum artificialiter facere, & hoc fit, ut dicit ibi Gal. eligendo domos subterraneas versus septentrionem, & spargendo eas cum rebus frigidis & humidis, sicut cum rosis, camphora, & similibus: & tamen debemus aduertere ne ille aer occurrat toti corpori immediate, quia sic augeret oppilationem, & per consequens febrem, sicut dicit Gal. decimo de Ing. 8. Secūdo est motus & quies

Mathei Curtij

quum motus sit causa caloris secundo Cœli 42. & in de morb. caus. secundo, ideo his maxime intendimus cuitare motum, ideo laudatur quies, potest tamē æger leui vti exercitio, ventre vacuo maxime in die meliori vt excernātur superflua tertiæ digestionis. Tertio est somnus & vigilia, quoniam somnus maximè facit ad digestionem, referente Arist. in de somno & vigi. Imo debemus curare, vt æger dormiat, quia ista ægritudo de se reddit hominem vigilem: debemus tamen curare ne dormiat in principio paroxysmi, sicut dicit Gale. secundo Apho. 1. Quarto est cibus & potus, duæ sunt res in ægritudinibus materialibus, quæ quantū ad cibum requirunt opposita morbus scilicet, & virtus, secundo regim. acut. 36. Virtus enim quum de sui conseruatione indicet, & aliquid semper à corpore nostro resoluitur, quod restauratur cum cibo: ideo ipsa de dādo cibo indicat, primo regim. acut. 43. Morbus autem quum de sui remotione indicet, 9. de Ing. 14. & hoc facit per digestionem, clysteres, fomenta, phlebotomiam, & pharmacum, 1. regim. acut. 43. cuius opus à cibo impeditur, ideo de non dando cibo indicat, 1. ad Glau. De cura tertianæ nothæ, vidēdum est quid magis referat Apho. 9. & taliter ordinanda est diætā, vt virtus stet per totum morbum, & in statu possumus vti tenuissimo victu: oportet ergo in principio crassius reficere, 1. Apho. decimo, ne post cogamur reficere in statu, quod perniciosum est, vt patet 2. regim. acut. 40. & infra: in ipso enim oportet vti tenuissima diætā, 1. Apho. 7. considerandæ tantum sunt conditiones, quas ponit Gale. primo regim. acut. 43. quia sic aliquando est cibandum, aliquando non: in ista ergo febre, quoniam de se nō transit 15. dies, vt poterimus subtili diætā, quia durabit vsque ad statum, primo crassius reficiēdo,

do, & semper attenuando, quando procedimus versus
statum, & tunc parum vel nihil dabimus cibi, ergo cō-
uenientes debent esse humidi, quia hoc est cōmune om-
nibus febribus, primo Apho. 16. non tamen tantum, si-
cut in aliis propter temperaturam quæ habet seruari,
tunc, vt 9. de Ing. 14. & id habet fieri cū subtili, in lib.
art. med. 86. Debemus ergo hæc examinare, & dare
cibos tantum, declinantes versus frigidum & humidū,
1. ad Glauconem de cura tertianæ puræ, quantitas au-
tem sit tanta, vt concoqui possit, sic quod duret virtus
cibi, ergo qui dandi sunt, vt dicit Gale. ibi ex oleribus
sunt atriplex, bliton, lapathum, malua, lactuca, cucurbi-
ta, possumus tamen nos eligere, quæ sunt in vsu, succū
ptisanæ, sorbitiones ex halica, pisces saxatiles, volu-
cria quæ habent molles carnes aliarum auium alas,
etiam gallorum testiculos dare possumus, & cerebrū
suillum, contusum ex carne paruorum animalium, oua
sorbilia maximè eorum vitellos. Ex fructibus possunt
gustare illos, qui non sunt difficilis concoctionis, vt fi-
cus in lib. de cibis boni & mali succi, & vuam bene ma-
turam: Oportet etiam vt abstineant ab omnibus cibis
maximè calidis & siccis, & hoc intelligitur in homine
delitioso, qui habet parū caloris naturalis, & si sit for-
tis complexionis, ac virtus sit fortis, tunc sufficit dare
succum ptisanæ vsquam ad crisim, dicit ibi Gal. vinum
in principio nullo modo conuenit, post autem potest
dari vinum aquosum, & tenue in pauca quantitate in fi-
ne tantum, potest tamen dari in maiori quantitate, di-
cit ibi Gale. ab aqua est abstinendum, & si est danda o-
portet q̄ sit cocta, quia de se nullum præstat iuuamen-
tum, sed multas noxas, vt dicit Hipp. tertio regi acur.
cap. de aqua. Hi sunt ergo cibi, & potus huic febre cō-
uenientes. Debemus etiam aduertere ne sumantur di-

Mathei Curtii

uerſi cibi, tertio regim. acut. 37. q̄ ſi ſint diuerſi, qui ſint
facilioris digeſtionis, ſunt permittendi, 3. regim. acut.
24. & ſecundo de alim. cap. de perficis, & plus dandū
in coena, quā in prandio, ſicut reddit rationem Gale.
6. de Ing. in principio autem paroxyſmorum à cibo
penitus eſt abſtinendum & in tota acceſſione, primo
Apho. 2. imo nec ante principium, ſicut ampliat Gale.
primo Apho. vigefimo, ſed in declinatione, vel melius
tempore in febricitationis, quia in hac febre eſt longū,
& quando eſt intentio, vel phlebotomiæ, vel pharma-
ciæ, vel clyſteris, vel ſedandi aliquem dolorem, ſi eſſet
abſtinendum eſt à cibo dum hæc ſunt, poſt eſt cibandū
ſi eſt neceſſarium, primo regim. acut. 33. quod ſi ſit in
æſtate, ſicut plurimum ſunt iſtæ febres, & æger diffici-
le ferat cibum, oportet in pluribus vicibus exhibere, &
parum, 1. Apho. 18. tertio regim. acut. 36. Quinto
ſunt ea, quæ retinentur, & excernentur, ſed de iſtis di-
ctum eſt, loquendo de intentionibus ſumptis à cauſa
morbi, debemus omni cura attēdere, vt pori ſtent aper-
ti, & in tempore debito vti mollibus frictionibus, &
inunctionibus, quæ vim habent euaporandi, & in tem-
pore debito vtendum eſt exercitatione. Hæc .n. ſunt
quæ faciunt tranſpirare corpus, vt dicit Gal. 6. de tuen-
da ſanitate. Habent autem abſtinere à coitu, quia mul-
tum nocet temperaturis calidis & ſiccis, ſicut ſexto de
tuenda ſanitate dicit Gal. Cætera autem, quæ conueniūt,
iam dicta ſunt. Vltimo ſunt accidentia animi, debent
qui tali febre febriunt, cauere ab omni immodico ani-
mi affectu, quia ſic alteratur ſtatus naturalis, vt dicitur
in lib. artis medicinalis 85. maxime ab ira, furore, &
inuidia, quæ calefaciunt & exiccunt, ſed debent medio-
criter lætari, quia ſic confortatur calor naturalis, & ex-
panditur, & ſic ſuas perficit operationes. Hæc autem
ſunt

sunt, quæ agenda sunt inter res sex, quas non naturales appellant. Restat vltimo correctio accidentium, symptomata aliquando tantum in morbis faciunt, vt dicitur 12. de Ing. in principio, q. oportet eis tâquam magis vrgentibus attendere. Cæterum quum istæ febres de se sint salubres, quarto Apho. 43. non habent ideo sæua accidentia tamen quæ hic sunt considerata, sunt rigor fortis, sitis, & calor mordax, qui etiam ab ipsa pēdet essentiam. Quantum ad rigorem, quoniam habendo curam ad ipsum remouendum, impeditur sæpe motus naturæ. Imo pro ipso non est vtendum fortibus remediis, possumus tamen curare, vt æger sit in lecto bene coopertus, & caleseat ante aduentum paroxysmi, quia sic calor naturalis est fortior, & nō tamen retrahitur, debemus aduertere, ne dormiat in principio, quia sic augetur rigor, secundo Apho. 1. curare etiam vt adueniat, ventre vacuo, 1. Apho. 19. pariter in ipso non est cibandum, primo Apho. 11. possumus etiam ponere circa ægrum pannos calidos. Sed reliqua omnia fortia remedia sunt omittenda. Quantum ad sitim, licet æger de se debeat euitare aquam quantum potest, tamen propter sitim aliquando concedenda aqua cocta vel cum hordeo, vel cum seminibus melonis, & similibus, quæ habent vim humectandi, & refrigerandi: potest autem aliquando degustare aliquos fructus, si non sint difficilis coctionis, primo ad Glau. in cura tertianæ puræ: possunt etiam vti aliquibus iulep. vt iulep rosato, & similibus. Debent tantum quātum possunt vitare narancia, granata, & similia quæ habent vim stypticam, quia cum eis augetur oppilatio, & per consequens febris. Quantum ad calorem, quia est de essentia febris, remitti non potest, nisi remouendo febrem, vnde debemus quantū possumus, euitare frigida actua
lia,

Mathei Curtii

lia, applicata extra, urgente tamen necessitate aliqua epithemata cordi applicare poterimus, eaque frigida, ut ex camphora, sandalis, & similibus iam apparentibus signis manifestæ digestionis. Sed hæc dicta sunt in intentione sumpta à morbo. Ibi enim debet de hoc esse sermo. Quod si est, est etiam prostratio appetitus est propter humores currentes ad stomachum, quibus ablatis per pharmacum, poterimus uti confortantibus stomachum, & extra iniungere factis, scilicet euacuationibus. Hæc sunt, quæ in cura tertianæ puræ, iuxta mentem Galeni, videbantur ponderanda.

De cura tertianæ continuæ.

Tertiana modo continua, quæ fit ex cholera putrescente in parvis venis, sicut dicitur secundo de diff. febr. ultimo, & cognoscitur, quia habet eadem accidentia, quæ habet tertiana pura, sed intensiora, eodem quoque modo curatur sicut interpollata, sicut prima quarti tracta. secundo cap 40. dicit Auicen. excepto, quod maiorē debes habere curam eius in infrigidando, & digerendo, sic ergo eadem remedia, quæ valent in pura, valent in continua, sed debent esse fortiora.

De tertiana notha & eius curatione.

Tertiana notha, quæ fit ex admixtione cholerae, & phlegmatis, quando ad vnam formam reducuntur, sic quod non seruetur modus præcisus affligendi cholerae, vel phlegmatis secundo de diff febr. 7. cognoscitur, quoniam eius paroxysmus duodecim horas, & septem periodos transit cum gravitate capitis, & extensione accedit: Rigorem habet longiorem, quàm pura, ne c
adeo

adeo auctum. Tarde in ea apparent signa digestionis, non eradicatur cum sudore copioso. Aliquando etiam non incipit cum rigore, caliditatem non habet multum augmentum habet inæquale in libro de quatuor temporibus morbi, accidentia minus habet sæua quàm pura. Hæc omnia colligit Auic. prima quarti tract. secundo cap. 4. Videndum est, quantum sit febris proxima puræ, & remota, & sic magis vel minus est varianda cura, à cura puræ, si enim sit remota parum, ab ipsa parum est deuiandum. Quantum ergo ad remotionem causæ, suppositis quæ dicta sunt in cura puræ, & sic ab ipsa incipiemus. Quoniam si istis febribus est etiam flegma quod peccat, cuius est magna copia in stomacho, & in intestinis, ideo i. ad Glauco. de cura tertianæ nothæ, est utendū non leui clysteri, ut ponendo in clysteri cassiæ, sicut dicit Auic. drag. 6. vel virtutē turbith, ut vnc. mediam diapheniconis, velelect. Indi, facto clystere, sequenti die poterimus dare lenitium, quoniam multæ sunt materiæ in stomacho educendæ, puta vnc. i. cassiæ, & si voluerimus adiungere stimulum, quia materiæ sunt crassæ, poterimus adiungere dra. i. vel electua. Indi maioris, vel agarici præparati, quod etiam habet prouocare vomitum, qui quidem maxime in hac cura confert, sicut dicit Gal. primo ad Glauco. de cura tertianæ nothæ, vnde maxime si natura tentet, poterimus ipsum in principio prouocare, propter phlegmata, quæ sunt in stomacho, ut dando vnc. 6. aquæ hordei calidæ cum pauco aceti, vel syrupi acetosi, vel cum pinna intincta in oleo, & cum similibus leuibus, quia fortia in principio non conueniunt, & si de se sequatur vomitus post cibum, opimum est. Quod si necessaria est phlobotomia, ut quando natura est aggrauata, & sunt aliæ conditiones, quæ indicant de phlobotomia, est siē
da,

Mathei Curtii

da, & quanto citius, eo melius : oportet tamen præmit-
tere clysterem, & maxime si non habet beneficium vē-
tris, & lenitium, si sint plurimi humorum crudi in sto-
macho. Quantitas autem cibi, dicit Gal. sit tanta, quā
tam exigit status coeli, considerando ea, quæ de mente
Gal. dicta sunt in cura puræ, facta phlebotomia venien-
dum est ad digestiua, quæ debent esse fortia propter
materiam multam & crassam possumus, ut dicit ibi
Gale. facere decoctum ex origano, hyssopo, & spica de
coquendo in debita quantitate mulsæ, & dare, verbi
gratia vnc. ʒ. vel ptisanæ succum cum pipere. Possu-
mus quoq; dare, ut dicit Auic. puta sumēdo syrup. ace-
tosi vnc. i. syrupi de duabus radicibus vnc. i. aquarum
apii, & foeniculi an. vnc. i. & med. Sic ergo proceden-
do semper, si eger non habet ventris beneficium, pote-
rimus uti clysteribus. In die infebrecitationis, apparē-
tibus signis digestionis, nō in principio, poterimus uti
balneo, dicit Gal. oppositum tamen dicit Auicē. Gal.
forsan intelligit, quando non est multum remota à pu-
ra. Auic. quando est multum remota, quia sua ratio tūc
valet. Nos poterimus securè procedendo, omittere
penitus, vel tamen uti in declinatione, sed in hoc tem-
pore scilicet apparentibus signis manifestæ digestio-
nis, poterimus uti prouocantibus vrinam, & sudorem
leuiter, sicut sunt illa, quæ sunt posita pro digestiuis, vel
addendo semina melonis, maiora, communia, vel uten-
do oxymelite, sicut dicit ibi Gal. & quum deuētum est
ad septimum diem, quia iam est consonum, q̄ aliqua
pars sit putrefacta pro eius educatione, poterimus uti
leui pharmaco, laudat Gale. & Doctores alii comam
absinthii, vel eius decoctionē : quoniam ut dicit Auic.
confortat stomachum, & educit materiam peccātem,
post iterum poterimus redire ad digestiua, & uti eis
do-

De Feb. curatione 31

donec appareant signa digestionis completæ. Hoc interim poterimus vti calefacientibus, confortantibus, quando prolongatur ægrotudo, dicit Auic. vt vngendo stomachum cum oleo absinthii, vel menthæ, vel actua liter applicando calida stomacho, vel faciendo emplastrum ex eis cum ligno aloes, pariter etiam poterimus applicare hepati oleum squinanthi, capparum, foeniculi, saluig, & similibus, vel ex similibus facere emplastra & etiam tollere tensionem hypocondriorum, si fuerit apparentibus vero signis manifestæ & completæ digestionis, & natura non completæ educente, tunc dicit Auic. oportet euacuare, & vtemur medicamentis educentibus choleram, & phlegma, puta dando drag. i. s. rhabarbari, agarici trochilcati vel in infusione, vel in substantia ~~vnt.~~ i. addendo parum spicæ, post drag. vi. cassiæ cribellatæ, & drag. ii. elec. Indi, vel diapheniconis poterimus vti. Poterimus quoque conficere pilulas ex rhabbaro, agarico, & dare puta drag. ii. Cæterum quoniam virtus est debilis, & ægrotudo longa: ideo non vna vice damus medicinam, quæ materiam peccantem totam debeat educere, sed damus medicinam, quam vocant fortem debilem, & quæ trahit à remotis, sed sit in pauca quantitate, puta in forma pillularum dando scrup. ii. chochiarum, & aurearum scrup. i. vel faciendo vt masticent drag. ii. rhabarbari. His datis medicinis, sequenti mane poterimus dare vnc. i. zucchini rosati, vel aromatici rosati, vel ex sandalis cum speciebus aroma. rosati conficere confectionem in morsellis, & dare omni mane morsellum vnum per horam ante cibum cum paucio vino aromatico, sic etiã cum frictionibus, cum debitis exercitiis, cum vntionibus aperientibus, cum aliquibus aquis factis cum radicibus communibus, cum seminibus maioris communibus:

Mathei Curtij

bus poterimus curare, vt insensibiliter, vel per sudorē, vel per vrinam excernantur superflua tertiæ digestio- nis, & hæc quantum ad causam remouendam.

Restat modo ordinare in sex rebus nō naturalibus. Quantum ad cibum, dicit Gale. i. ad Glauco. de cura tertianæ nothæ, q̄ cum cibo est providendum ne mor- bus augeatur, & tamen est etiam aduertendum, ne vi- res prosteruantur, quoniam ista febris de se est longa, & hoc est difficile. Nam inedię quantum prosunt co- ctioni morbi, tantum nocent viribus, cibi vero quan- tum vires augent tantum coctionem impediunt, opor- tet ergo Medicum cogitare vires ægri an sint validæ, vel debiles, & morbi magnitudinem, sic viribus existē- tibus fortibus, minus est dandum, si ægritudo sit ma- gna, si uero virtus sit debilis, plus est dandum. Vnde non limitata potest dari regula, sed saluatis conditio- nibus vniuersalibus, quas de mente Gal. adduximus in cura tertianæ puræ, quoniam in veritate morbus est lō- gus. Ideo oportet, q̄ diu seruetur virtus, & sic crassius poterimus reficere quàm in pura: oportet ergo, dicit Gale. non quotidie cibare, sed alternis diebus, vt bis in die infebrecitationis, tamen poterimus etiam cibare se- mel in die paroxysmi, & in declinatione, leuiter tamē, vt dando aliquam sorbitionem vel parum ptisanæ, vel panatellæ. Cibi etiam dicit Gale. ibi, non debent esse aquæ frigidi, sicut in pura, quia est maior intentio inci- dendi, & aperiendi, & minor remittendi calorem febrilem. Oportet quoque, dicit Auic. in principio crassius reficere, quàm in pura, quia est longior. Cibi autem qui dari debent in die infebrecitationis erunt, sicut oua sorbilia, contusum ex carnibus volatilibus, & illi om- nes quos enumerat Gal. in tertiana pura, sed in maio- ri quantitate. De vino nihil, dicit Gal. Paulus, & Auic.

Cre

Crederem, quum in principio non conueniat, apparen-
 tibus tamen signis digestionis, potest dari, & in maio-
 ri quantitate, & aliquantulum magis vinosum, quàm in
 pura, quia cibi conueniunt, & potus, qui iuuant excre-
 tiones, & magis vergunt versus calidum, quàm in pu-
 ra, poterimus tamen uti etiam aqua dummodo sit co-
 cta, ut cum aliquibus incidentibus, ut cum radice apii,
 vel foeniculi. Aer non debet tantum infrigidari, sed
 sit temperatus: vergat tamen magis versus frigidum,
 & humidum quàm versus calidum & siccum. Somnus
 sit temperatus, ut si est possibile, plus solito, quia iuuat
 concoctionem, quietem laudat Gal. in primo ad Glau.
 cap. proprio, quia facit ad concoctionem, & tunc debe-
 mus uti calefacientibus, & calefacere hypochondria,
 & curare ut pori stent aperti, & excernantur superflua
 nec retineantur excrementa, vel urinae, vel sudores, ac-
 cidentia animi, quæ aliquantulum calefaciunt apparen-
 tibus signis manifestæ digestionis, possunt concedi, quia
 tamen omnis motus animi non est in potestate nostra,
 & aliquando accidentia sunt maiora, quàm velimus: de-
 bemus curare, ne æger irascatur, dolore afficiatur, non
 inuidia crucietur, & similia, quæ possunt maxime agita-
 re. Sed aliquantulum lætetur, & sine tristitia viuat, sym-
 ptomata non sunt magna, nec sæua in hac cura, ideo de
 his pauca est habenda cura.

De Causo, & eius curatione.

Causus febris est ardens, quarto regim. acut. 14. pu-
 ra, quæ fit ex flaua bile, 3. regim. acut. ultimo, putrescē-
 te in magnis vasis, 2. de Crisi. 6. Et hæc est, quæ ardē-
 tissimam habet sitim, & calorem intensissimum, quar-
 to regim. acut. 13. non pura potest fieri ex phlegmate
 falso.

Mathei Curtii

falso, & dicitur spuria, tertio reg. acut. vlt. & quarto regimi. acut. 13. & hæc accidentia non habet adeo scua, potest etiam fieri ex cholera admixta phlegmati, quia vt dicit Gal. quarto Apho. 59. causus fit ab eodem humore, à quo tertiana q̄ si sit tertiana notha ex cholera admixta phlegmati, fit etiam causon nothus eodē modo. Cognoscitur ex duobus signis propriis inseparabilibus, præcipuè scilicet, quia cum eo est semper intensa febris, & clamosa sitis, dicit Gal. 4. regi. acut. 13. & hoc in summo in pura, remissius, in spuria. Pariter febrem habet continuam, & nunquam ad infebrecitationem desinētem, 2. de Crisi 3. & septimo, ex istis signis hoc est signum proprium, & inseparabile causonis, verum est, quòd sunt ista signa intensiora in vero causone quàm in spurio, 4. regi. acut. 13. Verus autem causon facit, q̄ corpus laborat lassitudine vlcerosa, 4. regim. acut. 2. & sequitur longum iter, longamq̄ sitim 4. regim. acut. 3. linguam habet asperam, siccam, & nigrā: ventrem morfu dolentem, deiectiones liquidas, & palidas, vigilias, & aliquando alienationes, 4. regi. acut. quarto, causon vero spurius habet aluum solutum, sitim magnam, linguam asperam, siccam, & saliam, 4. regim. acut. 13. vrinæ defectus, vigilias & refrigerata extrema. Hæc sunt signa ponentia differentias passionis, fit autem causon verus, maxime in iuvene, temperaturæ calidæ & siccæ tempore calido & sicco, exercitato quādo ieiinavit, regimine calido & sicco, qui fuerit vsus cibis calidis & siccis, secundo de Crisib. 30. & de se septem dies non transir, 4. Apho. 59. hæc sunt signa causonis. In cuius cura, maxima in cura puri, sic est procedendum, res omnes, quas considerare debet Medicus in alicuius egritudinis cura in triplici sunt differentia. Nam quædam sunt res naturales, quædam
non

non naturales, quædam præternaturales, sicut dicit Gale. 3. de Caus. pul. primo, ergo de istis in hac cura loquendo incipiemus à præternaturalibus. Res igitur præternaturales tres sunt, scilicet causa morbi, morbi, & symptomata, tertio de acc. 1. quæ omnes de sui remotione indicant. lib. de constit. artis med. 19. in horum autem remotione à magis urgente esse incipiendum, 7. de Ing. 12. Symptomata aliquando morbum augent, & virtutem prosternunt, & tunc ab ipsis est incipiendum, 12. de Ing. primo, quum tamen principalis, & regulata cura sit incipere à causa, si est possibile, ut etiam ibi dicit Gal. Ideo supposito, quod in hac cura, licet accidentia sæua sint, quæ tamen penitus virtutem non prosternant, ab ipsius causæ remotione est incipiendum, post de remotione affectus demum de ipsis loquendum symptomatibus. Remedia, quibus utimur in causa sunt phlebotomia, consistente virtute, cataplasmata, purgationes, digestiua, & similia, sicut dicit Gale. primo regi. acut. 43. quæ harum præcedere debeat, dictum est. Quum ergo Medicus adit febrientem hac febre, primo si sunt retentæ feces, ante cibum debet præparare clysterem, quem laudat Gale. vndecimo de Ing. nono, ex oleo scilicet, & aqua mellis, puta sumendo vnc. 6. olei, & tres vel quatuor aquæ mellis. Iste .n. clyster omnes habet intentiones, quæ in clystere desiderantur, intendimus enim remollire feces induratas, lubricare intestina, stimulare expulsivam, infrigidare & humectare in istis febribus, oleum stimulat & lubricat: aqua mellis abstergit, & remollit feces, & in ea nihil est, quod inflammet: facto clysteri in sero, sequenti mane, si sunt aliqui humores crudi vel indigesti in stomacho, & in superioribus intestinis, vel meseraicis per mediam horam ante cibum potest exhiberi medicamentum

F

tum

Mathei Curtii

tum, quod lenitium vocant, puta vnc. 1. cassiæ, vel vnc. 2. mannæ quod si volumus stimulare, possumus addere vnc. 1. elect. ros. Mesue. Possumus quoq; dare diapruni non solutiui vnc. 1. vel octo pruna cū aqua mellis, post bibendo decoctionis fructuum vnc. 3. syru pi violati, vel decoctionem mercurialis, vel infusionē tamarindorum in sero, post debet fieri phlobotomia per horam ante cœnam, q̄ si non sint retentæ feces, nec repletus stomachus, melius est subito vti phlobotomia, 9. de Ing. quinto, si igitur virtus sit fortis, & ætas patiatur, quia morbus est acutus, fienda phlobotomia sic, vt patet ab Hip. quarto regim. acut. 17. & Gal. in lib. de phlobotomia, q̄ si sit eger ante annos 14. tūc non est fienda phlobotomia, 11. de Ing. 14. tertio de Ing. dist. 3. cap. 5. in sene autem etiam septuagenario modo virtus constet est fienda, sicut fecit Gal. in lib. de phlobotomia, verum est q̄ in ipsis, quia calor naturalis est debilis, vt plurimum virtus non constat, quarto regim. acut. 17. & in lib. de phlobotomia, q̄ si virtus non constet, etiam penitus à phlobotomia est abstinendum, sicut in lib. de phlobotomia dicit Gal. si ergo est possibile, quando fieri debet, est fienda in hac febre ardenti vsque ad syncopim, primo Apho. 23. sic enim dicit ibi Gal. totus habitus corporis refrigeratur, & febris extinguitur, & sudores emanant, & aluus citatur. Quare plurimum signatur, vel saltem vehementia febris abscinditur, quod si tantam copiam mittere nō volumus, saltem debemus copiosè phlobotomare.

Quantitas autem sanguinis mittendi deprehenditur à regione, complexione, statu coeli, tempore annui, quod si omnia indicent de non mittendo sanguine, vt in complexione debili, regione calida vel sicca, tempore calido & sicco, tunc nō est fienda phlobotomia, 11. de
de

11. de Ing. 14. & primo ad Glau. de cura continuari,
 q̄ si omnia, quæ indicant de mittendo sanguine adfint,
 tunc, vt dixi, vel est mittendum vsque ad syncopim, vel
 copiose saltem, vt saltem mittendo lib. i. sanguinis.
 Si vero aliqua adfint, non est mittendus, sed magis &
 minus, secundum diuersitatem conditionum. Iste n.
 condiciones, vt dicit Gale. in lib. de phlobotomia non
 indicant per se de mittendo, vel non mittendo sangui-
 ne, sed de maiori vel minori quãtitate: sunt enim tres
 tantum condiciones, quæ indicant per se de non mittē-
 do sanguine, virtus scilicet debilis, etas non florens, &
morbis non indicans de sanguine mittendo, verum est
 q̄ si illæ aliæ omnes simul iungantur de non mittendo
 sanguine indicant, quas sub aere posuit Gal. quarto re-
 gi. acut. 17. Si autem sit maxima cholere abundantia,
 vel cum diminutione sanguinis, vel humorum crudo-
 rum copia, etiam non est fienda phlobotomia, quia sic
 virtus non constat, sicut in lib. de phlobotomia dicit
 Gal. sed est intentio de pharmacia. Quod igitur ad
 pharmaciam attinet, vel materia quæ peccat, est furio-
 sa vel non. Est autem furiosa quando est in motu in-
 differenter, vel ad loca expulsionis, sicut dicit Gal. octa-
 uo de med. comp. quando confecit hieram Themiso-
 nis, vt dummodo sit cum periculo, 4. Apho. 10. si ergo
 materia sit talis, indigesta debet educi, 1. Apho. 22. &
 24. & secundo Apho. 29. & 4. Apho. 10. si tamen est
 possibile, oportet vt digestionem Medicum aperiendo
 scilicet vias, & ressecando humores, & quoniam hæc
 habent fieri in paucio temporis spacio, ideo oportet vt
 multum calidis, etiam q̄ noceamus feбри, quia maius se-
 quitur iuuamentum nocumento, & hæc fit cum deco-
 ctione pulegii, origani, calaminthæ in melicrato, facta
 ista digestionem, si materia turgēt, est dandum medica-

Mathei Curtij

mentum, & cum præmeditatione dicit Hipp. 1. Apho. 24. non semper sic ad pharmaca solutiua in principio est recurrendum, dicit ibi Gal. bene omnia examinando, vt naturam infirmi, vtrum scilicet sit idonea purgationi, aut laboret multa cruditate, an habeat crudos, & tenaces cibos in stomacho, an habeat ilia extensa, & nimis calida, quia istis existentibus conditionibus, etiã si materia sit furiosa, à pharmaco est abstinendum, vt ego censeo. Quare melius est egrum mori ex malignitate morbi, quàm pharmaco eum interficere: in eis. n. vtendo pharmacis, & ars, & medicinæ vilescent, sicut dicit Gal. 11. de Ing. nono, q̃ si istæ non adsint conditiones, apertis viis, & refecatis humoribus, si est possibile, dabimus medicamentum. v. g. rhabarbari drag. 2. cassiæ drag. 6. elect. rosati Mesue drag. 2. hæc omnia educunt choleram, non tamen cum maxima agitatione, q̃ si esset etiam admixtum phlegma, possumus addere drag. 1. & sem. agarici trociscati, faciendo infusionem in aquis endiuic & cichoreæ, sicut communiter fit, & possumus magis & minus fortiora vel debiliora pharmaca dare, secundum q̃ vires fuerint: tantum. n. est pharmacandum, quantum vires fuerunt, 1. Apho. 23. quod cognoscitur ex qualitate eorum, quæ excernuntur, si alia sint qualia esse debent, & egrî facîle tollerent, 1. Apho. 2. & 22. & quarto Apho. 2. & cognoscitur si eger ferat grauiter purgationem, 4. Apho. 39. Sic etiam aduertendæ sunt alię conditiones, quas enumerat Hippo. ibi in 4. parti. Apho. & videbimus quando fortiora, & quando debilia sint danda pharmaca, & per quã viã, & hæc omnia colligit Gal. 1. ad Glau. de cura continuæ cum accidentibus, q̃ si materia furiosa non sit indigesta educi non debet, 1. Apho. 22. & octauo de medic. vbi refert hieram Themisonis aliter sequen-

sequentur illa inconuenientia, quæ refert Hippo. primo regi. acut. 2. hoc autem est interdum de materia faciente morbum. Nam quando timemus de alio morbo futuro, quod periculofus fit, etiam indigesta materia est pharmacandum, sicut fecit Gale. vlt. de Ing. 14. in timore phthifeos 13. de Ing. cap. 16. in cura oculorum 14. de Ing. octauo. in cura tremoris linguæ, quarto regi. acut. 16. in angina, istam digestionem facit natura, primo prognost. vltimo, semper incrassando, 2. prognost. 33 & separando bonum à malo, & malum ad educendum aptum reddendo: materia enim digesta facilius educi potest, 1. Apho. 22. Istam digestionem poterimus iuuare cum confortantibus & roborantibus virtutem digestiuam: nos autem faciemus corpora fluida, hoc interim sicut est necessarium, secundo Aph. 9. & hoc faciemus cum decoctionibus, quæ sunt minus calidæ quàm illæ, quibus vtimur in materia furiosa, quia longius est tempus, verbi gratia, radicum capil. veneris, foliorum buglossæ, endiuie ana m. 5. radicum cicoreæ & apii mundatarum ana numero 8. fiat decoctio secundum artem vsque ad consumptionem tertie partis, vel medietatis aque. Deinde fiat colatura, de qua capiat mane vnc. 6. calidæ, addendo parum zucchari, sic etiã prouocamus sudores & vrinas, quod eo tempore conuenit, 11. de Ing. 9. Possumus quoque dare oxymelitem estate frigidum, hyeme vero calidum, 1. regi. acut. 42. oportet dare quod multum nō sit acetosum, quia abradit intestina, rursim excitat, & nervosa lædit: pariter non oportet dare in multa quantitate, 11. de Ing. 11. vel si volumus dare in forma syrupi, poterimus dare, puta oxymeli vel acetosi simplicis vnc. 1. quoniam etiam aliquantulum digerendo oportet habere curam etiam infrigidandi propter intesum

Mathei Curtii

calorem febris, syrup. de endiuia vnc. 5. aquarum endiuia, & cichoreæ ana vnc. 1. & sem. sic igitur digerendum, & prouocanda vrina, & sudor, si natura tentet vomitum, poterimus eam cum aliquo leui vomitiuo iuuare, puta cum aqua hordei calida, & pauco, vel syrup. acetosi, vel cum penna in oleo intincta. Quum autem deueniemus ad tempus perfectę digestionis, quoniam est aptum pro Crisi, naturę est aduertendum, si ipsa natura totam materiam euacuet, & sic nihil quo ad istam intentionem debet facere Medicus, 1. Apho. 20. & 22. in commento, & hoc sæpe facit per fluxum sanguinis narium, 4. regim. acut. 10. vel mittendo materias extra venas, & sic faciens rigorem, post sequitur eum solutio per sudorem, velut in 4. Apho. 58. aliquando etiam soluitur per vrinas, 4. regim. acut. 10. q̄ si ipsa aliquid relinquet, quia quæ talia sunt solent facere recidiuam, 2. Apho. 12. tunc Medicus debet iuuare per eam regionem, per quam incēpit euacuare natura, primo Apho. 2. & sequi eas condiciones, quas de euacuatione diximus in cura tertianæ puræ. Pharmacum vero quo vti debemus, est illud de quo supra, quando loquebar de materia furiosa. Exhibitio pharmaco, si aliqua sit impressa caliditas in membris ab ipso, vel debilitata membra principalia, sequenti die dabimus species triafandalorum, vel diarrhodon abbatis, faciendo morsellos cum zuccharo, & dando singulo mane morsellum vnum, vel dabimus zucchari rosati vnc. 1. vel syrupi rosati vnc. 1. cum vnc. 3. aquæ boraginis. In istis temporibus cum frictionibus, cum vnctionibus refacientibus, cum debitis exercitiis, si erit possibile, eum curabimus, vt si aliqua superflua tertię digestionis restiterint, excernantur semper, non omitrendo clysteres, si aluus sit sicca, donec æger bene habeat ventris bene-

beneficium, hæc quo ad causam morbi. Veniendum modo est ad morbum, duo sunt præcipua remedia in cura febrium ardentium, phlebotomia scilicet, & exhibitio aquæ frigide, primo Apho. 23. 9. de Ing. nono, postquam ergo iam est dictum de phlebotomia, est dicendum de exhibitione aquæ frigide: intentio enim de ipsa exhibendo, sumenda est præcipuè à morbo. Causon enim quum febris ardentissima sit, quæ secus trahit intensissimum calorem, & intensissimam siccitatem hinc indicatione sumpta ab ipso, intentio est de exhibitione maxime frigidorum & humidorum. Quum autem huiusmodi maxime sit ipsa aqua, intentio igitur sumpta ab ipsa, quæ maxime conuenit, est aqua frigida, primo regi. acut. 42. Hinc dicit Gal. 4. regim. acut. 12. q̃ omnes febre ardenti laborantes, quibus exhibuit aquam frigidam sanauit, idem nono de Ing. 6. Hinc crederem, q̃ (licet hoc remedium modo non sit in usu) optimum esset, eo vti: apparentibus igitur signis manifestæ digestionis, quando est maxima flamma, est dāda aqua frigida, 9. de Ing. quinto, si status cœli sit calidus & siccus, & omnes vires egri valeant, nec sit senex, 11. de Ing. 9. maxime si æger sit assuetus, quod si non sit assuetus, dabis, sed non adeo audacter, 9. de Ing. 5. Aduertendum tamen est si plurimi indigesti, & glutinosi sint humores in stomacho, si inflammatio in interioribus, si sit aliquod mēbrum neruosum debile, quia nec tunc aquam dare oportet, 9. de Ing. 5. nisi sit periculum mortis, vel heſticæ, quoniam si esset apostema in interioribus, & indigesta materia liceret dare ipsam sicut fecit Gal. 10. de Ing. 6. quantitas autem dicit Gale. primo regi. acut. 42. debet esse tāta quod extinguat febrem, & hoc est quantum egger vno haustu potest bibere, vel quantum voluerit æger, 9. de Ing. 5. & sunt

Mathei Curtij

duę cotyle, decimo de Ing. 5. scilicet vnc. 18. & debet dari vacuo stomacho. Nec etiam sunt admiscenda, quę postea refrigerant, quia sic nimium forsan restarēt frigida, & cū de hoc nihil dicat Gale. consonum est, q̄ non sint miscenda, pariter nō est danda in pauca quātitate, quia sic febrem non extinguit, nec sitim, & multum nocet, sicut tertio regi. acut. cap. de aqua dicitur, eo tempore etiam, & illis stantibus conditionibus poterimus balneare in aqua dulci, dicit Gal. 11. de Ing. 9. vnctiones pariter frigide eo tempore conferunt, & poterimus inungere eum infrigidante, quod describit Gale. 10. de Ing. 9. quo est etiam vtendum in causone, vt dicitur in lib. de tabe, sic etiā poterimus applicare alia epithemata frigida, vt ex sandalis, ex camphora, nisi non sit maxima vigiliarum instantia, ex succo plantaginis, & similibus infrigidantibus, nec est necessarium admiscere calida, quia vt in alterando exterius nō multum est periculum, & indifferenter possunt applicari omni membro, 7. de Ing. 8. & vltimo, & quando iam sunt calefacta à calore febrili debent remoueri, & iterum applicari frigida, 10. de Ing. 9. Aduertendum est tamen, si aliquod sequeretur nocumentum alicuius partis proxime, tunc non debent amplius applicari, vel non multum frigida, sicut fecit Gale. septimo de Ing. 8. in secundo infirmo. Hęc sunt precipuē tria remedia, quę valent humectando & refrigerando. Alia dicemus in sermone sex rerum non naturalium. Veniendum modo est ad symptomata, quę etiam de sui remotione indicant. Sunt enim præter naturam accidentia, quę morbum sequuntur, sicut vmbra corpus, 3. regim. acut. 1. & hęc sunt in triplici differentia, scilicet corporis affectus, actio læsa, & exiens mutatum, 12. de Ing. primo, 3. de accid. secundo, hęc etiam de sui natura, indica-

indicationem non præbent curatiuam, nisi in quantum induunt naturam causæ, vel virtutem prosterunt, 12. de Ing. primo. Quum igitur talia sint, ab ipsorum remotione est incipiendum. Ceterum quoniam sæpe morbus ipse, & causa diuersam exigunt curam, in cura symptomatum, 11. de Ing. 11. ideo videndum est, an tale posset reperiri remedium, quod ad vtrunque valeat, & tunc erit directa cura, 12. de Ing. primo. Quod si tale non reperimus, debemus attendere vrgentiori, altero non neglecto, 7. de Ing. 2. sicut etiam est faciendum in symptomatibus: quando enim duo infestant, semper vrgentiori attendendum est, altero non neglecto, primo ad Glauco. de cura febris continuæ cum accidentibus. Symptomata ergo, quæ sequuntur febrem ardentem sunt, primo sitis intensa, quarto regim. acut. 13. lingua sicca, & nigra, ventris morsus, & eius fluxus cum materiis pallidis, & liquidis, vigiliæ, & aliquando alienationes, quarto regim. acut. 4. Quod si sit causon à phlegmate falso, linguam habet falsam, quarto regim. acut. 13. Quantum ergo ad sitim ipsam quantum sit inseparabilis à causone, remedio Medici auferri non potest, nisi & ipsa tollatur egritudo, sed quoniam, vt dicit Gal. primo de dieb. crit. quum est sitis adeo intensa & clamosa, non oportet cruciare egrum, poterimus dare aquam mellis, sicut facit Hippo. 4. regim. acut. 5. Sed quoniam aqua mellis, ratione mellis inflammatur cito & sic nocet feбри, 11. de Ing. 11. Imo debet esse cum pauca mellis quantitate, magis tamen laudat ibi Gal. cremorem hordei, quem possumus facere modo, quia grossius reficimus, nisi timeamus, q̄ accrescat in stoma. cho, 1. ad Glauco. de cura feb. cōtinuarum cum accid. Aquam quoq; exhibere possumus, sed coctam, quia sic multæ tolluntur noxiæ ipsius aquæ, 4. regim. acut. 5. & est

Mathei Curtij

est bonum in ipsa decoquere radicem apii, sicut dicit Gale. nono de Ing. 9. sic enim prouocabimus sudorem & vrinam, possunt admisceri semina communia, quia refrigerant, & vrinam cient: potest etiam fieri aqua hordei, quæ licet non habeat omnes intentiones ptisanæ, humectat tamen & refrigerat, & sic aliquo modo sitim tollit, quod si est possibile, oportet aquarum harum magnam dare quantitatem, sed raro, 4. regim. acut. 5. quia in pauca quantitate sitim non sedat, & in bilem cōuertuntur. Potest quoque eger tenere in ore pruna sicca, vel macerata in aqua frigida. Sic enim faciendo eger melius transit ipsam sitim: quo vero ad linguam, debemus curare ut inundet, abstergetur, puta lauando os cum aqua mellis, & radendo ipsam cum aliqua re aspera, & curando ut eger parum loquatur. Fluxus autem si immodicus sit, debet curari, quod si non sit superfluous, quoniam forsitan est criticus, si habuerit conditiones ad crisin, quas enumerat Gale. primo Apho. 2. non est impediendus, superfluous autem curatur, primo vrendo clysteri, quem vocat lauatiuum, scilicet ex brodio, zuccharo, & vitellis ouorum, ut non radantur intestina, & sequatur dysenteria, quod si sequitur, poterimus uti clysteribus faciendo decoctionem, ut cum balauistiis, cum carabe, mespilis, cum elect. de sorbis, & similibus: item etiam poterimus applicare cerata styptica, vngendo cum oleis stypticis, puta cum oxyrhodo, & similibus. Quod si sequatur sic, qd faciat dysenteriam, tunc dicit Gal. 12 de Ing. 1. omnis cura est adhibenda ad symptomata, & tunc per clysterem indimus, vel tragi succum, vel seuum hircinum, vel rosaceum, ut vires quiescant, donec habeamus tempus sanandi vlcerationem, quam post sanamus imponendo per anum res consolidantes, quod si sit cum ea dolor immodi-

immodicus, sic vt prosteratur virtus, auferendus est dolor, si est possibile cum rebus quę morbo, & sympto-
mati conueniunt, & videndum ne quid nimis agas, di-
cit Gal. ibi. 12. de Ing. primo. quod si non cessat dolor,
tandem veniendum est ad opiata, potiusquam egrum
relinquere mori ex doloris vehementia, vt dando phi-
lonium, quod sit quatuor annorum. Quod si etiam se-
quitur syncope, primo aspergendo egrum aqua frigi-
da, nares apprehendendo, & os ventriculi perfrican-
do curari debet, dicit Gale. primo ad Glauco. de cura
febr. continuę, oportet quoque prouocare vomitum,
ligare manus forti ligatura, & si sequatur syncope ex
alia causa curanda est, vt dicit ibi Gal. Quo vero ad vi-
giliam dicit Gal. 12. de Ing. 1. vigilię tantę sunt ali-
quando, vt virtutem prosterant, ideo debemus cura-
re, vt eger tunc dormiat. Ceterum quoniam somnife-
ra vt plurimum sunt morbum augētia, & eius causam,
ideo debemus ea euitare, quantum possumus: debe-
mus ergo primo curare, vt eger quiescat, quantum po-
test, sit camera clausa & obscura, sine hominum concur-
su, quod si adhuc non potest dormire, possumus facere
decoctionem ex rebus frigidis, vt ex rosis, nenuphare,
portulaca, lactuca, endiuia, addendo parum mandra-
gorę, vel apii: post ex ipsa decoctione lauare egri ex-
trema, & facere, vt odoret vapores illius aquę, quod
si adhuc hoc non iuuat, possumus, dicit Auic. in hac cu-
ra dare syrupum de papauere, puta per horam post cœ-
nam: possumus quoque iungere tempora vngueto po-
puleo. Verum est, q̄ vt dicit Gal. 12. de Ing. primo,
debemus omni ingenio curare, vt non vtamur istis fri-
gidis, quia frigidum multum naturę inimicum. Sed
quando est necessarium vti, saltem ipsis est vtendum
cum maxima cautela, bene examinando naturam infir-
mi,

Mathei Curtii

mi, & vrgentiam doloris, vel vigiliarū. Quod si etiam
sint alienationes, quia tunc est periculum phrenetidis
si in principio sint, possumus applicare capiti oxyrho-
dinum, sicut dicit Gal. 13. de Ing. cap. 15. Item quan-
do illa alienatio est propter vapores eleuatos, maxi-
me à corde, poterimus facere epithemata cordi, maxi-
me si sint factæ vniuersales euacuationes, ex rebus fri-
gidis, & cor confortantibus vt ex sandalis, croco, suc-
co boraginis, & buglossæ, cū aqua rosata. & similibus.
Item poterimus facere frictiones, trahendo deorsum,
& satis fortes, post sunt applicandę dorso cucurbitulę,
& sic confortando membrum mandans, reprimendo,
& diuertendo à membro suscipiēte, alienatio curatur,
hec sunt quę sunt dicēda quo ad remotionem trium re-
rum præter naturam. Veniendum modo est ad res na-
turales, quas quantum ad curam modo considerare de-
bemus sunt virtutes, complexio, ætas, & consuetudo,
quæ de sui conseruatione indicant, quod fit cum simili-
bus in lib. art. med. 85. considerandum est ergo qualis
sit virtus, & quanta, & videndum quomodo poterit
durare vsque ad statum, & sic pro eius conseruatione
est dandus cibus, sic q̃ conseruetur, vt possit restare pro
pugna contra morbum, sed de hoc dicam loquendo de
sex rebus non naturalibus. Considerandum & qualis
sit complexio ægri, vt sciamus quantum alterare debe-
mus, dicit Galenus nono de Ing. 14. Quum enim
corpora ægra in naturali complexione conseruare in-
tendamus, octauo de Ing. nono, tantum est alteran-
dum, quantum est necessarium pro naturalis comple-
xionis conseruationem, & sic dabimus cibos, vel alias
res secundum complexionem ægri: ætatem pariter o-
portet considerare, & talia exhibere, qualia illi ærati
conueniunt, & ita in pueris, ratione ætatis, laudabat
victum

victum humidum Hippo. primo Aphorif. 16. consue-
 tudo quoque quum sit altera natura seruari debet in
 ægris, vt cibando hora consueta, curando vt dormiat
 hora consueta, vt vtantur cibis quantum possibile est
 consuetis, etiam q̄ essent parum deteriores, secundo
 Apho. 5. pariter in educationibus debemus videre, an
 sit solitus euacuationibus: consuetudo enim dicit Gal.
 primo ad Glau. de cura cōti. cum accid. non parum est
 momenti ad omnia peragenda, maxime ad euacuatio-
 nes. Quod si alię sunt res, quę inter naturales repo-
 nantur, ferē ad has tres reducuntur, & omnes de simi-
 libus exhibendis, & de sua conseruatione indicant. Ul-
 timo est dicendum de sex rebus non naturalibus, quę
 conseruant sanitatem, vel amissam recuperant, si debi-
 tē administrentur, & eam destruūt si indebitē. Primo
 ergo est Aer, à quo maxime sumitur indicatio, 9. de
 Ing. 14 q̄ si calidus sit & siccus febrem auget, si frigi-
 dus & humidus eum curat, si ergo naturaliter possit
 haberi Aer frigidus & humidus, ipsum eligere debe-
 mus, q̄ si eum non habemus, debet taliter fieri artificia-
 liter, eligendo domos subterraneas, quę frigidissimę
 sint, & maxime perflatę ad arctum versę cum aliqui-
 bus auris, ibi sint alicui fontes, qui si non sint, aqua de
 vase in vas transfundatur: sic .n. somnū ciemus, quod
 maxime confert. Camera sit aspersa aqua frigida, rosis
 capreolis vitium, aut lētisci ramis, aut aliis herbis, quę
 refrigerent & humectent: prohibendū est ne turba ho-
 minum in cameram ingrediatur, debemus tantū aduer-
 tere ne talis aer toti corpori occurrat, quia sic auget
 opilationē, sed eger debet stare coopertus, excepta fa-
 cie, hęc oīa dicit Gal. 9. de Ing. 8. Secundo est cibus &
 potus, Gal. 1. ad Gla. de cura tertianę nothę, & 1. regi.
 acut. 43. dicit, q̄ virtus indicat de cibo dādo, ægritudo
 quę

Mathei Curtii

que est malum, de non dando cibo: si ergo egritudo sit brevis, & vehemens, & virtus fortis, nihil dare debemus. Quum ergo causon de se in septima terminetur, 4. Apho. 59. vehemensq; sit morbus, ideo si virtus sit fortis, quia durabit vsque ad septimum nihil est dandū, sicut dicit Hipp. primo regim. acut. 43. Verum est, vt in eo com. dicit Gal. quod raro est q; virtus sit fortis tantum, vt possit sine alicuius rei exhibitione durare vsq; ad septimam, & tunc oportet dare ptisanam. Quum ergo & nos tempore nostro non sciamus præcisum terminum status, & si sciremus, sæpe impeditur propter errores, quos sæpe astantes, & e gri committunt, & si tenuissima diætā vteremur, esset forsan necessarium cibare in statu, quo nihil perniciosius est, 2. regim. acut. 46. tunc enim tenuissima diætā vti debemus, primo Apho. quinto, & sic est melius aliquid dare, & error est minor. Verum est, q; in ipso principio, quando volumus videre constantiam virtutis, vsque quo poterit durare vti possumus tenui diætā, si ignoramus ægritudinem, q; si erit nimium tenuis, poterimus corrigere, ipsam in grossando, secundo regi. 37. sed cognita natura egritudinis, & virtutis, ordinando regimen vsque ad statū, est melius declinare versus grossum, quàm versus tenuem, primo Apho. 5. Debemus autem præscripta diætā in ordine ad statum semper procedere attenuando, & in statu vti tenuissima diætā, sicut in cura tertianæ ex authoritatibus Gal. dictum est, cibi autem sunt dandi hora minoris afflictionis, si paroxysmi habent aliquos repores, quod si semper eodem modo affligant, est eligenda hora consueta, maxime si sit pars frigidior diei, 11. de Ing 5. in inuasiōe autem morbi non est cibandum, primo regi. acut. 45. Cibi autem, qui debent dari, sint humidi, si est possibile, vel saltem in potentia, pri-

De Feb. curatione 40

primo Apho. 16. conuenientior cibus, qui dari possit,
 est ptisana, quia omnes habet intentiones, quæ conside-
 rantur in febribus acutis, primo regim. acut. 18. mo-
 do preparatur, sicut docet Gale. secundo de alim. cap.
 de hordeo, & in libro de ptisana, q̄ si eger illam abhor-
 reat, poterit vti farre cum modico aceti, primo regim.
 acut. 43. vel panatella, primo regi. acut. 18. & primo
 ad Glauco. de cura feb. continuæ cum accid. pariter di-
 cit Gal. ibi poterit sumere sorbitionem ex halica, verū
 est q̄ valent tantum vt cibi, dicit ibi Gale. ex oleribus
 poterit dari lactuca post ipsam, quarto de tuend. san.
 laudat Gal. cucurbitam post blitum, possunt dari pi-
 sces saxatiles, primo regim. acut. 27. Acetosa omnia
 non conueniunt, excepto oxymelite, primo regi. acut.
 18. nisi esset fluxus ventris, vel febris pestilentialis, pa-
 riter non sunt danda salsa, nec acria, quarto regi. acut.
 octauo Aph. carnibus, ab ouis, & similibus cibis maio-
 ris nutrimenti est abstinendum, nisi esset virtus multū
 debilis, quia tunc possumus dare contusum ex pullo
 gallinaceo, vel perdice. Vinum non est dando, nisi sit
 in declinatione, vel sit aliquod accidens, quod vrgeat,
 sicut syncope, & quæ narrat Gal. primo ad Glauco. de
 cura feb. continuarum cum accid. Quod si vrgens, &
 clamosa sit sitis, est danda aqua mellis, cum paucō ta-
 men melle, & zuccharo, modo non bile scat in stoma-
 cho, primo ad Glauco. de cura continuarum sine acci-
 dentibus conueniunt postmodum alia, quæ diximus,
 quando loquebamur de siti auferenda. Tertio est mo-
 tus & quies. Debet æger, quantum potest, quiescere,
 quia quies facit ad digestionem, & minus se mouere
 quàm sit possibile, quia sic etiā impeditur somnus, qui
 est necessarius, vt dictum est in declinatione debet vti
 debito exercitio, ventre vacuo, vt excrementa tertiæ

di

Mathei Curtii

digestionis excernantur, quòd si non possit deambulare, supplendum est cum frictionibus. De vigilia & somno dictum est, quoniam maxime somnus cōuenit, ideo quando excedunt vigiliæ, debemus ipsum somnū provocare cum his quæ dicta sunt. Quinto sunt ea, quæ excernuntur, de quibus etiam dictum est, curando quod omne superfluum excernatur, & si sit superfluus fluxus sanguinis narium, vel ventris, debemus eum sistere, ut dictum est. Sexto sunt accidentia animi, quæ si sunt immoderata, virtutem prosterunt, ideo ea omnia vitare debemus, maxime quæ exiccant, & calefaciunt, sicuti ira, tristitia, & similia, & hæc quo ad curam sufficiunt.

De cura Febris sanguineæ.

Febris sanguinis, quæ synocha dicitur nono de Ing. secundo, à sanguine fit, vel tantum ebulliente, non putrescente, & sic synocha sine putredine dicitur, & inter ephemeræ reponitur, nono de Ing. in principio, vel fit ab ipso sanguine putrescente, & dicitur synocha cum putredine, 9. de Ing. 4. & hæc fit cum tota massa sanguinea putrescente, 9. de Ing. 3. & quod hanc febrem à sanguine putrescente concedat Gal. patet, secundo de diff. feb. 9. & sic ipsam docet curare, 9. de Ing. quarto. Verum est, quod esse pura & simplex non potest, sic quòd etiā cū aliquibus signis cholere non appareat, secundo de Crisi. 12. & hoc decepit Auic. in prima quarti tract. secundo cap. 43. sunt tamē simplices istæ febres eo modo quo sumit Hippo. 3. prognost. secundo, scilicet puræ, & sine sequis accidentibus, sicuti ibi vocabulum exponit Gal. quod dicit Gal. secundo de diff. feb. nono, & istæ cum aliis non complicantur febribus, sicuti colligere possumus, secundo de diff. feb. 8. Sunt autem in triplici

plici differentia, quædam enim semper augendo procedunt, & dicuntur epacmaſticæ, quædam eundem servant tenorem vsque ad finem, & dicuntur homotonæ, quædam semper procedunt declinando, & dicuntur paracmaſticę, 9. de Ing. 4. secundo de Crifi. 6. Fiunt autē istę febres in corpore sanguineo, corpulento, carnosio, calidis excrementis redundante in ætate, & natura calida, non in gracili, & frigido corpore, ætate & complexionē frigidis, 9. de Ing. tertio, & hæc vt plurimum in septem diebus terminantur, 2. de Crifi. sexto. Cognoscitur autem istę febris, q̃ pulsus habet maximos & quales, vehementes, secundum q̃ maior est febris, 9. de Ing. 30. Item est continua vniformis, 9. de Ing. 4. calorem habet mitiorem, quàm febres cholericę & etiā alia accidentia, 2. de diff. feb. 9. maxime ea quę sine putredine, in qua non est multum mordax calor, nec à naturali remotus, 9. de Ing. 4. inuadit sine rigore, quia hoc est commune omnium continuarum, 2. de Crifi. 6. urinam habet nō plurimum in crassitie, & colore à naturali recedentem, 9. de Ing. 4. & hæc omnia signa sunt inseparabilia à synochis, & ex eis fit vnum signum proprium, & inseparabile, & conuenit vtriq; synochę, excepto q̃ si nō sit synochus cum putredine, addit notas putredinis, quod cognoscitur ex lotio, pulsu, & calore: ea enim habebit lotium magis à naturali remotum, pulsum frequentiore, & secundum systolem, calorem mordaciorem, 9. de Ing. 3. in cura huius febris quum non differat à causone, nisi q̃ remissiora habet accidentia, & nisi secundum magis & minus, 2. de Crifi. sexto ideo parum à cura causonis est variandum, sic tamen est procedendū, sicut fecit Gal. 9. de Ing. quarto, quū synocha de remotione causę indicet, & de infrigidatione, indicatione sumpta à morbo, quę sepe contraria

G

indi-

Mathei Curtij

indicant remedia, 9. de Ing. quinto, ideo optimum remedium in huius febris cura est phlebotomia vsque ad syncopim, 9. de Ing. quarto, quæ si non fiat, male possumus vti aliis remediis, 9. de Ing. quinto, hæc enim, vt dicit Gal. primo Apho. 23 & 9. de Ing. quinto, causam aufert, & totum corpus refrigerat, quam post sæpe sequuntur bilis vomitus, sæpe alui fluor, & sudores totius, hinc sæpe ex hoc solo remedio tollitur febris, quare ea nihil est naturæ iocundius, nec vtilius. Quum ergo occurrit talis febris, si eger beneficium habet ventris, nec humores in stomacho crudos, vel materias in meseraicis corruptas, quia tunc deberet vti clysteri, vel lenitiuo, vt in causone fienda est phlebotomia vsque ad syncopim, si vires sint ualide, & corpus robustum, vnde debemus videre, an sanguis mutet colorem an velociter & cum impetu fluat, & tenendo pulsum in manu videre an virtus constet. Sanguine enim colore non mutante, fortiter exeunte, & virtute perseverante, est perseverandum, mittendo sanguinem vsque ad syncopim, vt etiam dicit Gal. in lib. de phlebotomia, quod si non sic fortiter exeat, vel timeamus ne virtus labatur, sic quod leuari amplius non possit, tunc est melius vires multiplicare, sicuti 9. de Ing. quarto, dicit Gal. aliter forsan non febrem, sicut fecit Gal. sed egrum iugularemus: facta phlebotomia post duas horas, vt virtus restauretur, dandus est cibus, & post curare oportet, vt eger quiescat, demum tertia die potest lauari. Sic enim faciendo, sicut ibi fecit Gale. in primo egro, forsan sine alio remedio eger liberabitur, dando cibos conuenientes, & vtendo eo regimine, in sex rebus non naturalibus conuenienti, & præsertim in cura causonidis, & quoniam hic non est humor putridus, qui forsan reduci potest ad benignum si peccat, & hoc facere debemus

bemus, vt patet in libro de constit. artis Med. 19. & hoc fit attenuando humores si nimium grossi sint, vel in crassando si sint tenues. Ideo hoc in ista cura facere debemus, vt hic dicit Auic. Attenuabimus etiam grossum sanguinem, vtendo incidentibus, vel subtiliantibus, vt oxymelite, vt syrupis, & aquis aperientibus, vt faciendo syrupum sic, Recipe oxymelitis simp. vel syrupi acetosi vnc. i. syrupi de duabus radicibus vnc. s. aquarum sceniculi & cichoreę ana vnc. i. & sem. q̄ si sint tenues, ingrossentur, vtendo cibis crassi nutrimenti, sicut fecit Gale. 12. de Ing. sexto, & si declinant ad igneitatē, vtendo rebus frigidis, vel intus sumptis, vel extra applicatis. Quod si sit synocha cum putredine, etiam p̄missio clysteri vel lenitiui, idest necessarium, deinde viribus valentibus, & etate consentiente veniendum est ad phlobotomiam, quę vsque ad syncope fieri debet, sicut in secundo infirmo fecit Gal. nono de Ing. 5. Verum est, q̄ ipse 9. de Ing. 14. dicit, quod non adeo copiosa phlobotomia est fienda in putridis, vt restet sanguis, pro digerendis alijs humoribus, & vt alia remedia possint applicari (forsan id dicit) quando dubitamus de viribus, est tamen tutē procedendū, fienda quidem copiosa, vel iteranda, facta phlobotomia, dabat Gal. mulsam, post per horam, ptisanam, vt eger reficeretur: ea autem febre perseverante, apparentibus signis manifestę digestionis, danda est aqua frigida vsq; ad saturitatem, sicut iubet Gale. decimo de Ing. 6. & quoniam pars sanguinis putrefacta iam ferē habet naturam cholere: ideo febre perseverante post phlobotomiam est procedendum cum prouocantibus vrinam & sudorem, cum clysteribus, & tandem apparentibus signis completę digestionis, si natura non tentet euacuare, procede cum iuuantibus eam, post cum confor-

Mathei Curtij

tantibus stomachum, cum vnctionibus, cum frictionibus, & reliquis sicut dictum est in cura caufonis. Regimen quoque in sex rebus non naturalibus eodem modo fit, sicut in caufone, vel differt secundum magis & minus, secundum intensiorem vel remissiorem febrem. Accidentia quoque, quæ hæc febrem sequuntur, vt sitis, vigiliæ, & aliquando somnus, fluxus sanguinis narium & similia, sunt curanda sicut accidentia caufonidis, & hæc pro ista cura sufficiant.

De Quotidiana pura, & eius curatione.

Quotidiana pura intermittens febris est ex phlegmate, 2. de diff. feb. secundo, putrescente, quia aliter non faceret febrem, 2. de diff. feb. quinto, transmissio à venis, extra venas, 2. de diff. feb. ult. vel ab vna parte corporis ad aliam, primo epid. in secunda anni constitutione, affligit quotidie, 2. de diff. feb. 4. aduenit autem ætatibus, naturis, anni temporibus, & temperamentis humidioribus, pueris, & maxime infantibus picuitosis, habitibus crassis, otio deditis, pariter & crapulis, & ebrietatibus, balneis assiduis, præsertim post cibum, aduenit quoque temporibus hybernis, locis humidioribus, in constitutionibus humidis, & aliquando populo communicatis, primo ad Glauco. cap. de signis quotidianæ intermittens, secundo de Crisi. 5. aduenit quoque exercitatis post cibum, 1. epid. in secundo infirmo. Raro est, quæ ea adueniente os ventriculi & hepar non patiantur, 2. de Crisi. 5. accenditur autem sicut ignis in lignis viridibus, inde accessionis spatium est longius cessatione, raro ad perfectam terminatur in febricitationem, 2. de diff. febr. 4. Huius febris signa sunt, caliditas humida cum quadam acredine, quando perseuerat

rat tactus, fumosa, commixta cum multo vapore, 1. ad Glauco. de signis quotid. intermittentium, quæ cum difficultate incenditur, & suum augmentum est longum, 2. de diff. febr. 4. non est intensa, sic q̄ corpus adurat, vel qui denudare cogat, 2. de Crisi. 5. & est inæqualis, sic q̄ videtur per cribrum exire vapor, 2. de diff. febr. 9. & 10. Incipit hæc febris cum extremorum frigiditate atque horrore, potiusquàm rigore, 2. de diff. febr. 4. 2. de Crisi. 5. qui eam patiuntur, non magnam habent sitim, linguam habent humidam, vomitus pituitosos, & quæ excernuntur, sunt frigida, humida, & cruda, aquosa & pituitosa, & vniuersum corpus abundat his superfluitatibus, non terminatur cum sudore saltem in primis paroxymis, vrinq̄ in principio sunt albæ, & tenues aut crassæ, aut turbulente, aut turbide, 1. ad Glauco. de signis quotidianæ intermittētis præcedunt acidi ructus præcordia tumescunt & inflantur. Color cum palliditate fit albus, à stomachi & hepatis lēione non absoluitur, 2. de Crisi. 6. Et quoniam phlegmatis quatuor sunt species, vitrem scilicet, dulce, acidum, & salsum, 2. de diff. febr. 6. & ab istis omnibus potest prouenire ista febris: ideo omnia talia phlegmata faciunt sua signa significantia differentiam passionis. Hæc tamen, quæ secundum Gal. posita sunt, significant ipsam passionem. Cuius curam in vniuersali componamus, ad particularia non descendentes, sicuti nec fecit Gale. Sed qui naturam phlegmatis nouit, eorum etiam signa cognoscet & curam. Curando hanc febrem sic est procedendum, quum vt dicit Gal. 1. 1. de Ing. decimo, in putridis omnis indicatio sumatur, vel à febre, vel à putredine. Indicatione sumpta à febre debemus curare, vt quæ facta est auferatur, & quæ futura est non fiat: pariter indicatione sumpta à putredine debemus curare,

Mathei Curtij

3

ut quod iam putridum est auferatur, & quod imputre fieri est aptum, non putrescat. Cum hoc est consideranda constantia virtutis an valida sit, sic quod durare possit in applicatione remediorum, 11. de Ing. 9. & quando est valida, audacter sunt applicanda remedia: ab horum igitur cura est incipiendum, modo non sit aliquod symptoma, quod ad se totam curam trahat, quoniam tunc ab ipso esset incipiendum, 11. de Ing. 11. ut si in hac febre esset syncope, sicut sepe aduenit esset incipiendum a remotione ipsius, quia ipsa magis vrgeret, supponendo tamen quod tale symptoma ut ordinatè procedamus, non adsit a febre, & a putredine incipiemus, post de ipsis dicemus symptomatibus, Febris ipsa, ut febris est de frigidis indicat & humidis, 9. de Ing. 14. Ceterum, quoniam ut dicitur primo ad Glauco. in cap. de signis quotid. intermittentium, quum corpus ista febre febriens, sit humidum & abundet superfluitatibus humidis & pituitosis quæ frigide sunt: ideo pauca sumitur indicatio ab ista febre, sed tota ferè cura sumitur ab ipsa putredine, quæ huius febris causa est. Putredo, ut dicit Galenus 11. de Ing. octauo, fit a præternaturali calore quando corripit humidum corporis. Arripitur autem, quando calor naturalis debitam non habet euentationem, densitas pororum, constrictio corporum, humoris abundantia, vel eius crassitudo, & lentitia, quum res istæ præter naturam sint: ideo de sui remotione indicant, quod cum suis sit contrariis, 11. de Ing. 3. opposita autem densitati, sunt rarefacientia, constrictioni scindentia, humoris abundantie, euacuantia, crassitudini rescantia, lentiori abstergentia. Si ergo causam putredinis auferre volumus, his uti debemus: est ergo intentio principalis auferendi istam obstructionem: auferatur autem obstructio, dicit Gal. 11. de Ing. 11. curando

ut

ut quod est obstructum deobstruatur, & propulsando, quod est facturum obstructionem, quod fit compescendo humorem obstruentem, & sic quod fuit ultimum in intentione, est primum in opere, scilicet humorū ablatio. Alioquin non solum non iuuaremus, sed maiorem faceremus obstructionem. Ceterum quoniam humores non debent educi, quin sint resecati, & apertæ viæ, secundo Apho. 9. & in lib. quos & quando purg. oportet. Ideo primo sunt resecandi humores, & abstergerendi, sic q̃ viæ etiam aperiantur, 11. de Ing. decimo, post modum euacuandi sunt per vomitum, per vrinam, per sudores, euacuatis humoribus auferēda est obstructio, & sic euentatur calor naturalis, & tollitur putrefactio & demum febris. Sic igitur febris quæ erat prima in intentione, erit vltima in remotione. Primo ergo utemur incidentibus & aperientibus & abstergentibus, & si aliqui sint humores, qui sint in viis, qui adduci possunt educemus: post apertis viis, & resecatis humoribus materiam aliquam euacuabimus,educta materia, poros aperiemus, & obstructionem auferemus, sic curabimus ut calor naturalis euentetur: quare primum putrefactio, demum ipsa febris aufertur, & quoniam ut dicit Gal. 11. de Ing. 11. est semper curandum ut virtus stet valida, ideo post ordinabimus regimen in sex rebus nō naturalibus. Vltimo quoniam sæpe hanc febrem sequuntur multa symptomata, non parui facienda, quomodo corrigi debeāt, dicemus: quum igitur humorum qui peccant in nobis, quidam multitudine, quidam alia malignitate peccant, & sic eorum qui multitudine, vel malignitate peccant quidam sunt corrigibiles, quidam vero non: qui corrigibiles sunt si est possibile, ad benignum reduci debent, & hoc fit quando taliter reducuntur, quod nutrire possunt: qui autē incorrigibiles sunt

Mathei Curtij

educi debent, lib. de constit. art. 19. & quoniam phlegmata, quæ in stomacho generantur, vt in de cholera nigra cap. 8. in sanguinem conuertuntur in hepate, & sic nutriunt: ideo in ista febre, quoniam aliqui etiam possunt esse humores qui peccant multitudine, ideo si corriguntur in bonum conuertuntur nutrimentum. Ideo Doctores iubent vt primis tribus diebus, vtêdo tenuissima diætâ, videamus, medicamêta nō exhibêdo, an humores ad benignū reduci possunt, sic q̃ ægritudo tollatur. Quādo ergo dicit Auic. nō scimus præcisum statū possumus primis tribus diebus nihil dare, & videre an ægritudo sola diætâ possit curari. Vnde Gal. nō dat oxymelitē, & prouocâtia vrinā, nisi post tres dies, 1. ad Glau. de cura quotid. intermit. Poterimus ergo, iudicio meo, sic procedere primo, quoniā multa sunt phlegmata in vētriculo, vt i clysteribus, vt inde diuertatur faciêdo, & in eorū decoctione addêdo cartamū: in potu quoq; dabimus aquā mellis cū hyssopo, sicut faciebat Gal. 12. de Ing. 3. sic enim parū dabimus, vt si erūt materię aliquę abstergendę, & educêdę educatur, tūc etiā poterimus vt i frictionibus, sicuti faciebat Gale. 12. de Ing. tertio, vt quę sunt in partibus cutaneis resoluantur, & digestio confortetur, non propter educendam eam materiam, quę est in venis, vel in stomacho, quia ratione earum non cōuenirent frictiones in principio: frictiones autem debent fieri incipiendo à partibus inferioribus, ad partes superiores cum panno aspero, vt caro calefiat, & satis longę, q̃ si videatur sequi lassitudo, possumus inungere oleo aliquo rariscente, vtebatur Gale. oleo sabino, possumus vt i oleo in quo fuerit decoctum anethum in duplici vase: aliter enim resoluitur virtus rei decoctę, octauo de Ing. 5. vel oleo chamomelino, post inunctiones oportet eas deter-

tergere, & iterum fricare, incipiendo deorsum, ascen-
dendo, & demum ipsam fricando, sic enim etiā diuer-
titur materia quæ posset facere syncopim. In hoc tē-
pore, si virtus sit fortis, & videamus multam materiam
in stomacho, in intestinis, in meseraicis, quæ per cly-
steres educi non possit, possumus vti lenitiuo, puta dā-
do vnc. i. cassiæ cribellatæ. Sed quoniam materiæ
sunt rebelles, & sic facilè educi non possunt, possumus
addere stimulū pura drag. i. s. elect. indi maioris, vel
drag. i. Agarici trocischati quod si natura tentet vom-
itum, quoniam, vt dicit Gal. quarto de cura quotidiana
intermittentis, vomitus maxime conuenit in hac
febre, debemus ipsum non impedire, imò iuuare dan-
do lenia vomitiua sicut cū aqua hordei calida miscen-
do vnc. i. syrupi acetosi vel aceti, vel ponendo digitū
in gulam, vel tingendo pennam in oleo, & imponen-
do in gulam, his factis, si virtus sit fortis quoniam in
omni putrida, vbi materia est multa debet alleuiari cū
phlebotomia i. de ing. i. 4. Ideo poterimus mittere
sanguinem, non tamen in multa quantitate, vt relin-
quatur sanguis pro digestionem aliorum peccantium hu-
morum, poterimus mittere vnc. 6. vel magis, vel mi-
nus secundum conditiones, de quibus iam est dictum.
His peractis, quoniam est intentio de apertione via-
rum, & refectione aliorum restantium humorū. Ideo
ad digestiua procedendum, & ad prouocantia vrinam,
sicuti dabat Gal. oximel, primo ad Glauc de cura quot-
tidianæ intermittentis. Conuenit etiam mel rosatum,
sicuti dicit Auic. & syrupus acetosus, & aqua endiuixæ,
& apii, vnde tunc poterimus sic dare syrupum, recipe
oxymelitis simp. vel syrupi acetosi. vnc. i. mellis rosa-
ti collati vnc. s. Aquarum endiuixæ, & apii ana vnc. i.
& semp. misce pro syrupo, sic enim digerimus humo-
res,

Mathei Curtij

res, & prouocabimus sudorem, & vrinam vsque ad se primam, & consonum erit, quòd tunc transactum sit principium. Quod apparebit, si apparebunt signa, manifestæ digestionis, verû est vt dicit Gal. in de quatuor temporibus paroxysmorum, quòd istę febres habent etiam tempus inæqualitatis inter principium & augmentum: transacta ergo septima, est habenda dicit Auic. cura de stomacho, quia vt plurimum qui febriunt hac febre, habent læsionem stomachi, & tunc poterimus intus dare aliqua stomachum confortantia vt miuam cotoconcorum, vel syrupum de mentha, vel facere masticationem ex mastiche, mentha, & aniso: hoc etiam in tempore incipient vti fortibus digestiuis, & tunc poterimus facere decoctionem ex foliis apii, foeniculi, ex capillis veneris, cum radicibus squinanthi, dicit Auic. & vt Gal. primo ad Glau. de cura quotidiana puræ. In hac cura debemus vti efficaciter incidentibus, poterimus addere pulegiû, origanum, calamentum, hyssopum, ana man. i. in sufficienti quantitate aque, & facere decoctionem vsq; ad consumptionem tertiæ partis, & post facere colaturam, & de ea aqua dare vnc. 6. calida, cum pauco zuccharo. Possumus quoque dare in forma syrupi acetosi, vel oxymel. simp. ponendo syrupum de duabus radicibus, puta, Rad. syrupi de duabus radicibus vnc. i. mellis rosati vnc. 5. Aquarum Apii, foeniculi, Absinthii propter stomachû, vnc. i. misce pro syrupo. sic semper fortificando digestiua, procedemus vsque ad statum. Apparentibus autem signis manifestæ digestionis, si æger sit promptus ad vomitum, maxime si eam viam tentet natura, poterimus vti vomitiuis, & facere vt vomat, cum debili vomitino si est possibile vt cum aqua hordei calida, cum vnc. i. syrupi acetosi, possumus post deuenire ad fortiora

tiora vomitiua. Debemus ergo vt dicit Gal. ad Glauc. in hac cura, primo vti cibis incidentibus, post radicibus, & post cibum, prouocare vomitum, vt post cibū dando infusionem raphani, & similia: vomitiua enim conferunt in hac cura. Poterimus quoque sic facere vomituum, Recipe feminis anethi vnc. 2. radicum raphani. vnc. 3. bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & de ea bibat vnc. 4. tepida. possumus quoq; addere paucum olei communis, sic quoque procedēte ægritudine versus statum, poterimus vti fortioribus clysteribus, addendo vnc. 5. hieræ simp. vel benedictæ drach. 3. diaphiniconis drach. 2. in decoctione ponendo turbit, vel hyssopum vel cartatum. Quod si etiam videtur materia multa, & appareat manifeste digesta, tunc etiam leui pharmaco licet vti, vt drag. 1. Agarici troischari, drag. 1. Rhabarbari, drag. 6. casuæ, verum si est possibile, melius est expectare completam digestionem. Quando autem versus statum procedimus, factis iam istis euacuationibus dicit Galen. primo ad Glauc. in hac cura est habenda cura de ventriculo, præsertim de eius ore, & quoniam vt dicit Galen. 11. de ing. 15. emplastra, cataplasmata, iunctiones, & similia localia, in principio non sunt applicanda, aliter materia trahitur ad locum, & fiunt apostemata, ea tamen digesta, & in parte educta hæc possunt applicari. His autem factis poterimus inungere stomachum cum oleo Nardino, vel de mastice, pariter possumus facere emplastra, & applicare extra quæ calefaciunt, & resoluiunt, si febris sit nō intēsa. Cōpleta aut digestionē possumus dare Theriacā, vel Mithridationē si in proposito reperiuntur. Quātitas aut theriacæ debet esse sicuti vna auellana, vel faba agrestis, dicit Ga. & dabimus ad plus drag. 1. per horas duas ante accessionē, sicuti dicit Gal.

Mathei Curtii

Gal. in lib. de Theriaca ad Pisone, de quartana. In hoc tempore si non euacuat perfecte, vel per vomitum, vel per secessum, vel per sudorem, vel per urinā sic quòd sequatur declinando, & tollatur febris, nihil est quòd, quo ad hoc, facere debeat medicus, dando solutium, puta drag. 1. & sem. Agarici trociscati drag. 1. Rhab. infundendo in aqua cichoreæ, addendo parum vini albi drag. 1. spicæ, & post 12. horas, faciendo leuem decoctionem, & fortem expressionem. & colaturam, in qua dissoluendæ sunt drag. 6. cassiæ cribellatæ an drag. 2. elect. indi maioris, ponendo in fundo vasis vnc. 1. iulebrosati, & seruando omnes regulas, de quibus supra. educta autem materia his ingeniis, restat vt curemus, ne alia materia putrescat, & hoc fit vt dicit Gal. 11. de ing. 18. faciēdo vt æger faciat debita exercitia, quòd si ipsa facere non possit, supplebimus cum aliis vt dictum est, & confortabimus membra principalia, vt calor putredinalis in totum auferatur & naturalis recuperetur, & confortetur. Hæc quantum ad indicationem sumptam de remouendis causis putridis, cum medicinalibus, & de hac cura multa diximus sumpta à Gal. 11. de ing. dum curat synocham cum putredine, quoniā vt melius explicaremus in cura synochi cum putredine, processimus sic fecit in actu practico ipse, nono de ing. & quoniam habemus pauca à Gal. de cura huius febris, illa quæ dicit ipse de synocha cum putredine possunt vt plurimum applicari aliis putridis, idcirco quæ ipse in synocha cum putredine dixit hinc febris applicuimus, pariter cum ista febris ab eadem causa fiat, à qua syncopalis humorosa, ideo multa, quæ de ea dicit Gal. 12. de ing. hic retulimus. Restat modo vt sex rerum non naturalium regimen perscribamus. Aer primo non debet alterari versus frigidum & humi

De Feb. curatione 47

midum, quoniam complexio ipsa frigida est, & humida. & febris non est multum intensa, & quoniam intentio est resoluendi, ratione causæ melius est vt declinet versus calidum, & siccum, quam contra. Nam si est possibile, debet esse temperatus. Cibi dicit Auic. non debent esse pulli, vel panis, nisi sit dubium de virtutis imbecillitate, quoniam tunc concedi possunt oua, & contusum. Possumus ergo sic procedere, in primis diebus quoniam sunt phlegmata, quæ forsan per inædiā corrigi possunt, vt tenui diætā, vt dando tantum panatam, vel vt dixi de mente Gal. 12. de ing. tertio aquam mellis cum hyssopo, vel ptisanam cum modico piperis, transactis autem primis diebus saltem septima, vi dēdo quod ægritudo est multum duratura, poterimus dare carnes paruorum animalium, & pullorū, & oua forbilia: debent autem dicit Gale. primo ad Glauc. in hac cura omnes cibi esse incisiui, vnde possumus condere ferculum cum mentha, cum apio, cum foeniculo, cum rebus salis, & similibus, debemus autem post primos dies ingrossare, & semper post attenuare, versus statum procedendo, & seruare omnes regulas, de quibus in de cura tertianæ puræ, hora autem cibandi est post tempus infabricitationis, saltem per quatuor horas ante principium paroxysmi. Quod si non sit tantū tempus debemus videre an peior sit status, vel principium, & cibare in hora meliori 11. de ing. vltimo, in ista febre quia semper peius est principium, est melius cibare in fine status. Potus autem vini apparentibus signis manifestæ digestionis, concedi potest debilis, & aquosus, post procedente digestionē, dari potest fortis. Potus aquæ frigidæ non conuenit, potest coqui addendo res incidentes, & subtiliantes, vt radicē apii, vel foeniculi, & quoniam hic non est intensa febris, vel
fictis

Mathei Curtii

fitis purum debemus dare. Somnus, & vigilia dicit Gale. 12. de ing. tertio conueniunt, somnis enim concoquit, vigiliæ digerunt, & istis intentionibus indigemus in hac cura. Motus quoque, & quies conuenit, quies ratione digestionis, motus ratione resolutionis, & ideo in tempore debito debet vti debito exercitio, quod si ipsum facere non potest, supple cum frictionibus, vt dixi: debet autem pati inædiam, quoniam multum confert, vt dicitur 12. de ing. tertio. Ista corpora patiuntur longum ieiunium, & sic curare debemus, vt omnia superflua excernantur sicuti supra dictum est. Accidentia animi tamen cōueniunt quæ calfaciunt, vnde est q̄ æger aliquantulum irascatur non multum refert, quia tamen quum accidentia excedant, virtutem prosternunt, ideo debemus curare, vt ea euitet æger. Veniamus modo ad correctionem accidentium, quæ istā febrem sequitur, quoniam ista febris multum durat, & materiæ crudæ, & frigidæ membra principalia debilitant, nam sæpe in ista febre sequitur debilitatio stomachi, præcipue oris eius, vnde eius maximam habere curam debemus, sicuti dicit Galen. primo ad Glauc. de cura quotidianæ intermittentis, maxime quando propinquatur status, tunc ergo quia factæ sunt plures euacuationes, & corpus non est plenum, per interius, & exterius poterimus confortare stomachum, puta cum oleo chamomelino, vel de mentha, vel de mastice, vel ex illis faciendo emplastra, per intus poterimus vt dixi dare syrupum de mentha, & exhibere quæ confortant digestionem, vt cinamomum, piper, & poterimus condire fercula cum istis speciebus, & cum mentha, & applicare extra absinthium, & mentham, secundum artem. Sequitur quoque aliquando hepatis debilitas, poterimus quoque in declinatione post omnes
eua-

euacuationes confortare cum speciebus triasandalorum, diarhodon Abbatis, Aromatici rosati cariophilati, faciendo ex istis cum zuccharo morsellos, & dando omni die ante cibum, post dando vnc. 3. aquæ boriginis, buglosæ. poterimus dare zuccharum rosatum, sicuti etiam poterimus fomentare alia membra, si ea videamus debilitata. Vomitus in ista febre multum confert, ut dixi. Vnde si non excedat, impediri non debet, q̄ si excedat, debemus confortare stomachum cum eis, quæ nunc diximus: & tunc poterimus etiam eo perseverante, facere frictiones, trahendo deorsum, ligare extrema cum ligaturis dolorosis, maxime pedes, & ipsa calefacere: sequitur quoque aliquando superfluous fluxus ventris propter membra, quæ debilitata sunt, & tunc dicit Galen. 12. de ing. tertio oportet plus decoquere mulsam, q̄ si plus durat loco mulsæ est dandus cremor ptisanæ, quod si etiam perseverat, nutriet cum sorbitione halicæ, oportet post videre defectu cuius sit fluxus & confortare membrum mandans, & uti clysteribus, & aliis quæ adducunt doctores in cura fluxus, In istis quoque febribus, aliquando est dolor capitis, & tunc si nimium infestat debemus, uti fortibus frictionibus trahendo deorsum, ligare extrema, quod si perseverat, oportet applicare cucurbitulas siccas spatulis, & ponere extrema in aqua calida, & eo adhuc perseverante, dicit Auicen. maxime si factæ sint euacuationes, oportet embrochare caput cum aqua camomeli, & cum talibus resolventibus. Aliquando quoque in harum febrium principio est frigus maximum maxime quando est à phlegmate vitreo, & tunc oportet ante paroxysmum per duas horas uti bonis frictionibus, & dare in potu aquam calidā, & possumus inungere corpus cū oleo de costo post frictiones.

Mathei Curtij

nes, & post abstergere quia aliter faceret, opilationes. Quod si sit prostratio appetitus, oportet confortare stomachum cum eis, quæ dicta sunt, & dare cibos qui placeant ægro, etiam q̃ aliquo modo sic ægro non cōueniant, debemus dare capones, oliuas conditas, pisces salitos & similia quæ appetitum incitant, sed in pauca quantitate. Quod si sequitur oppilatio debemus vti appetitiuis, si cachexia & inflatio eis, quæ adducunt Doctores in propriis curis, & hæc dicta sufficiant.

De Quotidiana continua, quæ dicitur Latica.

Febris Quotidiana continua, quæ dicitur Latica ex phlegmate fit intra venas putrescente, secundo de Crisib. 6. quæ ea habet signa, quæ intermittens, nec cum rigore incipit secundo de Crisib. 6. & 12. & est similis hectice. dicit Auic. prima quarti tract. 2. cap. 5. Quantum ad curam non differt, ait Auicē. nisi quod ista non requirit res adeo subtiliātes sicuti interpollata, & ideo cibi primo debent esse minus calidi, & in minori quantitate, quoniam ægritudo erit breuior, pariter & rebus aliis non naturalibus debemus vti, sic q̃ resoluant, sed minus quā in intermittente, non dabimus cum potu hyssopum vel foeniculum, sicuti in intermittente, digestiua quoque non debent esse adeo fortia, ideo sufficit facere syrupum sic: Recipe syrupi acetosi, vel oxymel simp. vnc. 1. mellis rosati vnc. 5. aquarum foeniculi, & apii, vel radicum eorum ana vnc. 1. & sem. & sic cum istis syrupis debemus digerere: clysteria quoque sufficiunt communia. Conueniunt lenitiua sicuti in intermittente, ac demum solutiua. Crederem quoque, quum ægro ista magis referat, quā intermittens, quū materia sit intra venas, q̃ audacius & in maiori quantitate

De Feb. curatione 49

tate deberemus mittere sanguinem, modo virtus debilis, vel etas non patiatur, vel alię conditiones simul non impediunt, in reliquis nulla est differentia, nisi secundum magis & minus: ideo quę dicta sunt in intermittente, hic etiam applicentur. De syncopi, quę sequitur in cura syncopalis humorosę dicemus.

De cura Epiale, & Liparię.

Diuerso modo sumit hos terminos Gale. & Auicē. Galenus enim secundo de diff. feb. 6. & in lib. de inęquali intemperię cap. 2. de istis loquitur, & in summa videtur velle, quod istę febres fiant maxime à phlegmate, quod Praxagoras vitreum appellat, quando pro parte putrescit, & pro parte non putridum mouetur, & hinc per totam accessionem pars putrefacta facit, vt sentiatur calor, pars non putrefacta facit, & frigus, & horrorem, quod si hoc fiat in partibus paruis alicuius partis sic, quod sensu non possimus discernere, quę sit pars, in qua fit calor, & in qua est frigus, tunc dicitur Epiala, sic quando simul ponimus mel & absynthium in lingua, & non possumus discernere subitum dulcedinis, à subito amaritudinis, sicut dicit Gale. tertio de simpl. 15. quod si partes sint diuersę, sic quod præcisa cognoscemus, vbi est caliditas, & vbi est frigiditas, sic dicitur Liparia, vt si interiora calecant, & exteriora frigescant, vel manus caleseat & pes frigescat, vt patet in lib. de inęquali intemperię cap. 2. & oportet q̃ in istis febribus per totam accessionem duret rigor, & calor: aliter cholericæ diceretur, etiam de tertio genere, dicit Gal. libi, est ergo secundum Gal. febris Epiala, quando in vnaquaq; corporis parte sentitur calor, & frigus per totam accessionem, sic quod sensus non potest

H test

Mathei Curtij

est discernere in qua parte substantiue sit frigus, & in qua sit calor: quum tamen hoc in veritate debent esse in diuersis substantiis, quia duo contraria esse non possunt in eodem subiecto præcise: Liparia autem est quando discernimus subiectum caloris à subiecto alboris, & sunt istæ febres præcipue à phlegmate vitreo, pro parte non putrescente, sed moto per membra sensitiua & faciētem rigorem, qui fit tempore nostro, licet hoc non viderint antiqui, qui utebantur moderato regimine, sicuti ibi, & secundo de diff. feb. refert Gal. Secundum Auicē. vero fit Epiala, quando est phlegma vitreum in partibus interioribus, & eius pars incipit putrescere, alia non putrida, modo ratione partis putrescentis eleuatur vapor ad cor, & fit febris; & post modum descendunt ad partes exteriores, & illas calefaciunt: illa autem quæ non putrescit, & frigida est, modo occurrit aliis partibus, & eas sic refrigerat. Quare interiora apparent frigida, exteriora calida: Liparia vero fit ex phlegmate, vel ex cholera grossa, quando putrescunt in partibus interioribus, sic quod faciunt febrem, & propter eorum vaporem interiora redduntur calida, sed illi vapores non possunt partes exteriores calefacere, maxime quando in illis partibus sunt phlegmata, quæ ipsas infrigidant, & prohibent vapores calidos penetrare, pariter si eleuantur vapores frigidi à phlegmate vitreo, non putrescente, & illi calidi non sunt pauci, tunc frigidi extenduntur ad partes interiores, calescunt, & exteriores frigescunt, nec est necessarium, quod in ista febre extēdatur caliditas per totum corpus, quoniam illud dictū est in definitione febris, quod calor debet extendi per totum corpus, debet intelligi, modo nihil impediat. Sed hic vt dicit Auic. sunt illa phlegmata vitrea in partibus exterioribus, quæ

quæ impediuntur, vel illi vapores illorum phlegmatum, qui sunt frigidi qui extinguunt calidos, & ideo in hac febre non expanduntur per totum corpus. Post Auic. ponit aliam febris speciem, quando in vnoquoque locorum est caliditas, & frigiditas, & ista est quæ Gal. appellat epialam. Sed epiala, & liparia Auic. apud Gal. sunt lipariæ, est ergo tantum differentia in assumptione terminorum, satis tamen est quod istæ febres, vt plurimum fiunt à phlegmate vitreo, & quod in eis per totam accessionem durant calor, & frigiditas. Verum est quod epiala apud Galen. differt à liparia, quoniam caliditas, & frigiditas in ipsa sunt in partibus adeo proximis, vt sensus eas distinguere nequeat: in liparia vero calor sentitur separatus à frigiditate, & sunt in diuersis partibus. Epiala vero secundum Auic. differt à liparia, quoniam in ea interiora sunt frigida, & exteriora calida, & ideo in ipsa sunt fortiora signa frigiditatis, vnde in ea vt dicit Auic. est vrina cruda frigida, & pulsus rarus & tardus, & vt plurimum aduenit omni die, & aliquando conuertitur in quartanam & tertianam, eius paroxysmus durat à quatuor horis vsque ad xxiiii. In febre vero liparia interiora calescent, & exteriora frigescunt, vnde non apparent signa adeo frigida ratione operationum membrorum interiorum, & ista durat plusquam hemitriteus, dicit hic Auic. & hoc videtur etiam dicere Galen. primo. Aphorif. xii. & per typhoidem intelligit istam lipariam Auic. Cura harum febrium non differt à cura aliarum phlegmaticarum, excepto quod quum sint à phlegmate vitreo, quod est intensissime frigidum, vt dicit Galen. lib. secundo, cap. 26. quod indigemus fortioribus calefacientibus, ideo digestiua debent esse fortiora, pariter clysteria, item solutiua debent maxi-

Mathei Curtij

me respicere phlegma vitreum, & dari in maiori dosi, & fortiora, quia est materia difficilis educationis. Quā tum ad alia omnia conuenit cum aliis, ideo eadem remedia eodem modo quæ fuerunt adducta in cura quotidianæ intermittētis, hic sunt applicanda, & est habenda cura membrorum sicuti in ea diximus, semper tamen calidiora debent dari, vnde Paulus laudat diacalamentum, & confectionem diatrion pipereon. quum ergo quæ conueniunt dicta sint, hæc pro cura sufficiant.

De syncopali humorosa & ipsius curatione.

Syncopalis humorosa, fit ex humoribus multis phlegmaticis crudis qui opprimunt os stomachi. 12. de ingen. tertio sic quodd sequitur syncopis primo ad Glanc. de cura continuæ cum accid. sua multitudine, vel quando incepit putrescere, & mouetur, tunc eleuatur vapores frigidi ad cor. qui faciunt syncopim dicit Auic. prima quarti tract. secundo cap. 55. & hoc maxime fit in principiis accessionum primo ad Glanc. de cura continuæ cum accid. eius signa sunt dicit Gal. xi. de ing. tertio præcordia inflata, & totus corpus inflatum magis quàm ægri naturalis dispositio exigat, color albidus, similis colori laborantium aqua inter cutem, nonnullis niger aut liuidus, scilicet plumbeus, pulsus obscurus & inæqualis semper, secundum se totum, aliquando etiam in systole. Paroxysmus eius est sicut quotidianæ dicit Auic. cap. proprio oculi sunt virides, accidit nocte vel vesperi 12. de ing. quinto, ea enim est hora phlegmatis sexto epid. particula prima tract. 13. verum est, quod ea quæ est in vespere est peior, quia phlegma anticipat horam suam, & sic arguit maiorem multitudinem

titudinem huius febris. Cura quidem est difficilis, quoniam virtus est debilis, & euacuationes quæ essent necessariae, non suffert, hinc si educitur materia, virtus prosternitur, pariter si materia restat, virtutem prosternit: est ergo difficile eam curare, in eius tamen cura sic est procedendum, quando incipienda est cura, vel æger habet phlegmonem, vel aliquod aliud apostema in interioribus, vel non: si habet, iam est desperata salus, dicit Gal. 12. de ing. tertio. unde oportet mortem prædicere ad euitandam ignominiam, & non est vtendum aliquo genere medicamentorum: pariter si humores sint crudi & putrefacti, & coqui non possunt, eorum salus est desperata: si vero nec phlegmone sit, nec humores de eo putridi sint, tunc est spes salutis, & tunc potest curam adire medicus, & quando adit, vel est tempus syncopis, vel non, si est tempus syncopis, quoniam magis vrget quàm febris, ideo ei est attendendum, principalis ergo intentio tunc est releuare virtutem oppressam, nihil autem est, quod magis & citius hoc faciat, quàm vinum, secundo Aphor. xi. Ideo subito est dandus panis infusus in vino, xii. de ing. tertio. Vinum autem debet esse calidum natura, quod decoctionem in corpus promouet, & sic debet esse colore fuluum, substantia tenue, ætate vetus, & boni odoris xii. de ing. quarto, si in tempore, regione, & statu coeli calidis promixtum sit cum aqua frigida, si vero frigidis, cum aqua calida, & post cum calida est perfeuerandum. xii. de ing. tertio quod si non sit syncope, videndum an succi crudi sint multi, & crassi, sic quod exiguos animalis meatus obstruant, tunc illi succi nisi concoquantur, nutrire non possunt, sed virtutem grauant, & in syncopin deducunt, & sæpe homines opprimunt. Quod si non tantum grauant, quod obstruât,

Mathei Curtij

nec onerent, sic syncopin non faciunt, sed tamen lipo-
thymiam. 12. de ing. quinto, considerandum quoq; est
an virtus in se sit fortis, vel debilis, vt fortioribus vel
leuioribus vti possimus medicamentis, virtute ergo
existente debili, & succis existentibus multis, tunc non
est possibile mittere sanguinem, nec dare pharmacum.
Ideo Galen. 12. de ing. tertio, iubet, vt tantum persi-
stamus in frictionibus cum panno aspero, incipiendū
à partibus inferioribus ascendendo, & post si sit peri-
culum lassitudinis, inunguendo sicuti in cura quotidiana
intermittentis, diximus. In hac ergo dispositione
non vult Galen. quòd aliud faciamus, & quoniam ta-
lia corpora possunt pati inedia multam, & illi succi
possunt cōcoqui, & post nutrire, ideo per primos tres
dies iubet Gale. quòd demus aquam mellis cum hyss-
opo vt iuuetur concoctio, & abstergantur materiæ
multæ, & educantur virtute hyssopi, quòd si mulla fa-
stidiat dat succum ptisanæ vel oxymelitem, vel modo
hoc, modo illud, & perseverante constantia virtutis si
est possibile vltra tres dies vtatur eadem inedia vsq;
ad septimam. Sic etiam nos secundum maiorem, vel
minorem constantiam virtutis cibabimus, tantum dā-
do, quantum virtus potest durare, & si dubitamus de
virtutis constantia, dabimus panatellam, vel ferculum
ex farre semper iniungendo secum res calefacientes,
& incidentes, quòd si virtus non sit adeo debilis, fa-
ciendo frictiones, etiam dicit Galen. xii. de ing. tertio
vtimur clysteribus, quòd si etiam videbimus maiorem
virtutis constantiam, quoniam materiæ, quæ peccant,
sunt vt plurimum in stomacho, & in venis meseraicis,
à quibus non potest educere clyster, crederem quòd
tunc possemus dare vnciam vnā cassiæ, vel vnc. 2.
mannæ, quia in veritate, non multum agitant, & for-
san

san si eas cognouisset Gal. dedisset. Crederem quidē,
quòd istis crudis nullo modo esset fienda phlebotom-
ia, licet secus dicat Alex. lib. sexto cap. proprio, his
rebus in principio peractis, poterimus dare oxymel
æstate frigidum, hieme calidum, & sic cum tenui diæ-
ta, cum clysteribus, cum digestiuis poterimus procede-
re vsque ad septimam, in primis tribus diebus non dan-
do cibum, nec sorbitionem, nec aquam, nec permitten-
do, vt æger multum bibat. Post autem vt credo, quan-
do dubitamus de virtute, est ordinanda grossior diæ-
ta, etiam post semper attenuando, sic quòd in statu èt
tenui diæta vti possimus & virtus possit durare, sic pro-
cedendo dicit Gal. debemus euitare aerem, vel nimis
calidum, vel nimis frigidum, sed sit temperatus, vel in
æstate declinans ad frigidum, in hyeme ad calidum,
quod poterit fieri artificialiter, puta in æstate sternen-
do cameram cum frigidis, in hyeme accendendo ignē
in camera, balneum quoque prorsus non cōuenit, pro-
cedente quoque ægritudine, iam factis dictis euacua-
tionibus poterimus applicare calefacientia, maxime
si non sit multum intensā febris, vt inunguendo cum
oleis calidis, vel temperatis, vt cum oleo chamæme-
lino, debemus tamen semper, dicit Galen. primo ad
Glauc. de cura continuæ cum accid. concoquere absyn-
thium, & confortantia stomachum, quoniam est habē-
da maxima cura de stomacho: victus autem, vt dixi, sit
in principio tenuis, & debemus dare quæ habent vim
incidendi, vnde Galen. primo ad Glauc. ibi dat piper
diatrion pipereon, & diaspoliticon. Nos autem dan-
do aquam mellis aduertamus, si sit nimis fluxus ven-
tris quare tunc magis decoquamus mulsam, vel dabi-
mus prisanæ cremorem, vel sorbitionem ex halica, sic
poterimus iungere cibum, secundum quod apparebit

H 4 neces si-

Mathei Curtij

necessitas pro sustinenda virtute. Somnus, & vigilia ambo conueniunt moderate, tertio, de ing. tertio, quiescant, quoniam agitatio membrorum, dicit Auic. facit ad syncopim. Vtemur tamen frictionibus, vt dictum est, & sic est curandum, vt saltem excrementa tertiæ digestionis excernantur. Accidentia autem animi conueniunt, quæ calefaciunt, sed non immoderata, ne virtutem prosternant. hæc omnia sunt facienda quando est timor syncopis, secundum Galen. 12. de ing. tertio, & quarto, & primo ad Glauc. de cura continuæ cum accid. quod si non sit materia tanta, vt timeamus syncopim, sed tantum lipotymiam, & virtus sit fortior, tunc dicit Galen. 12. de ing. quinto, quod istos magis cibare debemus vnde iis dat vinum post cibum maxime si sint senes, quod non fecit in capit. 3. quando est dubium syncopis, nec in primo ad Glauc. Cibi autem debent esse tantum calidi, & extenuantes quantum febris potest sufferre, oportet autem euitare eos cibos qui sint frigidi, & crassi nutrimenti. Medicamenta etiam iis possunt dari, vnde vtimur fortioribus clysteribus, & audacius lenitiuo in principio, & tandem procedente ægritudine, apparentibus signis completæ digestionis, in hoc vna essem cū Alexandro vt possemus vti medicina soluente, & forsan phlebotomia vti in principio. Nec esset adeo necessarium vti tenui dieta nec tot frictionibus, nec hoc negat Galen. & si sic Alexander intelligit de isto, forsan non est contra Galen. qui primo curat quando est periculum syncopis secundo in cap. 5. in fine quando tamen periculum lipothymix, & sic in principio non dat vinum, sicuti facit in secunda, potest etiam venire syncopex ex materia biliosa 12. de ing. tertio, & his conueniunt frigida, sed hanc curam nunc omitamus.

De

Syncopalis Minuta, est febris, quæ fit ex humoribus tenuibus, qui facile exhalant, maxime si retentrix sit debilis, & expulsiua fortis, & pori lati, sic quæ tñ resoluitur virtus, quod incidunt in syncopin, 12. de ing. sexto, à sanguine autem nec ab alio humore fieri non potest per se, sed ex cholera, sicut colligere possumus primo prognost. 10. & 11. Addit etiam Auicen. quod fit ex materia ventosa, est autem febris continua, quia aliter non esset exitiosa, aduenit autem in ætate, complexionem, regimine. calidis, & siccis, sicut colligere possumus 10. de ing. 3. in illo iuvene qui laborabat hac egritudine sicut testatur idem Galen. 12. de ing. sexto, eius signa sunt, ex loco nunc citato, nasus acutus, oculi caui, & alia quæ de facie. Hippocratica dicit Hypp. Primo prognost. octauo, nono, & decimo, siue multum excernant, siue vigilent, siue tristentur, siue non cito nutriantur. Si in principio talis facies appareat, huius febris est signum, verum si appareat cum istis, est minus periculum 12. de ing. sexto, sicut etiam dicit Hypp. primo prognost. Quod si appareat sine istis, est maius periculum, quia tunc est signum, quod est tantum ex malignitate materiæ. Aduenit autem syncopis in ista in tempore maioris resolutionis, & ideo in statu, & in hoc differt à syncopali humorosa. Huius febris cura est etiam multum periculosa, & quum opposita sit ad humoralem, opposita quoque exigat remedia, si ergo in ea virtus sit debilis, & sit apostema in membris interioribus, iam est desperata salus. Quod si non sit apostema vel actu est syncope, vel non, si est, oportet dare cibum, puta panem infusum in vino, sicuti fecit Galen. in illo iuvene 10. de inge. tertio, quod si non sit syncope,

Mathei Curtij

syncope, est videndum an possumus curare causam, & praevidere, ne sequatur symptomata, & ea erit optima cura, modo non sit aliud symptoma, quod impediatur: quum ergo curam addimus, si virtus sit debilis, & sæpe pariter, ter, vel quater cibabimus, sed parum pro vice, quod si virtus sit fortior, tunc rarius cibabimus, sed & plus dabimus, & tunc forsan licebit vti aliquo lenitiuo, vt dare cassiam vel mannam. Sic igitur procedendo, omni cura studebimus vti cibis, & medicinis densantibus corpus, vt applicando corpori olea astringentia, dando cibos grossi nutrimenti, & procedente ægritudine vigorata virtute, ingrossatis humoribus, densato corpore, forsan poterimus dare aliquod soluens, quod educat materiam cholicam, & confortet membra, vt Rhabarbarum vel Myrabolanos citrinos in substantia, post procedendo cum rebus confortantibus membra, demum poterimus in declinatione vti leuibus frictionibus, quando non est amplius timor synopis. Aer autem debet esse frigidus, & astringens, cibi ingrossantes & qui conueniunt, panis, sorbitio ex halica, fructus austeri, qui non facile corrumpantur, & per se, & cum pane, item halica cocta in aqua, possumus dare oua, præcipue vitellos, testiculos gallorum, suillum cerebrum assatum, non cruentum, in albo iure elixum, & demum conueniunt omnes cibi qui sunt crassi nutrimenti, & qui densant, & exhalatione prohibent. Vinum in principio aquosum, post cibum conuenit, & post quartam apparentibus signis concoctionis, potest dari caro pullorum gallineaceorum. Etiam somnus conuenit, quia in ipso non fit tanta commotio sicuti in vigilia. Quies pariter. Ideo debemus euitare nimiam vigiliam, & motum, inanitio quoque non conuenit nec nimia repletio. Accidentia animi, quæ

De Feb. curatione 54

quæ resoluunt, ideo euitent. Hæc est cura sincopalis minutæ, vt ipsam, à Gal. 10. de ing. tertio, & 12. de ing. sexto colligere porui.

De febre Diurna & Nocturna.

Auicenna vltimo ponit caput de febre diurna, & nocturna, & diurna est quando febris inuadit in vespere, quando citius inuadere non potest, quoniam sincopalis humorosa 12. de ing. 5. quæ ex maiori multitudine quæ fieri possit in phlegmaticis, tantum vel in vespere, vel in nocte adueniat. Dicitur ergo diurna, quæ semper in vespere aduenit, nocturna quæ semper in nocte, est autem differentia inter eas, vt etiam habetur primo epid. quia diurna est peior, & longior. Quum enim phlegma de nocte inuasionem facere debeat, quando facit de die, est signum maioris malitiæ, & maioris multitudinis. Item est mala, quoniam in nocte, quum inuadit in vespere, non potest æger dormire, primo quoniam in primis horis est principium, & augmentum febris, in quo tempore non conuenit somnus, in fine autem est declinatio, & tunc oportet dare cibum, & non dormire, & ideo sic parum dormiunt, vel si dormiunt, ducunt vitam vesperrilionis, dicit Galen. primo epid. quod tamen de die dormiunt, hinc est periculum, ne ad hecticam producantur & sic febris diurna est multum difficilis. Istæ autem febres vt dicit Auic. non requirunt diuersam curam ab interpollaris. Ideo quæ ibi dicta sunt, hic applicetur, & de febribus phlegmaticis satis.

De

Mathei Curtij
De cura Quartana Periodica.

Quartana pura intermittens ex humore melanco-
lico fit secundo de diff. febr. quinto, putrescente extra
venas, transmissio ibidem, & hic humor est naturalis,
& præternaturalis tertio Aphor. 22. Naturalis est
pars grossior sanguinis quæ eius sex dicitur, & præter
naturalis est qui atrabilis appellatur 14. de ing. nono.
Fit autem ea, quæ est præternaturalis, vel ex adustione
flaue bilis, vel melancholiæ naturalis, sexto Aph. 59.
ex phlegmate vero putrefacto, ac adusto secundum Ga-
len. non fit melancholia, quia semper est album, ut pa-
tet de phlegmate gypseo, verum est quod forsan tantum
potest indurari quod faciet quartanam, & sic affliget
de quarto in quartum, & hoc voluit Avicenna. hic, quan-
do autem iste humor facit quartanam, & semper, est
atra bilis, secundo Aph. 22. & secundo, de diff. febr.
quinto. Quoniam si fit à melancholia naturali, fit tan-
tum, quando putrescit, secundo de diff. febr. quinto, &
quando putrescit, fit atra bilis, quarto Aph. 2. fit quo-
que ex successione aliarum febrium, tertio Progno.
33. & raro à nocumento splenis absoluitur, primo
epid. & quæ absoluitur primo est salubrior, primo epid.
particula tertia, & de se est salubris, & liberat ab epi-
lepsia, quinto Aph. 59. sexto, epid. particula sexta. in fi-
ne, ut plurimum autem aduenit in autumno, tertio Aph.
22. Maxime si frigidus sit, & siccus, vel inæqualis se-
cundo, de crisi. quarto. Aduenit quoque in complexio-
ne atræ bilis primo ad Glauc. de signis quartanæ ma-
xime si transit ætatem consilientia quando est usus ci-
bis, & regimine facientibus atram bilem, & quando
atra bilis abundat, secundo de diff. febr. quinto, pari-
ter si locus, talium febrium sit productivus, & tunc
com-

communiter vagentur, vel febres inordinatæ præces-
 serint primo, ad Glauc. de signis quartanæ, & sequitur
 nocumentum hepatis, vel lienis secundo de Crisi. quar-
 to, huius febris signa sunt pulsus tardi, & in principio,
 secundo de Crisi. primo, ad Glauc. de signis quartanæ,
 post fiunt veloces & frequentes, urinæ tenues, albæ,
 & aquosæ, in principio secundo de Crisi. quarto, calor
 paulatim accenditur, & increfcit sicut ignis accensus
 in rebus frigidis, & siccis, secundo de diff. febr. quin-
 to, non aliquod humidum relinquit, longiores habet
 cessationes, unde non affligit, nisi de quarto in quartū,
 ad perfectam terminatur infebricitationem. Rigore
 similem habet eis, qui maxime frigescent, secundo de
 diff. febr. quinto, non tamen multum magnum secun-
 do de Crisi. nono, spatium accessionis est simile spa-
 cio accessionis tertianæ, aliquando etiam longius, se-
 cundo de diff. febr. quinto, Gal. ut dixi, vult quod quar-
 tana fit tantum ab atra bile, quæ tamen potest fieri, vel
 ex bile putrescente, vel ex melancholia, unde non varia-
 tur hæc cura ratione diuersitatis materiæ, nisi secundū
 magis, vel minus, licet secus velit Auicenn. procedendo
 ergo in ista febre ad mentem Galen. pauca sumitur in-
 dicatio à febre, sed omnis ferè ab eius causa, causa au-
 tem huius febris est humor frigidus, & siccus, & gros-
 sus, ideo si ipsum auferre, & educere volumus, sicuti
 est necessarium oportet euacuare, sed prius incidere,
 & quoniam viæ non sunt apertæ, oportet eas aperire:
 est ergo intentio principalis de incidentibus, aperien-
 tibus, & subtiliantibus, & post de educentibus mate-
 riam melancholicam. Sed ante, educere oportet, quæ
 sine viarum apertione, & eorum incisione, vel subtilia-
 tione, educi possunt, hæc autem sunt quæ per phlobo-
 tomiam educuntur. In qua non expectamus coctio-
 nem

Mathei Curtij

nem 11. de ing. 15. oportet ergo, dicit Gale. primo ad Glauc. leuiter tractare, nullum forte medicamentum, aut euacuationes exhibentes. videndum autem est, an sanguinis superabundet, & si superabundet, seruat is regulis iam dictis, est incidenda vena interior, vel media sinistri brachii, quod si sanguis exeat niger, & crassus, est mittendus satis copiose, quod si flauus statim est suppressendus, nec educendus. Curandum post est, ut cum rebus solitis in sanitate venter sit lubricus, si hoc non possit fieri, utendum est clysteri cōmuni, post fortiori, ut ponendo in eo drag. 2. diaphiniconis, vel vnc. 5. diacatholiconis, vel confectionis Hamech, & quoniam lenitiua in principio, ut dictum est, conueniunt, si sint materiæ redundantes in stomacho, vel in meseraicis, tunc ratione ipsarum, etiam in principio possumus dare aliquod lenitiuum, ut dando vnc. 1. cassiæ, & 3. i. confectionis Hamech, dissoluendo cum aqua lactis, quæ licet sit frigida, ut patet, quarto de simp. 16. habet tamen aliquas partes calidas, ut colligitur, tertio de alim. cap. de lacte acetoso, ideo ratione earum deducit melancholiam, sed sine agitatione, quod si natura tentet vomitum, quoniam multæ materiæ melancholicæ à splene ad stomachum transferuntur, ideo leui vomitui debemus iuuare, ut cum aqua hordei tepida, & syrupo acetoso, fortiora autem vomitiua in principio non conueniunt, si æger de se facile vomat, oportet dari vomitiuum ante cibum, quod si non, post cibum, quoniam cibus iuuat vomitum, maxime si sint cibi valentes in stomacho, his factis in ipso principio restat, ut ad subtiliationem, & incisionē alterius materiæ deueniamus, hic est opposita intentio scilicet humectandi, quæ conuenit ratione materiæ siccæ, & febris, & uti rebus siccis, ratione incisionis, apertio-

apertionis, & subtiliationis, hæc enim fieri debent cū rebus siccis, imò humida eorum virtutem retundunt, & sic quum principalis intentio sit incidendi, aperiendi, & subtiliandi, quod habet fieri cum rebus siccis, sic ca magis conueniunt, vnde Galen. primo ad Glauc. in hac cura nō dicit, quòd debeamus vti humidis, sed subtiliātibus &c. licet secus dicāt omnes moderni. Crederem tamen quòd scilicet primo debemus permiscere humida, ne materia nimium terrestificetur. Poterimus ergo facere hæc, & cum decoctionibus, & cum syrupis, incipiendo à debilioribus, & mitioribus, primo laudat Auice. mel rosatum, & syrupum acetosum, ideo poterimus sic formare, recipe syrupi acetosi vnc. i. Mellis rosati vnc. 5. Aquarum cichoreæ, & lupulorum ana vnc. i. & sem. Poterimus cum isto syrupo per aliquot dies procedere, post venire ad fortiores, vt recipe syrupi de pomis, vel de epithimo, vel de fumoteræ vnc. i. si aliquo aliter etiam sit intentio educēdi, oxy mel, simp. vnc. 5. aquarum tamarisci scolopendriæ & fumoterræ vnc. i. Milce pro syrupo. Poterimus quoque digestiū in forma decoctionis conficere, vt Recipe radicū capparū, polypodii ana vnc. i. foliorū tamarisci & scolopendriæ ana m. 5. seminum anethi, & ameos ana vnc. i. Passularum vnc. 2. decoquantur in sufficienti quantitate aquæ vsque ad consumptionē medietatis aquæ, & deinde fiat colatura, & accipiat summo mane vnc. 6. Cum istis igitur digestiuis procedendo, si non habeat beneficium ventris non deficiemus à clysteribus, semper faciendo eos fortiores, quanto magis ad statum erimus pròximi, pariter dabimus cibos, & medicinas, vrinam prouocantes Apparentibus autem signis completæ digestionis, incisis humoribus, apertis viis, tunc est dandum pharmacum, quod

Mathei Curtij

quod atram bilem possit educere, & quoniam sæpe humores qui peccant sunt difficilis educationis, sic quòd vna die educi non possunt, ideo dicit Galen. primo ad Glauc. de cura quartanæ, est iterandum medicamentum. Galen. ibi dat elleborum album, nos ipso non utimur, possemus tamen securè uti elleboro nigro, sic formando medicinam, Recipe radicis ellebori nigri minutim incisæ drag. 1. infundatur in aqua mellis, decoctionis anethi, & amens ana drag. 3. florum viol. borag. & nenuph. ana drag. 2. maneât in infusione per diem integrum, & inde fiat levis ebullitio, & collatura, quæ detur in aurora, poterimus in ea dissolvere vnc. 1. & sem. mannæ, vel drag. 5. cassiæ, & sic dare. Medicamentum autem dabimus in vna die infebrecitationis, post dicit Galen. poterimus dare theriacam puta drag. 1. vel Mithridatum, vel diatrion pipereon, vel piper cum aqua quotidie, & sic confortabimus membra, & iuuabimus digestionem post cum prouocantibus vrinam, & sudorem, cum exercitiis debiti curabimus, ut reliqua resoluantur. Quo vero ad sex res nō naturales, Aer non sit frigidus, sed declinans ad caliditatem, quia sic abbreviatur quartana, vnde secundo. Aph. 25. dicit Hyp. æstiuæ breuiores. Cibi debent esse ex rebus optimis, non ex flatuosis, & tenacibus. Vnde dicit ipse arcendi sunt à carnibus porcorum, & similibus, si est possibile dicit Auic. stet per primas tres hebdomadas sine carnibus, post possumus eas dare, post tamen quanto magis versus statum procedemus, plus debemus subtiliare, dicit Gale. quòd si non possit tolerare tantum carniū inedia, & si oportet dare carnes ante tres septimanas, dandæ sunt carnes paruorum animalium in diebus infebrecitationis, dicit Auic. sic tollitur quædam contradictio, quæ videtur esse

se in eorum dictis, Abstineant à cibo in die paroxysmi, utatur ergo pro carnibus, & pullis gallinaceis, & aliis volatilibus quæ sunt boni succi, & similibus. Concedant cibos incidentes & calefacientes, ut synapi, cap-pares, & ita utantur cibis tenentibus mollem aluum, maxime si sint soliti, ut utendo brodiis carniū, rebus conditis cum oleo, pisces quoque comedant qui sunt facilis digestionis, & mollium carniū, vinum autem bibant tenue, album, & mediocriter calidum. quod si bibant aquam sit decocta cum radice apii, fœniculi, capparum &c. Istis autem cibis utendo seruent regulas vniuersales iam superius datas. Somno utantur moderato, vigilia moderata. Quo ad motum, & quietem utantur dicit Galen. frictionibus, quod si sit accessio brevis, diebus interpollatis utantur solitis exercitiis in sanitate, curent ut superflua omnia excernantur, fugiant omnino tristitiam, quia est vna de causis humorum melancolicorum, stent latri, & viuant in choræis, audiant cantantes, & pulsantes instrumenta, auditum delectantia, audiant tantum quæ delectant: hæc quantum ad regimen, in sex rebus non naturalibus. quo vero ad correctionem accidentium tria sunt membra, quæ præcipue leduntur in quartana, stomachus, splen, & hepar, & quoniam stomachus expellit, splen nutritur, hepar generat humorem melancholicum ideo de eis habenda est cura, stomacho sunt applicanda confortantia cum rebus calidis, sicuti applicando absynthium, masticem, spicam aloen, rosas, vel ex eis faciendo ceratum, si volumus magis confortare, addenda sunt cydonia 13. de ing. cap. nono. Sic ergo confortamus stomachum cum exterius applicitis, & interius cum eis, quæ dicta sunt post exhibitionem pharmaci, ideo ipse melius potest digerere, & si sint
I mali

Mathei Curtij

mali humores in eo, expellere. Splen, & hepar de facili indurantur 13. de ing. cap. 10. hepar quidem quia tunc continet sanguinem grossum, lien vero quia ipsum trahit ad se. Ideo per intus debemus dare res abstergentes, aperientes, & euitare viscosas, hæc quæ sint, quātum ad medicinam dictum est, in loquendo de digestiuis. Quantum ad cibos, loquendo de cibis, exterius oportet applicare res calefacientes, & mollificantes, oportet tamen semper addere res confortantes, vt absinthium 13. de ing. cap. nono & decimo, & quoniam isti sunt tristes sunt applicanda cordi, vt flores boraginis, & similia quæ spiritus habent confortare, & hæc pro cura quartanæ periodicæ.

De cura Quartanæ continuæ.

Quartana continua, fit ab humore melancholico, contento in venis, ideo easdem habet causas, & eadē signa, quæ habent interpollatæ: differunt tamen secundum magis, & minus, & ista nunquam ad infebri citationem terminatur, in cura quoque dicit Auicenna non differt ab interpollatis, tantum differt, quoniam in continua non debemus vti rebus adeo calidis sicuti in interpollata & in continua quoniam materia est intra venas, est magis necessaria phlebotomia, & non æque debemus vti carnibus in continua, sicut in interpollata quia est breuior, & egemus subtiliore diætā.

De cura Quintanæ Septenæ, & Nonanæ.

Circa has febres videtur esse aliqualis diuersitas inter Hyppocratem & Galenum. Hyp. in primo epid. sectio-

sectione tertia, dicit dari istas febres, Galen. ibi dicit quòd nunquam vidit septenam, & nonanā, quòd quin-
tanam nunquam vidit manifestam, idest durantem, in
suis paroxysmis, sed aliquando occultam, idest mutan-
tem paroxysmos, sic quòd veniebāt aliquando duo pa-
roxysmi quintanæ, post mutabantur, & si venit septe-
na nō est dicendum quòd id ex terminato humore sit,
sed ex inordinato regimine, vt si adueniat vnus paro-
xysmus, qui amplius de se non rediret, & q̄ æger uta-
tur inordinato regimine, potest esse in alia septena
alius reuertatur paroxysmus, sed id non est ex natura
humoris, sicut videtur dicere Auicen. nam sic esset ex
humore apto pro quartana sed pauciori, quare sicuti
datur, quintana, septena, & nonana, ita non datur sex-
tana, octena, & dena? secūdm quòd erit maior, vel
minor quantitas materiæ. Item tunc non videtur q̄
septena sit salubrior quintana, quia sic in ea erit maior
adustio: non possumus ergo dicit Galen. ratione deci-
dere istam quæstionem, sed est decidenda experimen-
to. Credendum est quidem Hyp. qui dixit quòd da-
tur, sed ego eas non vidi, & quoniam hoc tantum ex-
perimento comprobari potest, ideo ex me nō possum
dicere quòd dentur, sicuti Galen. in totum negat has
febres, nec contradicit Hyppocrati. Sed conuenit q̄
ex se non potest dicere quòd dentur, & quoniam hoc
est decidēdm experimento, non ratione: & quoniam
ipse eas vnquam manifeste vidit ideo non potest dice-
re, quòd dentur, credendum tantum est Hyppocrati,
qui dicit quòd dentur. Quintana ergo dicit Hyp. est
mortalis, & reperitur cum phthisi. hoc Gale. dicit esse
verum vniuersaliter, Auicen. indefinite septena est lon-
gior, sed nō mortalis, nonana iterū est lōgior, Secūdm
Gale. ergo non possumus dicere, ex qua materia fiant

Mathei Curtij

istæ febres, & earum curam nullo in loco posuit. Ideo secundum ipsum earum curam non possumus explicare. Auice. autem quum velit quòd fiant ex eadem materia, ex qua quartana maxime phlegmatica, ideo dicit, quòd eius cura est sicuti cura quartanæ phlegmaticæ, ideo quantum ad cibum debemus primis tribus diebus subtiliare regimen, post iterum ingrossare, & demum, quando versus statum procedimus, subtiliare. Cibi autem debent esse boni nutrimenti, & velocis digestionis, non grossi, & viscosi, ita in aliis rebus non naturalibus, debent regi, sicuti in aliis quartanariis dictum est. Quantū ad medicinas, debemus procedere. Primo cum digestiuis, & similibus iam dictis, & post uti educentibus, & maxime per vomitum, & poterimus, cum hieris appropriatis educere humore peccantem, poterimus post exhibere theriacam, & in reliquis uti eis, quæ diximus in cura quartanæ.

De cura Febris hecticæ.

Tres sunt corporis particule spiritus scilicet, humores, & pars solida, quòd si febris esse debet in aliquam partem in calefacto esse, positum, est esse necessarium, primo de diff. febr. primo quòd si sit illa caliditas in parte solida impressa, tunc est febris hectica. primo de diff. febr. octauo, verum est quòd, quoniam hectica dicitur, idest habituata vel habitum occupans primo de diff. febr. septimo, quando est in ipso principio, & adhuc ipsum habitum non firmiter occupauit, dicitur potius schetica, octauo de ing. primo, quando occupauit dicitur hectica, calor autem ille in solidis existens, vel tantum ponit humores & humiditates, in ebullitione, & tunc dicitur principium, vel exiccat membra solida,

da, & tunc dicitur tabes, vel quoniam vt dicitur sexto de ing. septimo, decimo de ing. vltimo, exiccationes sic procedunt, quòd primo exiccentur humiditates, & hoc duobus modis, vel illæ quæ sunt adhuc in paruis venis, vel quæ sunt extra venas, vel adipem & pinguedinem, vel membra solida, si exiccatio fiat non in membris solidis, sed in aliis est medium, sic in tres partes diuiditur ista febris à Gal. primo de diff. febr. nono. Ista autem quæ in medio est habet latitudinem, secundum quæ sunt diuersæ exiccationes. Illa in qua exiccantur humiditates inuenis est proximior principio, post in qua exiccentur, quæ sunt extra venas per ordinem, post illa in qua exiccetur, & adepes, & caro, & ista est proximior tabi, vera ergo tabes est in qua corruptæ sunt humiditates nutrimentales, & exiccantur humiditates radicales, & ista est penitus incurabilis decimo de ing. vltimo, primo de diff. febr. octauo, principium facile curatur, medium facilius & difficilius curatur, secundum quòd magis accedit ad tabem, quæ enim est proximior tabi, est difficilioris curæ. Quum tamen omnes humiditates, excepta radicali, quæ est membrorum solidorum, sint reparabiles, ideo omnes partes hecticæ, in quibus tantum consumuntur humiditates nutrimentales, sunt curabiles, & quoniam humiditas radicalis reparari non potest, (aliter enim esset remedium morti.) Ideo tabes exquisita, est incurabilis, hæc omnia colliguntur, septimo de ing. sexto, decimo, & vltimo, sic ergo diuersificatur hectica, quam secundum speciem distinxit Auicenna. hæctica, potest fieri incipiendo primo de diff. febr. octauo, tertio, de prognost. ex pulsu, tertio, sed fit cum ephamera, quando est fortis causa primo de diff. febr. octauo, per se sola fieri non potest incipiendo, in principio tamen cognosci po-

Mathei Curtij

test minime, quia habet signa etiam ephemera, sic intelligere Galen. debemus secundo, de Crisi. ultimo, si ergo fiat incipiendo habet omnes partes, verum si sequitur putridas, sicuti in plurimis est, primo de diff. febr. octauo, non est necessarium quod præcedat principium, nec omnes partes per ordinem, sicuti ibi ostendit Galen. Aduenit autem non in complexione humida, sed sicca, maxime si sit iuncta caliditas, si vita sit in laboribus, in vigiliis, in curis, cum victo pauco, in æstate, ac statu cœli calido, & sicco, regione pariter calida, & sicca, & loco simili, & ista febris maxime solet inuadere ex ira, tristitia, hæc omnia habentur, primo de diff. febr. nono. Signa hæctica quando adhuc non est tabes, sunt similia præcedentibus causis procatarticis, facientibus caliditatem, & siccitatem, ut esset ira, tristitia &c. & æger febrit, & eo transacto die caliditas nec augetur, nec minuitur, & ariditatem representat, tunc suspicandum est de hæctica, quod si permanferit vsque ad quartam diem, & nihil pariter fuerit immutatum, & permaneant ariditas cum caliditate, quæ primo tactu appareat mitis, post acris, mordax, & arida, tunc certe est dicendum quod est hæctica, si calor post cibum per horam, aut duas augeatur, & pulsus fiant maiores, & velocius, sic quod videtur noua accessio, tunc est signum indubitatum hæctice, tertio progn. sexto. Item caliditas est æqualis sine excrescentiis, excepta illa quæ est post cibum, pulsus est debilis, paruus, durus, & frequens, caliditas est maior in arteriis, hæc sunt signa hæctica à Gale. collecta primo de diff. febr. nono, quod si transeat in tabem, tum oculi sunt immodice concaui, exhausto eorum liquore, sicci, flos vitalis extinctus, siccitas immoderata, habent inopiam vigilandi nec vere dormiunt, collapsa sunt tempora, ita appa-

apparent in visceribus, & intestinis, & tandem nihil aliud sunt quàm pellis & ossa, cutis est arida, & pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens, caliditas mordacior apparet quanto magis tangitur, & sic ex istis signis tabidos facile cognoscimus, hæc Gale. primo de diff. febr. nono, de hectica, quoniam tantum calor sit cum siccitate in membris solidis impressus sine humoribus. Si pura sit, ideo in ea à causa nulla sumitur indicatio, omnis igitur indicatio, in eius cura ab ipsa sumitur febre, febris autem est morbus calidus, & siccus primo reg. acut. 42. Ideo in ea est tantum indicatio de frigidityte, & humiditate 10. de ing. septimo, complexio autem, & aer indicant de applicatione rerum magis, vel minus frigidarum & humidarum, nono de inge. 14. Res autem frigida & humida quibus utimur in cura hectica, vel sunt exterius applicanda vel interius sumenda, exterius applicanda sunt aer, medicamenta, & balneum, interius autem sunt quæ eduntur, & bibuntur, & hæc sunt in secunda differentia vel ut cibi vel ut medicina, hæc non exprimit Galen. sed colligitur ab Auicena. & Actio in iis ergo dicit Galen. 10. de ing. octauo, est omnis cura hectica. Cæterum ut dicitur de ing. septimo, quoniam humida non transeant secundum gradum, quinto de simpli. sic sunt minoris actiuitatis quam frigida, ideo est maius periculum in infrigidando, quam in humectando, sed citius inducimus frigiditatem, ideo cum maiori cautela debemus applicare frigida, tertio de ing. octauo, sed quum semper sit intentio de infrigidando, & humectando, debemus curare ut quæ dantur sint frigida, & humida, quod si frigida sint & sicca debemus miscere humida, si humida & calida, debemus miscere frigida. Dicendum ergo de his sex rebus ab exterioribus, & primo ab æ-

Mathei Curtij

re sicuti facit. Galen. decimo de ing. octauo, exordiat. Aer si temperatus sit dicit Galen. debemus cum talem eligere, & si sit nimium calidus, vel frigidus eum corrigere, si ergo nimium calidus sicuti æstate esse solet, tunc eligendæ sunt domus subterraneæ, transpirabiles, aspersæ aquis, & rebus frigidis, arcendo turbam hominum, & faciendo omnia pro infrigidatione eius, sicut in superioribus dictum est, qd si sit aliquantulum frigidus, eum debemus eligere, si vero nimium frigidus conuenit quidem ratione transpirationis, quia sic refrigerat cor, maxime, si principalis causa sit cor, nocet tamen ratione cutis, cui si occurrat eam constipat, & vaporum exhalationem prohibet, maius tamen est iuuamentum nocumento, quod si volumus etiam illud euitare nocumentum, poterimus aliquantulum alterare illam intensam frigiditatem, quæ tamen solet esse in hyeme, accendendo ignem leuem in camera, vel quoniam ille aer multum conuenit, si volumus eum eligere, debemus cooperire corpus, excepta facie cum pannis calidis, & prohibere, ne ille aer ita frigidus occurrat corpori, hæc omnia habet Galen. decimo de ing. octauo, post aerem sunt applicanda per exterius, ut iniunctiones, cataplasmata, emplastra, aquæ, ista dicit Galen. decimo de ing. nono, possunt refrigerare, & humectare sine astrictione, sed difficile est talia reperire, optimum ergo quod applicari possit, est vnguentum, quod dicitur in frigidans, Gal. modo ordinatum, sicut decimo de ing. nono ordinat Gal. Multa alia sunt, ut sumendo succum herbarum frigidarum sicuti polygoni, lactuæ, intybi, & rosarum, cum polenta, vel per se, item oleum rosatum ex oliuis immaturis, hæc omnia applicari possunt, & ea miscendo, & separatim, & quoniam ut dicitur de ing. octauo, sæpe hæctica habet originem

nem ab aliquo membro particulari, vt à pulmone, & stomacho, ideo hæc remedia non omni corporis parti sunt applicanda, sed parti illi, à qua procedit hectica decimo de ing. nono, debent autē talia remedia actu frigida esse, non miscendo res calidas, sicut patet ibi à Galen. & quando sunt calfacta à calore febrili, oportet ea remouere, & iterum illa, vel alia eiusdem virtutis applicare, & indifferenter possunt applicari membro siue principali, siue non, septimo, de ing. vltimo. Aduertendum tamen est ne membrum propinquum lædatur sicut Galen. accidit, septimo de ing. octauo & refert ipse decimo de ing. nono. Tertio sunt balnea, quibus, & si non sunt in vsu in sanitate, si oportet, vti debemus. Nam etiam tempore Hyp. non erant in vsu, tertio regim. acut. 42. & tamen eis ipse utebatur, tertio regim. acut. 59. & quoniam, quod maxime conuenit in hectica est balneū, decimo, de ing. decimo, ideo balneis etiam tempore nostro in hecticis, licet nō sint in vsu, vti debemus, & licet etiam aliquando balneare ægrum etiam aqua frigida, nisi periculum sit nimix in frigidationis, tamen dicit Galen. ex thucididis sententia, decimo de ing. decimo, quando vnica est spes salutis, melius est ea vti cum periculo, quam relinquere ægrum sine remedio mori. Sunt autem balnei secundum quod antiqui eis utebantur, sedes quatuor, decimo de ing. vltimo, prima est aeris calidi, quæ virtutē habet calefaciendi, liquandi, & æquandi materiam, relaxandi cutem, & multa retenta euacuandi, secunda, sedes est, aquæ calidæ. hæc humectat & calefacit, tertia est aquæ frigidæ ista refrigerat, cutim densat, & virtutem roborat, quarta est in qua fit sudoris abstersio, & ista corpus per sudores euacuat, sedes omnes balnei conueniunt hecticis, secundum omnes virtutes

cxce

Mathei Curtij

excepta calefaciente, quæ repugnat omnibus febribus: iuuamenta autem, quæ ex balneis sequuntur, sunt quod quicquid fuliginosum, & fumidum est, educitur caro, ossa, & cutis, in naturali dispositione ponuntur, ariditas solidorum membrorum corrigitur, calor præternaturalis remouetur, quòd si hæc à balneis sequuntur iuuamenta, (quis est qui balnea hec tics non concedat?) conuenit tamen maxime lauacrum aquæ frigidæ, & sine ipso ferè nihil facerent cæteræ virtutes, nec secus sanari potest hec ticus ratione balnei, vt ibi ostendit Galen. verum quoniam in hec tics est parum sanguinis & est carne nudus, pinguedinis expers. Ideo si foret iuuenis causone laborans, posset subito in balneo aquæ frigidæ lauari, debet tamen ipse prius poni in aqua calida post in frigida. Sic enim corpus post aquam calidam, magis resistit frigiditati, nec membra solida, & eorum virtutes adeo læduntur: sunt ergo omnes hec tici, si non sit putrida, vel phlegmone in partibus interioribus, balneandi, ponit Galen. 11. de ing. vltimo modum, quæ seruare debemus in balneis, circa omnes sedes, quoniam vt dicit ipse, septimo de ing. sexto, omnes ferè diuites suis temporibus habebant balnea domi, sed quoniam nostro æuo nec domi, nec alibi habetur omnes sedes balnei, ideo crederem, quòd non penitus omittendum tam salubre & tam necessarium medicamentum, sic possumus procedere, vè tre vacuo, in camera ægri reddito aere temperato, vel magis ad calidum declinante, vt sit similis prime sedi, debent portari duæ tineæ plenæ aqua, vna calida altera frigida, & quoniam in aqua Galen. nihil concoquit, ideo eam puram reciperem, post facerem vt quatuor homines in vno linteo versus calidum vrgente ægrum sumerent & ipsum à lecto leuiter pertractando leuantes

tes facerent, vt in aquam calidam immergerent, maxime si vterque sit fortis, curarem post vt æger ibi staret aliquantulum, Galen. tamen in ea sede stare permittebat donec caro intumesceret, septimo de ing. sexto, quia erat tātum intemperies sicca, nec erat periculum propter caliditatem aquæ sicut est in hectica. Quum æger post aliquantulum temporis in ea tina stetisset, facerem, vt eum in aqua frigida immergerent, & tantum ibi stare permetterent quantum virtus sufferret, quod cognoscitur ex tolerantia ægri. Curarem postmodum, vt illi quatuor homines ægrum in lectū, qui debet esse proximus, & calidus portarent, & post primo cum spongia, deinde cum panno lineo leuiter, & blande pertractando ipsum abstergerent, factaque de terfione cum oleo cōmuni, vel alio appropriato eum inungerent, debet autem oleum esse tepidum, quia aperit, frigidum constipat, & hoc in isto casu esset perniciosissimū, tertio regim. acut. 44. & secundo de simpl. cap. 6, quod si timemus de virtute, & corpus esset multum exiccatum, prima aqua debet sumi tepida, alia aliquantulum frigida, sed non pure frigida, decimo de ing. 10. sic quoque æger potest stare in vtraque aqua secundum dispositionem virtutis. Possumus autem vel bis, vel ter reiterare in die, si æger sit assuetus, septimo de ing. sexto, forsan æuo nostro est satis semel balneare, in mane ante prandium, propter inassuetudinem, q̄ si marasmus esset confirmatus, tunc quoniam impossibilis est cura 1. de diff. febr. 9. 10. de ing. 10. morituri autem sunt solis prognosticis relinquendi, primo Apho. 8. aliter detur pampus medicamēta, quæ alteri possunt esse salubria 10. de ing. nono. Ideo in tali casu nec balneis vti debemus, quod si esset secura mors, tamen astantes vellent vt aliquanto plus viueret, tunc facta
pro-

Mathei Curtij

testatione impossibilis sanitatis, potest lauari, quoniā ex marasmo potest induci hectica senectutis, quā morbum senium Philippus appellabat, quæ licet etiam in curabilis sit, tamen plus cum ea potest durare eger Galen. decimo de ing. ultimo dicit, se conseruasse viuum laborantem tali ægritudine, non tantum per dies, sed per menses, hæc de balneis, & sic de rebus exterioribus. Restat vt ad res interius sumendas deueniamus. Res omnes, quæ interius sumi debent, oportet vt frigida sint, & humida & vt sint medicina, vel cibi, & potus, vel aer, Gal. septimo, de ing. sexto, & decimo, de ing. decimo non ponit medicinam quæ valeat tantum vt medicina. Sed quæ valent vt medicina, & cibi. Auic. tamen aliqua ponit quæ tantum inter medicinas adnumerari debent, sequendo tamen Galen. quia ibi possumus cū cibis medicinalibus procedere tutius est quā cum puris medicinis procedere, naturæ enim sunt magis conformes. Duo sunt præcipua remedia in cōmuni vsu quibus ad infrigidandum, vtimur, & humectandum intus suscipiendo quæ valent vt medicina, & vt cibi, & sic sunt cibi medicinales. Primo est aqua cancrorum, vel limaciarum, secundo est lac, licet Gal. nihil dicat de cancris in ista cura, quia tamen Diosc. lib. cap. 12. dicit quod cancri decoctio valet exhibitā tabidis, & idem refert Auic. in ista cura, & sunt in cōmuni vsu. Ideo primo loquemur de cancris, post de lactæ. Cancris quia sunt frigidi, humidi, ideo hecticis conueniunt, maxime si sunt phtyfici, quia videntur habere proprietatem cum pulmone, eorum caro non videtur conuenire, quia cibi pro hæcticis debent esse facilis digestionis, & non grossi nutrimenti septimo, de ing. sexto. Cancris autem Limaciæ, & similia sunt duræ carnis, & difficilis digestionis, sicuti in capitibus pro-

propriis patet, tertio de alim. quòd si esset virtus for-
 tis forsan possumus dare contusum de eis, est tamē me-
 lius facere decoctionem sic, accipere oportet caudam,
 & pedes, & euellere à toto corpore, & etiam, quoniā
 in cortice est ius exiccatiua, debemus eos excortica-
 re, post cum aqua, sale, & cinere ipsos bene lauare, de-
 inde cum aqua pura, demum eos in sufficienti quanti-
 tate aquæ ordeï decoquere, & eam decoctionem cola-
 tam exhibere post balneum cum ptisana, si non detur
 lac, ita dictum est de limaciis. Possumus quoque da-
 re destillatum factum ex eis, sicut communiter fieri so-
 let, & erit facilioris digestionis, quā caro, & in ea erit
 maior virtus quam in decoctione, aduertenda tamen
 est virtus exiccatiua, quæ acquiritur ex lambico. Post
 hæc est lac, quod esse humidum nulli est dubium, quod
 sit frigidum patet, quarto de simpl. med. 16. & quin-
 to, Aph. sexto, quòd si Galen quinto de simpl. med. di-
 cit q̄ habet tepidam caliditatem, per tepidum intelli-
 git mediocriter frigidum, sicut patet, tertio de tuend.
 sani. Quod si etiam, tertio, compl. vltimo, dicit quòd
 est calidum, intelligit, quando est conuersum in san-
 guinem. Quum igitur lac frigidum sit, & humidum
 facilis digestionis, & boni nutrimenti, ideo maxime
 laudatur in hefticis, septimo, de ing. sexto. Cibi enim
 qui in ea sicca cerebri intemperie conueniunt, lac hu-
 manum est propter similitudinem. Quod si non velit
 æger sumere lac humanū debet sumere, quòd sit alio-
 rum animalium diuersum secundum diuersam heftici
 dispositionem, quando viæ sunt magis apertæ conue-
 nit grossius, quando sunt magis strictæ, subtilius in
 principio viæ sunt ampliores, post vero strictiores, lac
 caprinum est simile multum cum humano, & est sub-
 stantiæ aliquantulum grosse, ideo dari potest in principio.

Lac

Mathei Curtij

Lac asininum est subtilioris substantiæ ideo dari potest, procedente ægritudine. Gale. septimo de ing. sexto, & decimo de ing. 10. maxime loquitur de asinino. Debemus ergo accipere asinam iuuenem, & ab ipsa summouere pullum, eam nutriendo cum herbis frigidis, & humidis, curando vt bene digerat post debemus curare, vt æger post balneum, vel saltem ieiunio stomacho ab eius vberius emulgeat lac, quod si ipse recusat, hoc facere debemus, ducere asinam in cameram ægri, & facere vt subito quando extractum est lac, ipsum bibat, primo autem debet bibere vnum cyathum cum dimidio, & sic procedendo semper, debet augere dosim, sed ad quam quantitatem ascendere debet, determinari non potest vt Gale. dicit decimo, de ing. vltimo sed id coniectura assequemur, donec scilicet non fluctuet in stomacho, & virtus non grauetur, septimo de ing. sexto, videre autem oportet an in stomacho corrumpatur, & hoc cognoscitur ex pulsu, si sit maior aut valentior, signum est quod non corrumpitur, quod si timeamus de caseatione addemus ei parum mellis, vel salis, licet ista non conueniant, ratione febris in hæcticis de se, quod si ventris fluxus sit, laudatur lac acetosum, de hoc tamen, in hac cura nihil dicit Galen. post lactis assumptionem, debet æger quiescere, & vigilare, debemus autem sic procedere cum lacte, dicit Gal. primo de ing. sexto, donec æger melius se habeat, post quando tendit sanitatem versus debet regi æger, vita conualescentis, & tunc poterimus omittere lac, hæc de lacte, quod conuenit vt cibus & vt medicina, de aliis cibis, loquendo de sex rebus non naturalibus, dicemus. Sexto, erat aer qui inspiratur, qui debet esse frigidus, & humidus, sed de ipso iam dictum est hæc igitur de illis sex rebus, quibus præcipue
vti

vti debemus in hecticis sufficiant. Quantum ad sex res non naturales, de aere dictum est, cibi omnes quibus in hecticis vti debemus debent esse frigidi, & humidi, boni nutrimenti, non grossi, non viscosi, nec dure digestionis, & in eorum exhibitione debemus simul comparare earum naturam, & virtutis dispositionem, cōuenientes ergo cibi vitra lac, sicut ex Gal. patet tertio de ing. 6. sunt succus ptisanę frigidus, halica, cū cre more ptisanę 10. de ing. 10. panis ī furno bene coctus, bene fermētatus, cū pauco salis in aqua infusi, pisces saxatiles, ius albū, testes gallinacei, perdices, passerres montani, & similia, de vino Gale. 10. de ing. decimo, nihil dicit, in septimo de ing. sexto, dicit quod conuenit in illa dispositione sicca stomachi, modo non sit febris, & aqua maxime vituperatur, quia multas parit noxas, & Galen. ibi, & Hyp. tertio, regim. acut. primo referunt per opposita, & maxime laudat vinum, quod plura producat iuuamenta. Crederem ergo quod maxime, quando indigemus restauratione, vinum album aquosum aqua permixtum conueniret, in dandis autē cibis plus oportet dare infero, quam in mane, parum pro vice, sed sæpius est tamen necessarium expectare quod cibus prius datus sit digestus, post coenam non bibat, nisi facta digestionem qua peracta, si sitim tolerare non possit, aliquantulum bibat, vtendum est autem cibis consuetis, & naturæ indiuidui conuenientibus, hæc omnia ibi refert Galen. Quantum ad somnum, & vigiliam debent mediocres esse, non est dormiendum statim post assumptionem lactis, nec post prandium, quantum ad motum, & quietem, quies magis cōuenit quàm motus: leui tamen exercitio vti potest, si est possibile vacuo stomacho, & vtatur debitis frictio nibus: quæ tamen sint leues & molles, quantum ad inani-
nitio-

Mathei Curtij

nitionem, & repletionem curari debet, ne nimis cibis repleatur, & quòd excrementa non retineat, omnia tamen blande facere oportet. Quantum ad accidentia animi, euitent omnia accidentia sæua, maxime quæ calefaciunt, & exiccant sicut est tristitia, ira, dolor, sed stent læti mediocriter, & cum delectatione viuât, hæc quoad sex res non naturales. Restat modo, vt accidentia corrigamus. Accidentia quæ maxime sequuntur in hecticis sunt syncope, & fluxus ventris, quo ad syncopim vtendum est eis quæ dicta sunt in cura syncopalis minutæ, quo ad fluxum, si fuerit fluxus, melius est vti lacte acetoso, & in aqua hordei dicit Auicen. ponatur milium torrefactum, & sic procedere debemus cū illis, quæ ventrem sistunt. Aduertendum tantum est, ne sit multum sicca, & sic miscere possumus diuersa remedia secūdum diuersitatem intentionem, & hæc pro cura hæcticæ febris.

De cura Hæcticæ Senectutis.

Hæctica Senectutis, vt colligere possumus decimo de ing. decimo, est siccitas inducta in membris solidis sine febre de se, & senibus præcipue aduenit, septimo de ing. sexto, aliquando tamen, & iuuenibus, decimo de ing. decimo, & est similis dispositioni naturali, quādo aliquis moritur morte naturali, huius signa sunt, signa marasmi exceptis signis, qui ex febre procedunt, ratione caliditatis in ea enim non est febris, ideo dicit Auicen. In tali hæctica sunt pulsus tardi, parui, & rari, & quandoque habent vrinam albam, & subtilem, & in aliis dispositionibus sunt senibus similes. Ista dispositio, si confirmata sit, scilicet quòd sint exciccata membra solida, quia ipsa restaurari non possunt, aliter
esset

esse remediū morti, ideo est incurabilis, eius ergo curā aggredi non debemus, quò si si non sit adhuc confirmata, id est, sit tantum siccitas in prioribus humiditatibus, licet hæc vere hectica senectutis dici non possit, tunc eam curare est possibile, quoniam ut dicitur septimo de ing. sexto, omnes exiccationes ea excepta, quæ in membris solidis est sunt curabiles. Quum igitur talis dispositio sit sicca tantum, ideo humidis, non frigidis uti debemus in eius cura, & quum tanta siccitas non reperiatur in membris, nisi cum defectu caloris naturalis, qui humido, quod est eius pabulum, deficiente, absimitur. Humida igitur applicari debent, etiam debent esse calida, seruandus est tamen ille ordo in ista cura qui seruabatur in cura hæcticæ febrilis, excepto quòd loco frigidorum uti debemus calidis. Aer ergo debet maxime esse humidus, vrgens versus calidum, applicandæ quoque sunt exterius medicinae quæ debent esse humidæ, & mediocriter calidæ, ut esset oleum de ben, vel sesaminum dicit Gal. & debent applicari sub actuali caliditate. Balnea multum conueniunt, sed calida tantum, septimo de ing. sexto. Medicinas per interius maxime soluentes debemus euitare, quantum possumus. Possumus tamen uti maxime si non sit beneficium ventris, propter nimiam siccitatem, clysteri, cum rebus calidis & humidis, ut cum cicere contrito cum melle, chamemelo, & ficibus faciendo decoctionem in debita quantitate aquæ addendo vnc. 2. olei sesamini, vel de ben, & sic conficiendo clysterem, cibi debent esse humidi versus calidum vrgentes, vinum etiam est exhibendum. Sed quoniam habito modo procedendum in hectica febre, habetur etiam modus curandi senium, non enim differunt nisi quia in senio non est caliditas febrilis, ideo hæc pro

K ista

Mathei Curtij
ista cura sufficiant .

De cura Febris Pestilentialis .

Morborum, vt dicit Hypp. in libro de natura humana, quidam sunt sparsi, quidam communes: communiū autem vt dicit Galen. primo epid. commento primo, & primo reg. acut. nono, quidam sunt epidemii idest publici, quidam endemii idest vulgariter grassantes, & horum, qui maxime exitiosi sunt, pestilenciales dicuntur, vt dicit Galen. tertio epid. Ideo eorum Crises, vt plurimum terminantur male, secundo Aph. 13. est ergo febris pestilentialis morbus communis populariter vagans, & exitiosus: fit autem, vt plurimum ex aere plurimum calido, si ei maxime sit admixta putredo, vel malitia, aliquando etiam ex humore intus acquisita venenositate putrescente, primo de diff. feb. quarto. Proprie tamen hæc febris pestilentialis, pestis debet dici, tertio de præfagio ex puls. cap. de pulsibus in frigidis intemperaturis. Causa tamen maxime communis est aer, quam adduxit Hyp. in libro de natura humana, potest tamen fieri ex aquis putrefactis, & vaporibus eleuatis à rebus putridis, & fetentibus, primo epid. commen. primo. Sed quoniam, vt plurimum lædunt quando inspirant aerem, ideo Hyp. causam omnium communissimam expresit, vt ibi excusat Hyppocratem Galen. Possunt quoque esse in causa cibi mali semiputridi, vt legumina &c. quoniam à pluribus comesta habent rationem naturę communis, sic accidisse refert Galen. in lib. de euchymia, & caco-chymia, & in commento secundo de natura humana. Sunt autem istę febres vel putridę, vel hecticę. Secundum quod vel infesti sunt humores, vel substantia cordis,

cordis, tertio de præfag. ex puls. cap. de puls. frigida
 intemperature putridæ possunt aduenire etiam, quod
 corruptus non esset aer, & febres pestilenciales pro-
 prie dicuntur. Hæcticæ autem proprie sunt ex infe-
 ctione aeris, & maxime perniciosæ, & contagiosæ, &
 proprie pestes dicuntur. Aduenit autem præcipue cor-
 poribus plenis superfluitatē, maxime si sit obstructio,
 vel plethoria, in vita ociosa degentibus, crapulis, ven-
 trique immoderate indulgentibus, maxime si corpo-
 ra fuerint calida, & humida, primo de diff. febr. quar-
 to, febrium pestilentialium, vt dixi quædam sunt hæ-
 cticæ, quædam putridæ, & putridarum quædam à san-
 guinæ, quædam ab alio humore, qui humores aliquan-
 do in vna parte, aliquando in alia putrescunt, aliquan-
 do ad vnam partem, aliquando ad aliam, aliquando ad
 nullam expelluntur. Hinc tot diuersa apparēt in eis si-
 gna & symptomata, quot enumerat Hyp. tertio, epid.
 & Gal. i lib. de euchymia, & caco-chymia, & tertio de
 præf. & puls. incipiēdo ergo à putrida quia sæpius eue-
 nit, tales febres sunt ardentes, 3. epid. & in lib. de eu-
 chymia aliquādo magis acutē aliquādo minus, & ideo
 aliquādo calorē, & sitim habent intensiorē, aliquando
 remissiorē, pariter materia quæ putrescit, aliquando
 est magis inclusa in partibus interioribus, aliquando
 est per totum corpus dispersa, aliquando magis acuta
 ta, & calida, aliquando cruda, & excrementosa, ideo
 aliquando adsunt deliria, aliquando somnolentia, pa-
 riter aliquando nullo modo expellitur, aliquando ad
 loca debiliora truditur. Hinc aliquando moriuntur
 antequam appareat aliquid in partibus corporis, ali-
 quando sequuntur phreneris, somnolentiæ immobili-
 tates, spasmi inquietudines, horrores lippitudines, vi-
 tium vocis, pustulæ in ore, tussis, phthises, deiectiones

Mathei Curtij

appetitus, dolores stomachi, syncopis, tenasmones, lienteria, dysenteria, alui perturbationes, vlcera vesicæ, difficultates urinae, aquæ inter cutem, pustulæ diuersorum colorum, per totam cutim vlcerationes diuersimode, scabies, phagædenæ, carbunculi modo in pudendis, modo in aliis partibus, secundum quod materia, ad caput, ad nervos, ad oculos, ad os, ad pulmonem, ad stomachum, ad intestina, ad vesicam, ad hypochondria, ad cutim per vniuersum corpus, ad partem exteriorem determinatam demandatur, & sic aliquando horum vnum, aliquando plura apparent, secundum quod materia ad vnam partem vel ad plures truditur, verum hæc omnia, quoniam etiam cum aliis febribus non pestiferis, aliquando apparent, ideo possumus discernere per ea ab aliis, nisi habeant occultam malitiã, vltra peccantem humorem, secundum suam naturam quæ nascitur ex venenositate eius adiuncta, propter quam vt plurimum ægri moriuntur. Vnde dicit Hyp. tertio epid. quod tales ægri tudines, vel non iudicant, vel ægre. Crises enim in pestilentibus sunt malæ vt plurimum, secundo Aph. 13. & ideo vt plurimum pestilentes laborantes moriuntur, urinam habent, qui hac febre laborant vt plurimum turbidam, multam, malam, crudam, nihil discernentem, acrem, & graueolentem, egestiones crudas, multas, tenues, & foetentes: pulsus, vt plurimum dicit Auic. frequentes, & parui in nocte magis vehementes, quando ergo plura horum signorum apparuerint, & cum occulta malitia communiter inuadunt, febrem pestilentialem putridam est dicere: si autem sit hectica pestilentialis, dicit Gale. tertio, de prælex pul. cap. de puls. intemperiei frigida, febres habent remissioem, aliquando ab ægro non perceptibilem, urinam in colore, & sedimentum simile sanis,

nis, pulsus quoque propter aliqua frigida contra caliditatem cordis cooperantia, similes moderatis, tertio de præf. ex puls. cap. de puls. quando arteriæ frigida, & cor calidum, & tunc cognosci debent ex foetore anhelitus, si etiam admouetur manus pectori, cognoscitur febrilis caliditas, sed hæc signa non faciunt pro me dico, quoniam hæc febris est contagiosa, primo de diffe. febr. secundo, quod si urina appareat conturbata, aquosa & tenuis, certissimum est signum heclicæ pestilentialis, post balneum cibum respuunt qui hac ægritudine laborant, sitiunt præter modum & frigidam postulant, eorum oculi inter lauandum sunt calidi & flammæ. Quum ergo dicit ibi Galen. talia signa apparuerint, certe dictum est, quod adest pestis, & per ea ut ibi patet, intelligitur de heclica pestilentiali, quæ proprie est pestis: non enim fit ex putredine humorum, sed ex aere inspirato venenoso, substantiam cordis corrumpente, tertio de præf. ex puls. cap. quando cor est calidum, & arteriæ frigida, hæc sunt signa, ex diuersis locis Hypp. & Galen. collecta, quibus febres pestilenciales cognoscere possumus. Veniendum modo est ad curam, Galen. decimo de ing. vltimo promittit ponere harum febrium curam, id tamen saltem non expresse exigit, nisi dicamus quod cura in istis febribus nihil plus sit, quam venenositas ultra ea quæ de aliis febribus dixit, & ponendo curam aliarum febrium, & ostendendo quæ venenositati resistunt, earum etiam curam posuerit. Hanc igitur præcipue ex dictis Hippocratis, & Galen. colligendo ab intentione curatiua exordiar, in febre pestilentiali sunt omnia quæ sunt in aliis febribus, sed ultra est etiam venenositas, ideo intentio sumitur à febre, & à venenositate: à febre autem putrida, de ea enim præcipue loquar in curando. Nam

Mathei Curtij

de hectica parum est dicendum, quoniam incurabilis est. Nam ut inquit Gal. tertio de præs. ex puls. cap. quando arteriæ sunt frigidae, & cor calidum, quando substantia cordis est à putredine occupata, quis medicinam, ad eam putredinem tolerandam excogitabit? quod non est dicendum de putrida, ut ipse asserit. Quum igitur putrida sanationem admittat, ideo ad eius curam sic me accingam. In hac febre ut dixi sumitur indicatio ab ipsa, & à venenositate, in febre putrida duo sunt, à quibus sumitur indicatio, putredo scilicet, & febris, sicut supra de mente Galen. decimo de ing. 10. dictum est, est quoque virtus, à qua maxime sumitur indicatio in ista febre. Quatuor ergo sunt, quæ principaliter indicant, febris scilicet, putredo, virtus, & venenositas, febris indicat de frigidis, & humidis, putredo præbet duplicem indicationem, ut scilicet quod putrefactum est, remoueatur, & quod est futurum, fieri prohibeatur, & hæc ut plurimum fiunt cum aperientibus, & incidentibus, quæ calida sunt, maxime indicant de frigidis, venenositas indicat de prohibentibus eam, & talia sunt styptica, acetosa, & ut plurimum frigida & sicca, ideo de frigidis & ficcis indicat: virtus autem de sui conseruatione indicat, ideo ratione virtutum, debemus dare cibos & cætera virtutem conseruantia, quæ sint similia ætati, regioni, & complexioni. Quum igitur ista ferè omnia contraria sint & de se ægritudo sit pernitiola, ideo raro curari potest. Videndum tamen est quod magis vrget, & ei est attendendum altero non neglecto, sicut ex regulis Galen supra in aliis dictum est, ut tamen per ordinem procedamus primo de illis dicam quæ conueniunt, indicatione sumpta à putredine, aliis non neglectis. Materia illa quæ iam putrida est de sui deductione indicat, sed prius de incisione, attenua-

tenuatione, & apertione. Primo igitur quoniam ut plurimum sunt multæ materiæ corruptæ in intestinis, optimum est præmittere clysterem, postmodum ratione sumpta à materia simpliciter, quæ febrem putridam facit esset intentio de phlobotomia. Verum quoniam in libro de euchymia dicit Galen. quòd merito Medici sui temporis in ea peste phlobotomiam propter viriû resolutionē abhorrēbant, ideo videtur, quòd in febre pestilentiali propter defectum virtutis phlobotomia non conueniat. Crederem tamen quod in totum non esset abhorrenda, si maxime sanguis peccaret, virtus constaret, & ætas maxime pateretur, licet nō multum copiosa, tamen conueniret, quòd si principaliter non peccat sanguis, tunc virtus non constat, eo casu abstinere debemus, nec est mirum si in ea peste, quam ponit Galen. in lib. de euchymia non erat fienda, quoniā consonum est, quòd propter illos malos cibos, quibus homines propter penuriam utebantur, illi laborantes, nō sanguine, sed malis humoribus essent repleti, quod egrediens sanguis ostendebat. Ideo virtus, ut plurimū non constabat, facta igitur phlobotomia, si est fienda, seruatis omnibus conditionibus, quæ in cura tertiæ puræ, & causonidis dicta sunt, vel etiam si fieri nō possit, ad medicamenta soluentia non est subito deueniendum: materia enim indigesta etiam q̃ esset venenosa, modo non sit furiosa, non est educenda, quum de ea nihil dixerint Hyppocrates, & Gale. Primo enim quum pharmaca omnia soluentia, quæ fortia sunt, venenositate participant, morbi malitiam augent, & quum digestio non sit facta, nec humores dissecti, nec viæ apertæ, consonum est quòd nihil educetur, vel cū maximo labore, & virtutis prostratione, & tam de bono, quàm de malo educetur. Huc accedit, q̃ quū causa

Mathei Curtij

principalis, vt plurimum fit aer, quo lædimur, ideo causam non auferimus, experimento quoque patet, quoniam dicit Hypp. tertio epid. quòd multos offende-
bat & subito moriebantur, quod si dubitemus, ne eger moriatur, melius est ipsum sinere mori, ex vi, & ma-
litia morbi quam Medicum, & medicinam deturpare,
medicamento soluriuo mortem accelerante. Poteri-
mus tamen vti medicamento ex aloe, mirrha, & cro-
co, vel loco croci ponere ammoniacum, sicuti ponit
Paulus. Hoc enim medicamentum non est veneno-
sum nec multum agitat. Regiones nanque hepatis nō
transcendit, & cum hoc exiccat, & venenositati resi-
stir, aliquas materias peccantes educit, his peractis, si
est possibile, intentio sumpta à putredine iam facta, in-
dicat de eius educatione, sed prius de incisione, & aper-
tione: poterimus ergo tunc videre quid magis vrget,
an putredo, an venenositas, si putredo, debemus vti
aperitiuis, si venenositas, stypticis, & acetosis. Verum
quoniam condensant, & constringunt, & sic prohibēt
intentionem sumptam à putredine, ideo videndum, an
materia magis peccat quantitate, vel venenositate, &
semper vrgentiori magis est attendendum, altero nō
neglecto, sed de istis diffusius (loquendo de rebus nō
naturalibus) infra dicemus. A virtute quia vt pluri-
mum in istis febribus obruitur virtus maxima ab ea su-
mitur indicatio, & indicat de similibus ætati, comple-
xioni, & regioni, prohibendo quæ eam destruunt, &
dando quæ roborant. Sed quoniam quæ conueniunt
magis apparent percurrendo per sex res non natura-
les, ad eas est deueniendum. Aer est maxime conside-
rāndus in febribus, nono de ing. 14. sed maxime in istis,
quia est earum potissima causa, vt ex Hyp. de humana
natura, & Galen. primo epid. commento primo clare
liquet,

liquet, si ergo pestis sit ex infectione aeris, videndum est an sit infectio ab influxu cœlesti, sicut volunt Medici, vel ab alia causa inferiori, ut ex putredine cadauerum, vel ex vaporibus eleuatis ex aliqua alia re putrida, si sit à causa superiori indifferèter ferè omnes morbo corripuntur, sicut in lib. de natura humana refert Hypp. vnde credo q̃ multum sit difficile ei resistere, si vero sit à causa inferiori, tum est facilius, primo remouendo causam infectionis, si est possibile, deinde corrigendo infectum. Corrigendo autem, vel intendimus præseruare, vel iam laborantē curare, si volumus præseruare in tali correctione, ut dicit Galen. in de Ther. ad pil. debemus seruare quod dicit. Hyp. mutare scilicet aerem, quia præsentem euitare non possumus, quòd si id fieri non possit, debemus præsentem corrigere, incendēdo magnos ignes cum lignis & vnguentis odoratis, accipiēdo quæ calida sunt, & sicca, ut ignem faciēdo ex iunipero, cupresso, & lauro, ponendo post in ignem thus, ambram, moschum, costum, & similia quæ enumerat hic Auicē. Si vero sit actu æger, debemus alterare cum frigidis, & odoriferis, ut cum camphora, sandalis, rosis, corticib. granatorū, Mirtho, Cydoniis, & similibus, semper curādo ut aer inalteratus non occurrat, siue in præseruatione, siue in cura, quod si sit febris tantum ex infectione humorum, alterato aere, vel præseruando, vel curando, debemus curare ut pori stent aperti, ut calor naturalis euentetur, & à putredinali non corripatur, primo de diff. febr. quarto, de cibo & potu Hyp. tertio, epid. dicit, quòd omnes ferè, in quos eo tempore incidit, fastidiebant cibū, vnde Gal. in commento refert quòd suo tempore hoc etiam euenit, & subiungit quòd fortissimi viri, qui sibi vim intulerunt, & cibum sumpserunt, omnes ferè superstites

Mathei Curtij

perstites fuerunt : reliqui mortui sunt. Curandum est igitur omni ingenio in hac febre in qua virtus proster nitur, vt cibum ægri sumant, non tamen in maxima quantitate, sed quantum conseruari potest virtus, & quoniam principalis ferè intentio est resistere veneno sitati. Ideo debemus semper admiscere aliqua aceto sa, ut acetum, succum citri, agrestam &c. in potu vi num non conuenit ratione febris, si tamen maxime ne cessitas roborandæ virtutis vrgeat, forsan virtuti at tendendo non esset malum, dare parum vini paucife ri, & siti urgente, poterimus facere aquam coctam cū rebus confortantibus, & venenositati resistentibus. In cæteris procedendum, vt dixi in cura causoridis. Vi gilix, & somnus moderate conueniunt & quoniam sæ pe cum istis febribus iunguntur continuæ vigilix, de bemos applicare somnifera, vt tempore debito dor miant, non tamen debemus declinare multum ad ali quod horum, vigilix enim virtutem debilitant, som nus humiditatem (quæ nocet in isto casu,) generat. Mo tus si aer sit infectus, animo est fugiendus, quia in eo fit maior inspiratio, quòd si aer non sit infectus, debemus curare vt in declinatione, tempore debito, si sit possi bile, moueatur, vt calor naturalis exciterur. Quan tum ad inanitionem est procedendū, sicuti in aliis pu tridis, curare scilicet vt omnes superfluitates excernā tur. Accidentia animi omnia immoderata fugienda sunt, quia virtutes prosterunt si tamen aliqua sint cū lætitia, sint & moderata: hæc de sex rebus non natu ralibus, quæ omnia hic in Medico explicuimus, vt quæ sunt illa, quæ indicatione sumpta à virtute cōueniunt, enarremus. Restat modo pro complemento curæ, vt ad ea quæ sunt exigenda ratione febris, & venenositi tatis deueniamus, febris ista aliquando non est multū
in

intensa, tertio epid. aliquando sic, in lib. de euchymia si sit non multum intensa parum indicat, si multū, tunc poterimus applicare epithemata frigida cordi, aduertendum tamen si natura tunc expellit, ad partes cutaneas, eo casu talia frigida non essent applicanda, non laudant Paulus, & Auic. potum aquæ frigida, & alia frigida, quæ in sermone sex rerum non naturalium, diximus. Veniendum est modo ad venenositatem. Venenositas quum sit præternaturalis indicat, vt quod est venenosum educatur, & quod est futurum, fieri prohibeatur, quod est factum educitur cum educentibus humores putridos, quod est futurum, cum resistentibus venenositati. Gal. nono de simp. cap. de terra sigil. in fine dicit, quod in ea peste, quæ suis euenit temporibus similis ei de qua Thucid. loquutus est, permulti sanati sunt ex assumptione boli armeni. Debemus dicit Galen. si non adsit febris, vel pauca dare cum vino albo tenui modice diluto, quod si adsit febris intensa, cum magis aquoso, poterimus sic secure dare vnc. 4. aquæ rosatæ vnc. 2. vini albi, vnc. 1. boli armeni, medicamentum illud ex myrrha, aloe, croco vel armo-niaco valet, & quia humores putridos educit, & quia exiccando, venenositati resistit. Gal. in lib. de Theriaca ad Pis. dicit theriacam calorem naturalem robora-re, & venenositati resistere, vnde in casu isto, si eam bonam haberemus maxime cōueniret, & Mithridatum. Laudatur betonica, cichorea, termentilla, & sic intentione sumpta à venenositate, possumus vti rebus sic-cis, stipticis, & acetosis, & sic ratione diuersarum intentionum diuersas poterimus admiscere medicinas, vt in processu ægritudinis, quoniam est intentio inci-dendi aperiendi, ratione putredinis, resistendi venenositati, ratione venenositatis. Poterimus vti syrū-
pis

Mathei Curtij

pis accipiendo syropos, & aquas incidentes, & aperientes & venenositati resistentes, vt addendo syropos iā dictos in aliis febribus qui incidunt, & aperiunt sed moderate, vt syrupum de succo acetosæ, de succo buglossæ, vel de acetositate citri, pro aquis, sumendo aquam buglossæ, boraginis, cichoreæ, si volumus vti decoctionibus cum herbis, & radicibus incidentibus, & apperientibus ponemus bolum armenum, terram sigillatam, cortices citri, & eorum semina, acetum, boraginem buglossam, cichoream, & similia, sic procedendo si natura vincit morbum, & tentat, aliquam expulsionem tempore debito, quam tamen non possit in totum perficere in declinatione si virtus constabit, poterimus dare aliquod pharmacum fortius educens materiam peccantem, post cum confortantibus, cum resistentibus venenositati erit procedendum vsque ad perfectam securitatem, & sanitatem acquisitam, post cum debitis exercitiis nisi infectus sit aer tenendo poros apertos, & euacuando vt calor naturalis euentetur, prohibebimus ne alia putredo, & venenositas generetur. Restat modo vt de accidentium correctione dicamus. Istam febrem, vt dixi sequuntur phrenitis, dysentericæ, carbunculi &c. quæ dicta sunt, loquendo de signis. Sed horum cura est in propriis curis explicanda, tantum est aduertendum quòd quando sequuntur febrem pestilentialem, sunt cum maiori malitia, & vt plurimum deducunt ad mortem, & quod dicitur de istis, etiam est dictum de variolis, & morbillis, quæ sunt expulsionès febris sanguineæ. Ideo sicuti aliorum symptomatum, non ponitur particularis cura, ideo Galen. loquendo de febribus de earum cura loquens non meminit. Quare, & nos, qui omnia hæc ferè à Galen. extrahimus febris tantum curam explicantes

cantes, variolarum, & morbillorum curam pertransibimus.

De Cura Febrium Compositarum.

Febrium quædam simplices, quædam compositæ sunt, secundo de Crisi. nono, simplices sunt, quando vnius tantum signa apparent. Compositæ vero quando plurima signa apparent, vel æqualiter vel alterius eorum signis præterualentibus, secundo de Crisi. 12. Duobus autem modis componuntur febres, vel complicate, vel confuse secundo de Crisi. septimo, complicate, quando diuersa hora inuadunt, confuse, quando eadem hora secundo de diff. febr. septimo. Cõponuntur autem vel quæ sine inflammatione sunt, cum illis, quæ ab alicuius membri inflammatione procedunt, & inter eas, quæ ab inflãmatione sunt simul cum his quæ sunt à diuersitate loci apostematis, & de earum cõpositione habetur secundo de Crisi. decimo sed de febribus apostematum non est præsens sermo. Quæ autem sunt sine inflammatione, complicantur simul quæ sunt eiusdem generis, vel diuersæ, vel eiusdem speciei secundo de Crisi. septimo, & aliquando plures simul complicantur tres tertianæ, secundo de Crisi. nono, tres quartanæ secundo, de Crisi. septimo, & sunt eiusdem speciei. Complicatur simul tertiana cum quotidiana, secundo de Crisi. septimo, & sunt eiusdem generis, diuersæ vero speciei, & quando horum quædam sunt interpositæ, quædam continuæ, secundo de diff. febr. ultimo complicantur continuæ cum interpositis, vt tertiana continua cum tertiana interpollata, quæ sunt eiusdẽ speciei, & tertiana interpollata, cum quotidiana cõtinua, quæ sunt diuersæ speciei, secundo de Crisi. nono.

Mathei Curtij

nono. Item interpollatum simul diuersarum specierum, vel eiusdem speciei, vt tertiana interpollata, cum quotidiana interpollata, secūdo de diff. febr. septimo, vel tertiana interpollata, cum quotidiana continua, secundo de Crisi. nono, vel duæ continuæ simul, vt tertiana continua, cum quotidiana, secundo de diff. febr. 8. & secundo de Crisi. nono. Et quando dicitur, quòd continuæ simul copulantur, intelligendum est non de vniformibus, quarum putredo est in toto, vel in vasis magnis, ideo dicitur, quòd duæ complicari non possunt, copulantur quoque diuersi generis, vt putrida cum hectica primo de differē. febr. decimo, & istæ sunt diuersi generis proximi, febres istas compositas difficilius est cognoscere, q̃ simplices, maxime in prima die, secundo de Crisi. nono, oportet ergo primo cognoscere naturam simplicium, secundo de Crisi. septimo, & post exercitatus Medicus aliquando in prima die, sed si non in prima, saltem in secunda, vel tertia vel ad plus in quarta cognoscet naturam compositarum, secundo de Crisi. nono, ipsas autem, vel oportet iudicare ex modo periodicandi, secundo de diff. febr. septimo, siue ex modo inuadendi, secundo de Crisi. nono. Quoniam igitur erunt duæ diuersæ febres, vel plures distinctæ simul, si in diuersis horis inuadunt cōfuse in ea hora apparebunt signa principii earum febrium, & sic de alijs temporibus. Qui ergo habet exacte signa febrium simplicium, si ei occurrant aliquæ cōpositæ, non cum difficultate eas cognoscet, secundo de Crisi. nono, Sicuti autem signa febrium compositarum simul complicantur, ita etiam intentiones curatiuæ, & sicuti si vna præualuerit, eius signa magis apparent, alterius signis non omnino occultis: si autē æqualiter mistentur, æqualiter ambarum signa apparent, aliquan-

aliquando autem fortiores, & intensiores secundo de diff. febr. octauo, ita in cura, si vna præualet, magis ei attendere debemus, altera non neglecta. Si vero æquales sint, æqualiter vtriusque cura habenda est. Poterimus ergo cognita natura febrium compositarum ex signis simplicium, quæ omnia adducta fuerunt in propriis curis, curare eas per intentiones dictas in curis simplicium, & vti remediis complicatis, primo Aph. 16. Ad ea ergo quæ dicta sunt de curis simplicium, est recurrendum, verum vt compositarum cura magis pateat, adducemus curam hemitritæi, sicuti omnes faciunt doctores, quia magis est cum periculo, & sæpius euenit.

De cura Hemitritæi.

Febres Tertianæ, cum quotidiana quatuor modis complicantur secundo de diff. febr. septimo, secundo de Crisi. 9. Nam vel ambæ sunt continuæ, vel ambæ interpollatæ, vel tertiana continua cum quotidiana interpollata, vel tertiana interpollata cum quotidiana continua. Quando autem simul iungitur tertiana interpollata cum quotidiana continua, tunc secundum Galen. fit hemitritæus, nō quia fit media tertiana, sed quia pro medietate est tertiana, sicut dicitur semideus qui pro medietate est deus, secundo de diff. febr. septimo, vel dicitur hemitritheus, primo epid. commento tertio, quia non omnia habet accidentia tertianæ, non enim ad perfectam terminatur infebricitationem, non incipit cum rigore, non terminatur cum excretionem, nec diem secundum habet integrum, fit autem duobus modis, vel incipientibus febribus simplicibus in diuersis horis vna anticipante alteram, non sic quòd vtraq;

Mathei Curtij

in vno paroxysmo, simul inuadunt, sicuti est in exemplo illius iuuenis, de quo Galen. secundo de diff. febr. septimo, vel fit ambobus febribus semper simul inuadentibus, & in accessione semper apparent signa vtriusque febris. Iccirco quoniam propè hemitritæus fit quando simul inuadat ambæ febres, & in primo tantū fit vna accessio, in qua simul inuadunt, in secundo, plures, ideo secūdo modo proprie dicitur hemitritæus, secundo de diff. febr. septimo, possunt autem istæ febres sic simul complicari, quòd cholera superabūdet, & tunc magis apparent signa cholerae, vel pituita, & tunc magis pituita, vel æqualiter miscentur, & tunc æqualiter ambarum signa conspiciamus, & semper dicitur hemitritæus, proprie, tamen est hemitritæus, quando æqualis est mixtio, secundo, de diff. febr. octauo, est ergo hemitritæus proprie febris composita ex tertiana interposita, & quotidiana continua, quando eodem tēpore inuadit tertiana signis, quo, & quotidiana, non magis apparentibus vñus, eo paroxysmo, quam alterius, & est illa febris de qua Hypp. primo epid. sectione prima, & secunda loquitur, quando dicit, inuadebant febres continuæ quæ magis vno die affligebant: aduenit autem dicit Auicenna corpori, quod vsum fuerit diætā generante pituitam, vel contra, eius signa sunt dicit Galen. secundo de diff. feb. octauo, quæ ponit primo epid. sectione prima, & secunda, & sunt quòd est febris horrida, idest quæ non habet horrores, tantum in principio, sed durantes per maiorem partem accessionis, dicit Galen. primo de diff. febr. octauo, & per maiorem partem augmenti, dicit Gal. primo epid. sectione secunda, estq; non intermittens, vna die grauior, alia leuior, in dies acutior inuadens, dicit Hypp. primo, epid. sectione prima, tales febres sunt violent-

violentissimæ, longissimæ, & laboriosissimæ, leues à principio, & incrementales, & quanto diebus decretoriis accedentes, tanto deteriores, aliquando remittunt, & post peiores redduntur, dicit Hypp. primo epid. sectione secunda. Rigores habent inordinatos, secundum quod cholera inualefcit, etiam videtur tendere ad summum, post vincente pituita extrema refrigerantur, horrores veniunt summissiores, & cutis refrigeratur, sic ut videatur noua accessio. Iterum vincente cholera calor augetur, & caloris accidentia: vincēte autem pituita, eius signa quoque vincunt, & sic ista inæqualitas vsque ad statum durat, status aduenit citius quam in pura quotidiana, tardius quā in pura tertiana, secundo de diff. febr. octauo, & sic tandem simul commixta apparent signa pituitæ, & cholæræ, est præterea lethalis ista febris, adueniēs his qui longis morbis laborant, dicit Hyppo. primo epid. sectione tertia. Veniendum est modo ad curam, Gal. primo. Aph. 16. dicebat, simplices ægritudines, simplicibus ægere curationibus quod si compositæ sunt, tantum curatiuæ sunt miscendæ indicationes, quantum commixtæ sunt quod si æqualiter mixtæ sunt ægritudines, ægritudines, æqualibus vtendum est remediis, & vtrunque ægritudinem respicientibus, quod si vna superat, ei est attendendum, altera non neglecta, febris igitur ista est composita ex duabus, ex phlegmatica scilicet, & cholerica. In cura igitur debemus miscere intentiones, quod si æquales sint, æqualiter vtendum est dictis in cura quotidianæ, & tertianæ, si pituita magis, his quæ dicta sunt in cura quotidianæ, altera non neglecta. Ideo ut ex Paulo colligitur, ferè esset superfluum omnia medicamenta, quæ ibi fuere adducta, recensere, maxime quod ista ægritudo ferè eodem modo

L cu-

Mathei Curtij

curatur, quo & tertiana notha . Ideo & ego remedia non repetens, tamen per vniuersalia percurrēs, ordinē medicinarum recensebo . Primo igitur si, quando incipit febris, sint fæces retentæ in intestinis , ordinabimus clysterem , & si sunt aliquæ cruditates in stomacho, lenitium in sequenti mane, in sero postea, si virtus sit fortis, & ætas patiatur curabimus , vt mittatur sanguis in pauca quantitate, propter nimiam abundantiam aliorum humorum, qui rationabiliter in laborante tali ægritudine reperiuntur, post si natura tentet vomitum, poterimus vti leuibus vomitiuis, & forsan exhibendo vomituum, non erit necessarium lenitium, forsan oportebit vtroque vti, post erit accedendum ad digestiua, prouocantia vrinam, & sudorem & apertis viis, resectis humoribus, apparentibus signis completæ digestionis, si natura ipsa non euacuat , vel imperfecte, dabimus pharmacum, quod educat choleram, & & phlegma. Demum rectificando membra principalia, si aliqua sint læsa, corrigendo accidentia, si aliqua adsint notabilia, ordinabimus regimen in sex rebus nō naturalibus , sicuti ordinauimus in cura tertianæ nothę, semper tamen habebimus maiorem curam de hemitritæo quàm de aliis, quū sit lethalis, nec sine periculo. Materiam medicinarum & ciborum, habes in cura tertianæ puræ, in cura tertianę nothę & in cura quotidiana, quæ omnia miscebis secundum magis & minus, vt dominium peccantis humoris exigit , & hæc pro cura hemitritæi, & omnium febrium sufficiant.

Fran-

74

FRANCISCI
CASSANI

TAVRINATIS

Quæstio

De missione sanguinis in morbo laterali.



XPOSITVRVS sanguinis missionē in pleuritide hac ratione mihi procedendum persuasi, ne huiusce rei confusio lectorū animos interturbaret. Principio igitur ex hypotesi pronunciata præmittam, ex Galeno non quidem detorta; sed ita ex proposito desumpta, vt non nisi ab mentis

penitus infano negari non possent, quæque ad causam nostram aperiendam maximè conducent. Alterum, quod me declaraturum polliceor est, quænam mens fuerit Galeni in hoc quæsito omnes quoque hic qui solent fieri cauillos pro posse diuellam, tertio rationibus autorumque dictis, quæ in contrarium facere videntur, examusim respondebo. In limine igitur quæstionis nostræ præmitto, quòd ad flegmonem faciendam exigitur, vt membra, à quantitate vel malitia materiæ aggrauata ad alia membra sanguinem propellant. Ita sanè quòd ad imbecilliora, ea quæ fortiora

L 2 fun

Francisci Cassani

sunt membra, demandant, rursusque vicissim ita fit, quoad materia ad membrum debilissimum transmissa sit, imbecillissimum si quidem omnium membrorum, vel facillime tandem aliorum fluxionem suscipit, quum aliò iam transferi non possit. Huius ordinem scribit Gal. 2. ad Glauc. & in artis medicinalis libro. cap. 95. & rursus 10. de ing. 6. longè tamen clarius in libello de inæquali intemperatura dist. 2. c. 1. in quo Galenus rem exemplo iucundissime proponit. Fiat, inquit, gratia exempli, in musculo flegmon. prius magnæ tum venæ, tum arteriæ, deinde maiores opplentur: successueque id fit, donec ad minimas quæ etiam & ipsæ replentur deuentum est, ad eas inquâ minimas, quæ prius non conspiciebantur. veluti in oculorum flegmone: quò tandem oppletæ venulæ ad extra sanguinè transfundunt, partim per earum ipsarum oscula, partim quia resudat, & sanguis ille in membrorum vacuitatibus, idest porositatibus recipitur. Declarat insuper, quæ sint illa membra, nempe sicut nerui, ligamenta, membranæ, & id generis. Hac hypothesei proposita rem ipsam aggredior. Affirmareque non erubesco in principio pleuritidis, sanguinem ex eadem lateris dolentis parte esse mittendum, ex vena nimirum basilica eiusdem lateris, verum quia ab innumeris iam hæc est exagitata quæstio, ne nos gratis quorundam refellere opinionem existimetis, primo ratione secundo Hippocratis, Galeni, Oribasii, & Pauli autoritatibus opinionem nostram confirmabimus.

In primis itaque dixerim pleuritim in principio esse ægritudinem partim factam, partim quæ fit, quoniã est ægritudo & apostema à sui principio, taleque inquit Gale. lib. de 4. temp. morb. 2. partim fiens, & futurum partim, at quum ægritudo tum facta existit, tum futu-

De missione sanguinis. 75

ra est, huic inquam ægritudini conuenit curatio, qua simul & semel vtrique satisfaciamus intentioni, si tamen id commodè fieri possit, quod & liquido apparet per Gal. in arte medicinali, & 13. de ing. distin. 2. cap. 3. sed in hac pleuritide inchoante, vtrique intentioni occurrèdum est, quod perbellè fiet per sanguinis missionem, ex eadem dolētis parte secta vena, ergo quòd hiis duabus intentionibus per hanc sanguinis detractionem faciamus satis, probo, euacuo siquidem sanguinis partem superfluentem, & membra exinanio, quæ inanita quod residuum est, nedum pro se retinēt: verum trahunt aliunde, maiores itaque venæ à minoribus sugunt, sanguis proinde, qui in locum apostematis confluxerat, ab aliis venis retrahitur, hacque ratione & iam factæ succurritur, & quæ futuræ fuerat ægritudini, verum duo mihi probanda super sunt, primum, quòd per euacuationem vel flobotomiam ex eodem latere futuram, & factam amoueam ægritudinem: primum sic probo, supponebatur enim quòd fieret flegmon ex aliorum membrorum transmissione ob multitudinem: vel malitiam, at ex basilica eiusdem lateris euacuatio superabundantem in toto quantitatem euacuat, quod ex Gal. in 2. reg. acut. 10. probo, dicente flobotomiam ex quauis vena à toto euacuat, licet ab vna immediatius: ab alia tardius, missione igitur sanguinis ex ea vena sanguinis multitudinem vel malitiam, vnde membra ad expellendum irritabantur, euacuo. Rursus quod à loco læso euacuet, probo, vena etenim vacuata aliunde trahit, sed venæ aliæ fortiores retinent, minus fortes vincuntur, quod ex hypotesi patuit, ergo &c. cum hoc etiam accidit expulsua virtus ipsius partis læsæ, ergo. Hanc responsionem virtualiter, licet non ad verbum, habet Hipp. 2. reg. acut.

L 3 10. præ-

Francisci Cassani

10. præsertim si adiunxeris quod & ipse dicit in 4. eiusdem 69. quod & manifestum est ex Galeni commentatione utroque in loco, verum ne refractariis & contumacibus aliquod relinquatur confugium, Hippocratis verba exponamus. Inquit ille, si dolor ad furculam ascenderit, adeo ut vel brachio, vel mammae, vel partibus superioribus molesta sit grauitas, internam cubiti venam secare expedit, his adde, quæ in 69. venam brachii internam, qua dolor afficit parte secabis sed reuertamur ad 11. secundi reg. acut. in quo inquit, si quæ sub sepio transuerso partes sunt, à dolore infestentur. nec ascendat vsque ad clauiculam. tunc nigro veratro vtere &c. Gal. in cōmento ita scribit. Quum igitur superiorum condolentia signum fecerit, tunc venam in cubito eam secare oportet, quæ sanguinem ab affecta parte & magis, & velocius tum reuellere, tum euacuare possit: Quibus etiam verbis appone, quæ & ipse scribit in commen. 69. vnde habetur nostra ratio iam clarè exposita, verum ut clarius res cognoscatur, Hyppo. sensum, qui alioqui adeo apertus est, ut expositione nostra minimè indigeat, rursus declarabo. Intendit ergo Hypp. quod dum fit flegmon pleuritidis, & in superiore parte, id quod manifestum euadit per brachii grauitatem, & dolorem in furcula, tunc confestim per sanguinis missionem ex eadē parte succurrendum est, sanguinem quidem superabundantem imminuemus, & eum quoque, qui iam effusus est, sanguinem retrahemus, atque hoc pacto corpus vniuersum inaniemus. Sub inferebat proinde Hypp. quod detrahendus erat sanguis ad coloris vsque mutationem, & in lib. 4. dicebat ad animi vsque defectum, mittitur inquam sanguis ad coloris mutationem, ut probè dicit Gale. non alia causa, nisi ut membra inaniantur, id autem

De missione sanguinis. 76

tem cognoscere licet ex mutatione coloris sanguinis prorumpentis, membra tunc circunvicina ita inanita à loco apostemoso trahunt. Si dolor, subscribit, descendat ad Hypochondria, non mittatur sanguis, sed exhibeatur pharmacum, quoniam signo nobis est, materiam esse in inferioribus costis, neque ab illis ex basilica sectio tantam quantitatem, ut subtrahat, potest euacuare, prius enim sanguis totus, è corde educeretur. Idcirco hoc in casu non ita confert, sicuti in priore. At huic nostræ rationi duo sunt, quæ negotium facesse possunt, primum quod Hyppo. loquebatur post principium, quod tamen falsum esse constat ex Gal. in principio commenti dicente, Hyppo. obseruare eam regulam, vndeunque natura repit &c. Cum igitur videat sanguinem ad superiora prorepere, ut motum naturæ insequatur, per superiora euacuat. Quod si Hypp. ipse intellexisset exacto principio, & iam fluxa (ut inquiunt) materia, ut quid Galen. dixisset Hyppo. motum naturæ imitari? imò oppositum fecisset, si in opposita parte euacuasset. In anaxione præterea non constat, quod Hyp. sanguinem nisi semel misserit. Nunc quero, an ex opposito latere, an ex eadem parte, si vltimum, ergo contra te, si ex opposito, ergo non obseruauit quem præscripsit canonem, quia per te vult quod mittatur ex opposito, secundo reiteretur ex eodem, sed non fecit in Anaxione, ergo aliter Hypp. operatus fuit, quam nobis scriptum reliquerit, obijcies, fortè quod non reiterauit, quoniam vires erant debiles, ergo ægritudo fuit satis longa, sed ægritudo longa cum virtute debili est mortalis, tertio cris. 5. dices quod nimium miserat prima vice, contra, quia dicit Hyp. quod misit quantum debuit, esset præterea facere Hypp. rudem, qui non sciret quantum sanguinis mitti deberet,

L 4 secun-

Francisci Cassani

secundum obstaculum potest esse, quia dicent quod materia quæ facit apostema, non potest denuo intra venas redire, sed contra. Galen. in 4. de tuen. sanit. dicit, quod si fuerit ægritudo flegmonosa debet Medicus mittere sanguinem, & euacuare venas, mox debet reiterare, cuius causam adfert ipse Galen. quia venæ inanitæ trahunt superfluitates existentes in partibus musculorum ad se, & in reiteratione educuntur, ergo venæ inanitæ sugunt de eo quod est in porositatibus membrorum. Item 4. reg. acut. 1. venæ inanitæ trahunt icores. Item 3. virt. natural. 13. materia in partibus cutaneis existens trahitur ad venas, & sic habetis meam primam rationem. secunda ratio, quod materia, quæ peccat qualitate, expellitur à membris, & expellitur de parte ad partem, & sic tandem donec sit ventum ad postremum debilius. Tunc sit si materia peccat qualitate, debet educi quàm celerius est possibile, nec debet illa materia mala remitti ad alia membra, sed à Medico euacuari, sed euacuando ab eadem parte educitur illa materia, quæ est illuc transmissa, & euacuando à parte opposita, euacuatur materia bona, & mala trahitur ad locum alium non apostematum. Istam rationem innuebat Gal. 2. reg. acut. 10. dum dicebat, quod Hypp. immitatur naturam, imò obseruat suam regulam, vndeunque natura repit &c. Sed dices quod illa non est conueniens regio, imò est conueniens regio ad euacuationem per quam educitur materia, non transeundo per membrum principale, nec inferendum nocumentum alicui alio membro notabili, sed sic in proposito, quia euacuando eam materiam per partem & basilicam dextram, via est satis ampla, & nullum oblæditur princeps membrum, & insequimur motum naturæ, ergo est conueniens regio, & sic habetis

De missione sanguinis. 77

habetis secundā rationem autoritatibus mox est agendum, sed per auctoritates ne fiat confusio, intendo hic probare, primo quòd Medicus rectè operando debet diuertere materiam fluentem, vel reuellere per locum directissimum ipsi loco, ad quem fluit materia, secundo quòd debet reuellere per partem habentem communicantiam cum illo membro, ad quod fluit, tertio quòd debet reuellere siue deriuare per locum non immediatum ipsi loco patiēti, sed per locum proximum, & quòd diuersio per loca distantia nullum adfert iuuentum, vel si affert, tarde, ex quibus apparet quomodo debet ex eadem parte mitti sanguis, & non ex opposita. primum probo sic Gale. in 5. de ing. 3. dum loquitur de retentione sanguinis fluentis ex vulnere, postquam declarauit, quòd sanguis retinetur per escaram factam, declarat quomodo etiam deriuatione, & reuulsione, tunc ponit differentiam inter deriuationē, & reuulsionem, & dicit quòd deriuatio fit ex partibus proximis, & exemplificat de defluxione ex palato, quæ ad nares deriuatur. Reuulsio verò fit ad contraria, vt fluentibus mensibus, nos reuelimus per vomitum. Istud dicit fuisse de mente Hypp. & per multa exempla id probat, vultuq; tandem, quòd ista reuulsio fiat ad contraria, & fiat per partem rectam correspondentem parti, per quam fit fluxio, quod exemplo sanguinis ex naribus fluentis probat, vt si fluat sanguis enare dextra, affligi debet cucurbitula in hypocōdrio dextro, & è contra fluente ex sinistra, quòd si applicatio ventosæ non sufficiat tunc veniendum est ad sanguinis missionem, & dicit quòd si vires non fuerint imbecilles, tunc debet sanguis mitti ex vena, quæ de directo profusione respondet, subinfert, quòd omnes reliquas profusiones tum ad contraria reuocabis, tum
ad

Francisci Cassani

ad vicina deriuabis. Ecce ergo qualiter secundum Galenum omnis deriuatio vel reuulsio debet esse secundum directum loco patienti, sed dicit aliquis vt in casu nostro, quod pars opposita est directa loco patienti: vt si fluat sanguis è nare dextra, sitque pleuresis in latere dextro. Locus sibi directus erit locus sinister, sed contra quia Galen. explicat seipsum, quia de nare dextra fluente sanguine, mittit sanguinem ecubito dextro, & applicat ventosam hypochondrio dextro. Præterea Gal. in tertio de tuenda sanitate loquens de frictionibus quomodo fiât secundum rectum vel transversum dicit quod rectum vel transversum sumuntur penes villos, vel fibras musculorum. Idem dicit in de motu musculorum, sed si brachii lateris dextri nullam habet communicationem cum latere sinistro in rectitudine, sed vena lateris dextri continuatur cum vena caua per villos proprios, & villos longitudinales, ergo pars dextra debet dici recta parti dextrae, non sinistrae. Præterea Gal. secundo ad Glauc. post curam carbunculi loquens de intentionibus habendis in cura inflammationum, dicit, quod fluentium humorum retractatio fit per communes venas, si verò iam membrum obsederint, deriuatio fiat vtraque istarum, scilicet deriuatio & retractatio fit secundum Hypo. per communes venas, & exemplificat de profluvio mulieris, quomodo debemus & reuellere, vel deriuare per communes venas, subinfert, quod si in parte dextra fuerit locus passionis, à dextra manu, vel crure dextro sanguinem detrahes, si verò in sinistra, tunc detrahes sanguinem à membris, quæ illi ex directo sunt. Quod enim ab ipso catexis dicitur, significat, dicit, secundum rectitudinem. Hic nihil immoror in explicando cata potest construi cum genitiuo, vel datiuo, quia vtrunque construas, verba Galen. sunt adeo clara;

De missione sanguinis. 78

claras; ut non possint tergiuersari, subiungit Gal. quod viciniore venas oportet incidere, & aducit causam huius rei, & dicit, quod iste sunt viciniore secundum directum loco patienti, & ut rem omnem melius pandat, exemplificat de inflammatione splenis, quod debet Medicus eo flegminante mittere sanguinem ex latere sinistro, è contra hepate flegminante ex latere dextro, & applicat regulam vniuersalem, quod patientibus membris extremis debet à cōiunctis fieri euacuatio, siue velis deriuare siue velis retrahere, sed dices quod Galenus intelligit, quod ista fiant post principium, postquam materia est fluxa. Contra Galen in eadem parte loquens de sinanche, dicit, quod debet primo mitti sanguis ex vena cōiuncta secundum directum, post debet fieri ex loco ipso, sed quia in sinanche non possumus attingere locum ipsum, euacuamus per venas sub lingua, ergo prima quæ sit secundum eum in directo latere, debet fieri in principio. Iam ergo habentur duo ex dictis probata. Restat tertium probandum ex Galeno in libro de sang. missio. distinct. 2. sum. 2. cap. 1. dicit enim Galenus autoritate Hyppocratis, quod. Quibuscunque cataxin, eruptio sanguinis, euenit. hoc iuuat è contra autem nihil iuuat, vel interdum nocet. Cuius rationem & quare aliquando noceat, ipse affert, quia vires corporis citra leuamen ægritudinis deiicit, quod probat suo vſitato exemplo, sanguis effluens turgente liene, à nare dextra nihil proderit, & vice versa in hepate effluente è nare sinistra, & ita reuulsionis causa si venam secueris in oppositis sanguinis eruptionibus, citissime conspicuam habebis vtilitatem, at si contra secabis, nihil profueris, & ad probandum quod sit necesse in reuulsionibus quod vena ex qua mittitur sanguis communicet cum loco petiente, & quanto maior

&

Francisci Cassiani

& directior fuerit communicantia, tanto commodior fuerit, dicit quod non æque prodest in liene affecto, si mittatur sanguis ex vena digiti medii, & venæ cubiti sinistri, quia etsi vtrique vena sit sinistra, quia tamen vena cubiti est proximior & directior. Ideo magis conuenit. Post pauca subinfert Galenus, quòd etiam in pleureticis sanguinis missionem ex vena quæ est secundum directum lateris patientis clarissimam sæpe utilitatē attulisse, quæ verò fuit facta ex latere & brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certè post temporis interuallum. Dicunt aliqui quòd per post temporis interuallum intelligit Galenus post principium, quasi velit dicere, quod flobotomia in pleuritide ex eodem brachio post principium iuuat maximè, sed ista expositio non potest stare, cum hoc quod distorquet literam vt patet legenti, cum hoc etiam est falsa, vt apparet ex his, quæ subiungit Galenus in eodem loco, quia vult, quòd reiteretur eadem die aliquādo, aliquando post per diem, sed post principium non est reiteranda bis & ter sanguinis missio etiam secundum illos sic exponentes, ergo Gallenus non intelligit de sanguinis missione post principium. Præterea inde const. art. med. decimonono, dum ponit intentiones curatiuas flegmonis, dicit, quòd prima intentio est euacnatio humoris fluentis in partem inflammatā: quomodo autem debeat administrari, apparet ex situ partium, quia si influat sanguis in coxam, debet tunc mitti sanguis ex vena poplitis, & ita fluentibus menibus ex vena poplitis, quòd si influant humores in pulmonem, vel thoracem, per internam cubiti venam euacuationem demoliermur, & sanguinem subtrahemus. Subinfert Galen. quòd optima & facilissima euacuatio est, quæ per proximas & affectæ partis com-

De missione sanguinis. 79

communes venas fit, sed dices, quod Galen. per interiorem venam intelligit venam cruris ex eadem parte, vt existente pleuritide in latere dextro, mitti debet sanguis ex vena poplitis dextri, & ita illam appellat interiorem, sed cum hoc quod ista expositio nō conuenit illi textui, est etiam contra Galenum, quia vt per eum, sexto aphorismorum 36. apparet, & secundo ad Glauconem, & 13. de ing. distinct. secunda cap. 3. existente apostemate in parte superiori, mitti debet perpetuo sanguis ex vena cubiti. Si vero fuerit in partibus inferioribus, debet mitti de vena poplitis, vt si fuerit apostema in vtreo, in vesica &c. Ex directo ergo secundum superius & inferius debet sanguis mitti ex vena correspondente. Ita etiam Galenus 13. de ing. distin. 3. cap. 5. post multa dicit, quod debet Medicus in hepate, & pulmone flegmonem patientibus emittere sanguinem ex vena directa secundum partes superiores, & ita in sinanche debet primo tundi vena manus, per manum non intelligas eam in qua sunt digiti, vt videntur plerique tenere, quia quodocunque apud Galenum inuenitur manus absolute, intelligit vnam, quia vt seipsum declararat in tertio anatomicarum aggressionum, manus est duplex, vna quæ dicitur simpliciter manus, & incipit ab articulo scapulæ, & terminatur ad brachiale, altera est manus, quæ dicitur extrema, & ea diuiditur in quinque digitos, & incipit à brachiale, vult ergo Galenus quòd incipiente flegmone in sinanche ex vena brachii lateris correspondentis mittatur sanguis, & in apostematibus membrorum superiorum vult quòd mittatur sanguis ex venis brachii, sicut etiam in de sang. miss. & 6. aphorismorum 36. contra Auicenam, qui vult quod incipiamus à vena malleoli. Post Galenum est Oribasius qui
lo-

Francisci Cassani

loquens de vena scindenda secundum Galenum dicit, quòd mens Galeni fuit, quod in pleuritide mitteretur sanguis ex eadem parte, ex latere videlicet affecto. Paulus quoque Aegineta non in capite de pleuritide, quia nihil de eo negotio pertractat, sed in lib. 1. cap. 40. dicit, quod si fuerit dolor in aliqua parte stante plenitudine, debet Medicus mittere sanguinem ex vena magna, quæ erit proximior loco patienti. Quod est omnino contra Rasim. qui vult, quòd si sit plenitudo fiat primo sanguinis missio ex opposita parte, si nò sit plenitudo fiat in eadem parte, è contra iubet Paulus, cuius ratio potuit fuisse prima, quam nos adduximus. Et ita apparet ex his quatuor, quòd in pleuritide debet mitti sanguis ex eadem parte. Quid autem senserit Auicenna, & Rasis non est nobis curæ, satis est, quòd clarè deficiunt à Galeno. Restat modo satisfacere obiectionibus, & primo est autoritas Galeni 4. de ing. 6. vbi dicit, quòd si aliqua fluxio valenter irruat, reuellere ad contraria studebimus, vtrique si fuerit in superioribus vlcus per inferna purgantes: si autem fuerit in inferioribus per superiorem ventrè purgabis, at si ià fluxio restitit &c. ergo sequitur quod reuulsio debet fieri ad distantia, non ad proxima. Respondeo, quod reuulsio debet fieri & potest multis ingeniis, & pharmaco purgante, & ligamentis, & frictionibus, vt apparet 5. de ing. 3. tunc dico, quòd in flegmone non possunt fieri reuulsiones omnibus istis ingeniis, sed debet Medicus succurrere optimo ingenio & citius succurrente, iuxta illud, extremis morbis extreme exquisitè remedia, in simili dicebat Galen. in eo capite quòd flobotomia excusatur aliquando iis ingeniis, si fuerit homo sanus, vt inedia; alui purgatione, multa frictione, exercitio, balneo, verum in 13. eiusdè di-

De missione sanguinis. 80

distinct. 2. cap. 3. dicit, quod in febricitante non licet
vti illis suplentibus vices flobotomie. Ita in propo-
sito dico, quod nos debemus vti reuulsione, sed cum
sanguinis missione, non cum pharmacia, & illa quæ fit
cum flobotomia, fieri potest ex parte recta proxima
habente colligatiam cum parte læsa, quia nullum im-
minet periculum ex ea, sed non debet fieri cum phar-
maco ad partem proximam: quia vt dicit Gal. 13. de
ing. dist. 3. cap. 5. Medicus reuellendo cum pharmaco
inflammatur, & calfacit, & facit fluere ad locum læ-
sum ipsam materiam. Ideo vbi contingit reuulsio à
medico operanda, non debet eam facere existente par-
te læsa proxima viis ductū, quia inflammatur ea pars.
Ideo magis læderetur. Ista est causa, quare Galen. lo-
quens de reuulsione cum pharmaco vel ligaturis, di-
cit non debere fieri nisi in parte remota. Ita etiam de-
bent intelligi verba Galen. 13. de ing. dist. 2. cap. 5.
Secunda difficultas est, quod Galen. & Hyp. 4. apho-
rif. 68. loquentes de auersione, dicunt, quod auersio fit
ad contraria, vt secundum longitudinem, supra infra-
que, secundum latitudinem à dextris in sinistris, secun-
dum profundum ante & retro, modo in isto casu de-
bet fieri auersio secundum latus, ergo à dextris in si-
nistris, ergo non debet fieri flobotomia in eadem par-
te. Respondeo, quod diuersio est ad oppositum, sed
non ad extreme oppositum, sed sufficit quod diuersio
fiat per contrarium motum, vt si materia fluebat ad de-
xtrum, quod ego faciam eam fluere ad sinistrum, quod
facio mittendo sanguinem, quod declaro, quia si san-
guis fluit à vena caua ad venam paruam, quæ est in
dextra parte, subtrahendo sanguinem ex eadem par-
te, inanio venâ cauam, & facio, quod sanguis qui prius
mouebatur ad dextram, nunc reuertitur ad eandem,
venam

Francisci Cassani

venam cauam & magnam, & non potest reuerti ad venam magnam, nisi faciat motum à dextris in sinistris, hoc est quod vult Galenus ad hoc quòd dicatur motus à dextris in sinistris non est necesse, quòd semper tendat vsque ad sinistram partem, quia sicut exempli gratia, lapis qui descendit à sursum, dicitur descendere ad centrum, etiam quod continuo non attingat centrum, sed etiam per duas vlnas moueatur descendendo, potest dici peruenire ad centrum Ita est in proposito, dicitur motus à dextris in sinistris, etiam quod materia non redeat nisi ad cauam venā quæ est in medio, tertia difficultas est, quia Gal. in 1. ad Glauc. cap. de causis inflammationis, dicit, quòd existente flegmone in parte genu debet mitti sanguis ex vena cubiti, è contra si fuerit apostema in cubito, vel in parte superiori, deberet mitti sanguis ex parte inferiori, ergo sic debet fieri in pleuresi, quæ est apostema in parte superiori, debet ergo mitti sanguis ex parte inferiori, vt expoplite, ex isto loco Galeni. credo quòd Auicenna habuerit suam opinionem. Respondeo igitur & dico, quod aliud est de flegmone in parte interna, aliud de flegmone in parte externa, quia flegmon in parte interna, idest in aliquo viscere, indiget celeri subsidio, vt dicit Gale. in initio illius capitis, ita quod nisi fiat talis preuisio in principio, & aliquod committatur erratum, agitur de periculo vitæ, & inter cætera incommoda quæ accidunt ad flegmonem internam est suppuratio, ita quòd si fiat suppuratio est periculum maximum, quia dicit Gale. 2. pronost. § 2. suppuratio est media inter sanitatem, & insanabilitatem, debet ergo Medicus omnino vitare istud incommodum quantum potest, sed nullum est magis præsentaneum remedium, quàm euacuatio à loco in eo casu, quia debet Medicus
niti

De missione sanguinis. 81

niti ut materia in eo loco recepta educatur per flobotomiam, & non potest educi per flobotomiā, nisi educatur ex loco rectitudinem habente cum loco læso, & ei proximus, & habet colligatiam cum eo, & ad istud propositum dicit Galen. in de sang. miss. distin. 2. sum. 2. cap. 5. quod in principio apostematum fluente adhuc materia debet fieri reuulsio cum euacuatione, sed in apostemate cruris vel genu, aut alio apostemate exteriori, ubi non est tantum periculum de suppuratione, non curat Medicus reuellendo euacuare, à loco apostemato, quia sufficit quod reuellat à parte distante, quia per sanguinis missionem in brachio bene fit reuulsio & tollitur ille impetus naturæ expellentis ad eam partem, & hoc sufficit Medico. Ideo Gal. in de flobotomia, distin. 2. sum. 1. cap. 3. dicit, quod non debet mitti sanguis usque ad coloris mutationem in omni flegmone sed solum in interioribus, ob scilicet magnum periculum, quod imminet ex ipso flegmone interno; reuulsio opposita solum sistit impetum impellentis naturæ, & non euacuat à loco apostemato. Quod ista sit vera intentio Gale. apparet ex eo 13. de ing. & in de flobotomia, ubi expresse vult quod flegmonizante aliquo viscere ex inferioribus, quod mittatur sanguis ex vena poplitis, quia illa habet omnes conditiones cum ipso utero & vesica, sed in apostemate cruris vel genu non mittit ex illa quæ est sub malleolo, quia non est intentio ad euacuandum à loco læso. Quarta difficultas est, quia videtur quod ex flobotomia ex eadem parte fiat maior attractio ad locum læsum, quam euacuatio, quia videtur quod ex flobotomia ex eadem parte faciamus currere sanguinem, ad eam partem, ad istud respondeo, quod euacuatio ex eadem parte non trahit materiam ad locum læsum, sed attrahit à loco

M læso.

Francisci Cassani

læso, quia flobotomia, ex quacunque parte fiat, euacuat à toto, secundum Galen. siue ergo fiat ex eadem parte, siue ex opposita, euacuabit à toto, sed accidit ista differentia, quia ab eadem parte melius subducit materiam à loco, & melius suscipit impulsione à natura factam. Quod declaro, quia materia propulsa à venis, impellitur secundum longitudinem villorum si ergo mittatur sanguis ab eadem parte, per impulsione quam habet per villos lōgitudinales tota influit illuc, & non transibit ad locum læsum, & non magis replebit, quàm euacuabit, imò magis euacuabit, sed dices, dicamus quod non euacuem multam quantitatem sanguinis, ob aliquid quòd impediatur, tunc natura suscipit illum impetum. Ideo magis ledetur. Respondeo, quod dum non possumus vnica euacuatione euacuare, tunc stante aliquo impedimento debemus reiterare, & quando Gal. dicit in de flobotomia dist. 2. sum. 3. cap. vlt. quòd si intendamus euacuationi, & reuulsioni, tunc eadem die, & post quatuor horas, si intendamus reuulsioni tantum, sequenti die. Respondeo, quod non intendimus reuellere solum, nisi vt sistamus aliquem alium fluxum, tunc ad sistendum alium fluxum, sufficit reiterare die sequenti, ne debilitetur nimiū virtus. Ideo dicebat Galen. ibi, quod æger debet refici, & post reiterari, sed dū intēdimus reuellere, & euacuare fit id ad prohibēdā aliquā flegmonē, ideo acceleratione indiget, & nō tāta mora. Et quantūvis Gal. dicat, q̄ eadē die debet reiterari, tamē nō itelligatis, q̄ sufficiat eadē die, vt mane, post vespērā vsq; differre, sed debet intermitteri spacium trium, aut quatuor horarum, quia Gal. in hoc proposito loquens in quarto de tuenda sanitate dicit, quod debet tanrisper intermittere, vt alii humores, qui sunt intra venas, intro remeant. Hæc satis dicta sint pro ista quæstione.

Com-

COMPENDIUM

BREVE BENEDICTI

VICTORII FAVENTINI,

De Dosibus medicinarum.

Caput primum.



ERMO iste brevis tria
habet capita principa-
lia, primum caput est
medicinarum soluentium,
secundum caput erit di-
gerentium, tertium vn-
guentorum & empla-
strorum. Pro primo ca-
pite attende, quod me-
dicinæ soluentes quædā
sunt in forma potabili,
quædam in forma pilu-
larum.

Et quoniam medicinæ soluentes in forma po-
tabili, & in forma boli, eodem cursu currunt, ideo pri-
mo de his similiter sermonem habebimus. Et nota,
quod medicinæ soluentes sunt duplices, quædam sunt,
quæ solvunt electivæ humorem proprium, vt Scam-
monea coleram, Sena, epithimum, melancholiā, Tur-
bit, & agaricus pituitam, quædam sunt medicinæ sol-
uentes leniendo, & sunt illæ quæ euacuant à vīs latis
educendo materias communes, & ideo sunt basis om-
nium medicinarum electivæ soluentium, veluti est cas-

si

Bened. Vic. Fauen.

sia fistula, manna, thamarindi, & condimenta quædam sicut cōfectio de prunis sine scamonea, de sebesten sine scamonea, & de cassia sine scamonea, Dosabis igitur medicinas soluentes leniendo, secundum medicinas soluentes secundum electionem humorum educendorum. Et attende quod cum dosis medicinarum sit quantitas pōnderalis earundem, quod in volendo dosare medicinas lenitiuas debes habere respectum ad ætates principaliter, eorum corporum, quæ lenitiue euacuari debent. Considerabis igitur tres ætates, primo ætatem à septimo ætatis anno infra, secundo à septimo vsque ad sexagesimum annum, tertio ad sexagesimo vsque ad vltimum senium. In prima itaque ætate Medicus debet esse valde prudens, & timorofus in dando medicinas solutiuas, in quibus ingreditur scamonea, vel aliud forte solutiuum, sicut est turbitih, esula, & etiam pro parte agaricus, quoniam à septem annis infra ætatis corporis humani humidum est valde resolubile, & medicina electiue, operans nedum agitat humidum, verum etiam sui caliditate illud consumit, ideo consulo quod Medicus in quantum potest, caueat ab exhibitione medicinarū in dicta prima ætate. Sed quoniam medicinæ lenientes vltra hoc quod euacuant materias communes in viis latis existentes, non viciant membra, à quibus, educunt ideo in hac prima ætate denegandę corpori non erunt. Quarum dosis communis erit maior vsque ad drag. 7. Iuniorum vero secundum quod annuarim minorabitur ætas à septimo, anno infra, vt in ætate septem annorum audacter exhibe cassiam ad dosim dragmarum 7. In ætate sex annorum 6. drag. dabis. In ætate verò quinque annorum drag. 5. cum veneris ad ætatem quatuor annorum consulo, vt nullatenus des ipsis pueris medicinas
le-

lenientes, quoniam sui viscoſe ſubſtantia, & dulcedi-
ne facile cōmouent vermes. Igitur pueris à quatuor
annis infra prohibebis omnia hæc caſſiam, & confe-
ctionem de ſebeſten, & confectionem de prunis, & ſi-
milis his eo tamen tempore libere poteris offerre ip-
ſis pueris rheubarbarum in ſubſtantia mag. quia oppu-
gnat vermibus, minus vero in infuſione. Et maior do-
ſis rheubarbari in dicta ætate erit uſque ad drag. vñā,
vel in forma pilulari, vel in forma potabili. In ætate
vero media, cuius ſunt tres particulares ætates, vñā
uſque ad 18. annum, alia uſque ad quadrageſimum, ter-
tia uſque ad ſexageſimum. In prima ætate doſis me-
dicinarum lenientium poterit aſcendere uſq; ad drag-
mas decem à decem & octo uſque ad quadraginta, uſ-
que ad vñciam vñam & mediam à quadraginta uſque
ad ſexaginta quandoque dragm. decem, quandoque
vñc. vñam & med. dare poteris attenta conſideratio-
ne ad obedientiam, vel inobedientiam alui, ſiue ea tri-
bue in forma boli, vel in forma potabili. In tertia æta-
te vero, quæ eſt uſque ad vltimum ſenium nunquam
transcendas doſim dragmarum 10. medicinarum le-
nientium. Et ſic in omni ætate audacter poteris con-
tribuere prædictas doſes medicinarum lenientium.
Demum conſiderabis doſim medicinarum electiue ſol-
uentium. Et attende, quod tales medicinae ſunt in du-
plici differentia. Quædam enim ſunt furioſæ in ſuis
operationibus, & modo ſoluendi, vt ſcamoneum, ela-
terium, quarum operationes, ſunt ſicut furioſi opera-
tores, & ideo cogitabis quod doſis dictarū medicina-
rum ſit per gr. & non per drag. vel per ſcrup. & in dan-
do tales medicinas corpori humano non attingas uſ-
que ad ſcrupu. earum, ſed multo infra doſabis eas per
grana adeo vt earum doſis non ſint, niſi gr. 10. ſi vero

M 3 ſint

Bened. Vic. Fauen.

sint medicinæ laboriose soluentes non tamen cum furia, & celeri euacuatione materiæ peccantis, dosis earum non attinget vnc. sed communis dosis earum non debet præterire vnc. med. vt turbith, agaricus, aloes. Si vero fuerint medicinæ electiue soluentes compositæ, quæ solunt per virtutem scamoneæ, vel alterius fortiter soluentis, dosis earum de per se non debet præterire dragm. quatuor sicut est electuarium indum, electuarium de daçtilis. Confectio amech, confectio elescoph. Electuarium de succo rosarum. Si vero hæ medicinæ compositæ in quibus est virtus scamoneæ, vel alterius electiue soluentis, offerantur corpori humano permixtæ cum medicinis lenientibus sicut est communis practicandi modus, non attingas earum vnc. med. sed secundum quantitatem medicinæ lenitiuæ dosabis prædictas medicinas, vt si maior sit dosis lenientium, minor dicatur esse dosis electiue soluentium, verbi gratia, si dabis drag. 6. cassiæ fistulæ nouiter tractæ, vel alterius de prædictis medicinis lenitiuis secure poteris ei admiscere electuarium indum, vel diafiniconem in dosi dragmarum trium. Si vero lenitium fuerit vncia vna, solutiui dosis non transeat drag. 2. & ad plus drag. 2. cum dimidia, & eandem dosim solutiui obferuabis, si plura solutiua adinuicem permiscere volueris, siue hoc fiat in forma boli, siue in forma potabili.

Si vero Medicus morbum curabit cum exhibitione pilularum, consideret primo si compositionem illarum ingreditur scamonea vel non, si non, sicut in pilulis de agarico, & de assaiaret, de aloe lota, tunc dosis istarum debet esse vsque ad maximam dosim quæ est dragmarum 2. Et quia melius est infra subsistere quam complete euacuare, ideo communis earum dosis maior erit vsque

vsque ad dragmam vnam & med. attenda etiam ætate ipsius patientis, quoniam si esset puer, vel senex, earum dosim minuere debebis, si vero in earum pilularum compositionem ingrediatur scamonea, debes considerare quantitatem scamoneæ ingredientis, si maior illius quantitas fuerit, tunc minues dosim earum, dato etiã quod non multum ingrederetur de scamonea, sed si cū ea multa alia soluentia ingrederentur, sicut sunt pilulæ cochix Almanf. Et pilulæ foetide, & multe alie his similes, quarum dosis communis maior est dragm. vna, vsque ad scrupulos quatuor, tunc considera quod tales pilulæ medicinæ sunt prohibendæ & cauendæ à Medico in prima ætate, & tertia de iam dictis ætatibus, vbi vero has pilulas cōpones cum pilulis, in quarum compositionem non ingreditur scamonea, vel aliud forte solutium, secundum quantitatem pilulæ non scamoneate, verbi gratia, cum scrup. duobus pilularum assaieret, vel de agarico, vel elefanginarum poteris permiscere scrup. 2. vel 2. & med. pilularum scamoneatarū vel aliud forte solutium. Et hæc de medicinis soluentibus tum leniendo, tū electiue educendo.

Secundum caput est de digerentibus, seu de dosi ipsorum quæ corpori humano offerri debent.

Attende quod cum maior virtus alteratiua membrorum corporis humani sit in decoctione facta ex appropriatis simplicibus materiæ digerende, quam reperiatur in syrupis & aquis distillatis, ideo consulo, quod ceteris paribus maior quantitas syruporum cum aquis destillatis corpori exhibeatur quam ipsius decoctionis, ob quam rem considera quantitatem corporis

M 4 patien-

Bened. Vic. Fauen.

patientis, & quantitatem materiæ peccantis digeren-
de, quod si corpus robustum & magnum fuerit, cuius
membra sint proportio nata quantitate, poteris syru-
porum dosim crescere cum aquis destillatis vsque ad
vnc. 8. pro vice ei offerantur vnc. 3. syruporum & in
his non ingrediatur aliquod solutium, & vnc. 5. aqua-
rum, quod si non fuerit tantæ magnitudinis & roboris
corpus, vel in ætate pueritiæ, minuere debes dosim sy-
ruporū secundum quantitatem minoris corporis, &
etiam ætatem pueritiæ, vt si communis dosis syru-
porum cum aquis destillatis fuerint vnc. 5. secundum
quod corpus erit excedentis quantitatē & crassitie,
& etiam materia erit multa, exhibebimus maiorem
dosim syruporum. Si vero à mediocritate corporis
minuat corpus humanum, & in eo pauca sit materia.
Infra communem dosim syruporum poteris deueni-
re ad vnc. 3. vsque ad vnc. 3. syruporum cum aquis de-
stillatis. Si vero pergratum erit Medico, vel infirmo
digerere materiam cum decoctionibus, cum in ea ma-
ior sit virtus digestiua illius decoctionis dosis erit vs-
que ad vnc. 5. vna cum modico zucchari, vt melius na-
tura voluptuetur in ea, quæ etiam decoctione in sua
dosi poteris permiscere vnc. vnā syruporum secun-
dum quod expediat pro digestionē huius vel alterius
materiæ digerendæ, & hæc de dosi digerentium di-
cta sint.

Tertium caput de vnguentis & emplastris.

In omni quantitate vnguentorum dosis debet esse
alis, vt pro qualibet vncia oleorum, vel succorum in-
ingre-

gredientium vnguenta sufficit dragm. med. puluerum ingredientium dicta vnguenta, quod si volueris vnguenta in suis virtutibus vigorare, pro quælibet vnc. olei, vel succorum addere poteris dragmam vnam pulueris, de dosi ceræ ingredientis huiusmodi vnguenta dicimus quod diuersificanda erit secundum quod attendimus maiori, vel minori vnguentorum densitati. Vbi velimus densius vnguentum, plus de cera dabimus. Vbi vero minorem densitatem requirimus, & minus de cera contribuimus, ob quam rem cum cerota componere voluerimus, maiorem ceræ dosim contribuemus.

Vbi vero vnguenta molliā tētabimus, & maiorem ceræ quantitatem addemus. In prædictis quoque vnguentis considerare debes quātitatem, seu dosim oleorum ingredientium, similiter succorum, & puluerum, & quandoque gummorum iuxta quantitatem humorum peccantium, quod si humor peccans calidus fuerit, dosim frigidorum augmentabis. Si vero frigidus, dosim calidorum in maiori quantitate præparabis. Et simili modo in passiuis de humido, & sicco dicemus: semper tamen attenta complexionē membri peccantis, quod si fuerit membrum complexionis frigida patiatur, autem ægritudinem calidam, dosi medicamentorum debet declinare ad maiorem gradum frigiditatis, primo vt repellamus calidam, secundo vt temperaturam frigidam membri conseruemus, & sicut dico de hac, dicendum est de complexionē calida, ficca, & humida. Et attende quod si membra principalia patiantur à mala complexionē calida, vel frigida, non debes illis applicare vnguenta, vel cerota quæ sunt vehementis frigiditatis, vel caliditatis, quoniam medicamenta intensæ qualitatē, non debent appli-

Bened. Vic. Fauen.

applicari membris principalibus propter rationes datas a Principe in quarta primi. Si vero volueris emplastra componere aduerte, quod ea, quæ decoquuntur, vt herbæ, semina, radices, in maiori dosi debent assumi, quam sit dosi pinguium, puluerû, farinarû, & oleorû ingredientium dicta emplastro, quoniã de oleis in emplastris tantû debes apponere, & de pinguibus aliis sicut butirosa, & pinguedines tãtû debes apponere quantû sufficit ad impinguandû solû ipsa emplastra. Et hoc vt aliorum virtutes non confundantur. Et in his emplastris debes habere considerationem ad complexionem morbi peccantis, quod si morbus calidus fuerit, vigeant in emplastro frigida, non tamen sine adiutorio aliquorum calidorum, ne sua frigiditate cõstipetur, & compingatur materia in loco laborante. Simili modo si complexio morbi fuerit frigida, non sis contentus solis calidis, ne eorum caliditate membrum patiens dissoluatur. Et ideo relinquo prudentiæ Medici in dosando emplastro, & eorum quæ ingrediuntur ipsa, in frigidando calidis complicare, & in humido, siccis & è contra. Et hæc sunt de oleis & vnguentis, ac emplastri.

Con-

CONCLVSIONES

BARTHOLOMEI

MONTAGNANAE

DE COMPOSITIONE,
& Dosi medicamentorum, etiam om-
nium ferè simplicium.



IN O R debet esse
dosis ingredientis com-
positionem, quæ est ele-
uata in gradu, quâ quæ
non est ita. Elleborus
in gradu, vt si spici nar-
di, camomillæ adiun-
gatur, minor debet esse
dosis quam camomil-
le, quæ est calida & sic-
ca in primo, & prima
inuatione.

Maiores debet esse medicine dosi habentis res-
pectum ad longinquas partes, quam ad propinquas, &
agaricus licet educat phlegma à toto corpore, maior
tamen est respectus eius ad stomachum. Et Hermodactili
maiores habent respectum ad iuncturas, qua-
re in comparatione ipsorum cum Agarico maior de-
bet esse dosis Hermodactilorum ad educendū phleg-
ma ex utroque.

Minor debet esse dosis Scamoneæ, quam Rhabar-
bary,

Bart. Montag.

bari, & tanto minor quanto excedit in gradu.

Medicinæ ingredientis compositionem multorum iuuamentorum, vel operationum, minor erit dosis, quam multorum iuuamentorum tardæ operationis.

In medicina ponuntur aliquando duæ probasi, aliquando tres, aliquando vna tantum, vt in Benedicte ponitur Turbith ad euacuandum phlegma à renibus, & iuncturis, & ad ipsum fortificandum ponuntur Hermodactili, & quia tarde operationis Scamonea in paralyfi, quæritur materierum consumptio, & neruorum corroboratio. Ergo simul miscetur Castoreum & Piretrum pro vna basi, aliquando ponuntur in vna basi duæ medicinæ contrariæ cognatæ membris diuersis, quia natura diuidit vnicuique solum proprium, & conueniens. Nam vnumquodque membrum non remouet quod sibi non conuenit, ad quod iuuatur ab attractiua, & aspectu membri.

In solutiuis quarti gradus distinguitur quia ponimus primo gradu solutiuum. Aquam lactis, syrupum violatum, mel rosatum colatum. In secundo Thamarindos cassiam fistulam, mannam. In tertio Polipodium rhabarba. & similia. In quarto Scamoneum, serapinum colatum. Dosis autem in minori gradu minor erit.

Tenenda hæc regula firma & solida ne transcendant vnciam duas, syrupo. licet dosis consueta sit vnciam duas neque vncia tres, aquarum pro singulis viribus.

Volens ordinare syrupum debet assumere accommodatum membro cui paretur syrupus, & ad stomachum. Absinthii syrupus vnc. vna, & de mentha vnc. 2. aque eorundem an. vnc. 2. in casu frigido.

Hec regula sit infallibilis in omni affectu calido & fri-

frigido, si dandus erit syrupus miscere conducit aliquā
aquam cordialem, & buglosse, vel melisse.

Omnes syrupi cōpositi ex variis medicinis respiciē
tes varias egritudines appellantur magistrales, vt ex
Absinthio, ex stechade, stomacho, & capiti.

Medicinæ educentes, alie sunt lenitiue, vt Cassia,
manna, diacassia, sebesten, Aliæ laxatiuæ, quarū aliæ
simplices propriorum quatuor humorum, aliæ compo
sitæ vel in pilulis, vel electuariis.

Doses.

Syruporum dosis ad haustum vnum vnc. 2.

Aquarum cum mixtura syr. duplum totius.

Decoctorum siue syrupus ad vnc. 4. med.

Elect. à drag. 2. vsque ad vnc. 2. non certa.

Loch ad vnc. med. succesſiue lambendo.

In digestiuis obseruandum quod membrum præcipue
peccet quod vbi remotum fuerit ab ore plus aque di
gestiue haustus miscendum, si proprius, plus syrupi,
vnde fit, vt aliquando in doloribus renum, matricis
vesice solis aquis digeratur sic etiam si stomachus, &
mezeraiçæ peccent solis syrupis digeri materia potest
in quibus Medicum anatomices meminisse iuuat.

Medicine in liquido cholere.

Thamarindi quorum dosis est a drag. tribus ad drag.
quinque.

Diaprunis ab vnc. med. ad drag quinque.

Elet. de suc. ros. à drag. 4. ad drag. quinque.

Conf. Ham. ab vnc. med. ad dragm. sex.

Diamanna ab vncia vna, ad vncias duas.

Cassia

Bart. Montag.

Cassia extracta ab vnc. vna ad vnc. duas.

Diaprunis simplex à drag. 4. ad vnc. 2.

Elect. de sebest. ab vnc. med. ad drag. 5.

Elect. de psilio à drag. tribus, ad drag. 5.

Hiera simplex à drag. 3. ad vnc. mediam.

Phlegmatis.

Diaphen ab vnc. med. ad drag. 5.

Indi ab vncia media ad drag. 5.

Elefscophi ab vnc. med. ad drag. 5. vel sex.

Hiere simp. à drag. 3. ad vnciam med.

Benedicte lax à drag. 3. ad vnc. mediam.

Melancholie.

Diasen. à drag. 6. ad vnciam vnam.

Hiere ruf. Hiera log. Hiera cherm. ab vnc. med. ad
drag. quinque, vel sex.

Diacatholicon a drag. 5. ad vnc. vnam.

Medicine in solido pilularum phlegmatis.

Hiere simplicis Hiere composite ad vnc. 1.

Cochiarum	ad scrupulos duos.
-----------	--------------------

De agarico	ad scrupulos duos.
------------	--------------------

Sine quibus	ad scrupulos duos.
-------------	--------------------

Agregatiuarum	ad scrupulos duos.
---------------	--------------------

Hermodaëttilorum	ad scrupulos duos.
------------------	--------------------

Turbit	ad scrupulos duos.
--------	--------------------

De opoponace	ad scrupulos duos.
--------------	--------------------

Euphorbii	ad scrupulos duos.
-----------	--------------------

Serapini	ad scrupulos duos.
----------	--------------------

Benedicte lax.	ad scrupulos duos.
----------------	--------------------

De

Pilule cholere.

De rhubarbaro	a drag. 1. ad drag. duas.
Hiere simp.	a drag. 1. ad drag. duas.
De fumo terre	a drag. 1. ad scrupu. 4.
Aurec	a drag. 1. ad drag. duas.

Stomatice.

Azacorit, elephanginarum, aloes, masticis, hiere cum reub. hiere cum agar. lucis. ad drag. 1.

Tabule.

Diaphenicon	a drag. tribus ad med.
Turbith	a dragm. tribus ad 4.
Tragea	a scrup. 1. ad vnc. med.
Elect. de suc. ros.	a drag. 3. ad vnc. med.

Pilule melancholice.

De fumo terre	ad dragmam vnam.
De lapide lazuli	ad scrupulos duos.
De quinque generibus mirab.	ad drag. 1.

Additio ad doses syruporum.

Syrupus digestius a drag. 5. ad vnc. 2.
 Pro syrupi vnc. vna aquarum vnc. 2.
 Pilule a scrup. vno ad drag. vnam, sine acuitione, vbi vero per gr. acuius addimus a gr. vsq; ad 2. Sed tunc quoque de pilularum pondere docuimus & scribimus a scrup. 2. ad dragmam mediam.
 Boli laxatiui a drag. tribus ad vnc. med.
 Elec. cum aquis a drag. 3. vsque ad drag. 6.
 Conferue ad restaurandos spiritus vitales pro qualibet conferua specierum miscemus specierum scrupu. 2. ad drag. med.

Tabula

TABVLA DOSIVM COMMVNIVM
tam simplicium, quam compositorum
extantium in vsu.

A

A Ceti passulati, Passularum ad acetum sit propor-
tio in decies minor, vt aceti libra vna, passula-
rum dragma vna.

Aceti squillitici	vnc. 3.
Aceti diarrhodon	vnc. 3.
Aceti conditi	vnc. 3.

Acuentium pharmaca in 10. minor vt,

Agarici drag. 1. salis gemme gra. 6.

Agarici decoctionis a drag. 2. ad drag. 5.

Agarici contriti a drag. vna, ad drag. 2.

Aloes lotæ a drag. 2. ad scrupulos 8.

Antidoti hemagogi vncia med.

Aquæ ad iulep proportio sit quadrupla, vel sexdupla.

Aquarum destillatarū, vel decoctis in e syrups vnciæ
6. cum saccharo.

Aquarum cum syrupo vncie tres.

Aquarum pro decoctione solutiuiorum sit vsque ad vn-
cias octo, consumpt. ad medietatem, si ex fructibus,
si ex floribus ad quartam, si ex herbis ad 3. partem.

Aqua sacchari quæ pro potu sit ex vncia vna sacchari
vnc. 2 1. aquæ bulitio sit ad consumptionem tertie
partis.

Aquæ sacchari in confortatione non acuti ab vnc. 2.
sacchari ad libram vnā.

Aquæ compositio, vt med.

Aquæ hordei pro potu in cibo sunt aqu libr. octo, hor-
dei

dei libr. i. post ebullitionem illā proiciatur aqua illa, & suppone secundo lib. aquæ, & decoquatur usque ad cōsumptionē duarum partium, de tribus usque quo ad libr. vnam deueniat.

Aquæ mellis pro potu tantum mellis lib. vna, ad 12. aquæ, decoctio sit ad consumptionem tertię partis.

Hidromellis mellis libr. vna, aquæ libr. octo, ad consumptionem tertię partis, & aromatizetur quandoque cum dragmis duabus pulueribus ligati in peria in libra vna aquæ.

Aquæ calibeate extinctio sit chalibe decies extincto, deinde coletur.

Aquæ simplicis decoctio fieri debet ad consumptionē duarum partium ex tribus ita, vt non remaneat nisi tertia.

Aquæ naturalis potio sit à lib. vna, ad tres.

Aquæ lactis potio sit à drag. 3. ad lib. 3.

Aquæ granatorum cum suis pulpis contritorū ab vnc. quinque, ad vnc. octo.

Aquæ fructum m. ab vnc. 2. ad quatuor.

Aristologię à drag. vna, ad drag. duas.

Aromatici rosati cum melle drag. quinque gariofilati similiter in forma solida dosis est vnc. vna.

Asari infusi dos. a drag. tribus, ad quatuor, contriti vero à drag. 1. ad drag. 2.

B

Balneorum artificialium consumptio sit vnius partis ex quatuor, aut vna de tribus.

Been à dragma media, ad dragmas duas.

Belliricorum infusorum ab aureis 3. ad 6.

Benedicte dosi à drag. tribus, ad vnc. mediam cum vino calido in clystere à vncia vna, usque ad duas.

N

Brodii

Bart. Montag.

Brodii caulium pro lenitione ventri scutella vna.
Brodii galli decrepiti ab vnc. 2. ad libr. 1.

C

Capill. vene. scilicet decoctio in aqua cum aquæ libra vna.

Caput purgiorum succi sit ad aquam proportio subtripla, seu subquadrupla pulueris à drag. vna, ad plus.

Cauteriorum pulueris dosis ad drag. vnam.

Carthami infusi ad drag. quatuor, ad nouem, contriti vero à drag. 1. ad quatuor.

Caricarum in decoctionibus an. 4. ad 8.

Cassia fist. extracta ab vnc. vnam, ad duas, in casu ab vnc. 2. ad 4. Ego tres sumpsi.

Cartartici imperialis, a drag. tribus, vel 5.

Cerotum communiter ordinatur ab vncia vna, ad uncias duas.

Cerotum ex quolibet gummi, mastice, galbano, & huiusmodi cum aceti, vel vini parua quantitate dissoluti fieri potest.

Cerotum stomachale ad formam scuti parui deferendum est supra stomachum per duos, aut tres menses.

Cerotum spleneticum quartanæ, supra pannum album de lana longitudine spithamæ, latitudinis quatuor digitorum sex mensibus continuis deferendum.

Cerotum hepaticum formæ lunaris, latitudinis palmæ.

Cerotum cordiale rotundum ad formam rotulæ mediocris super panno de gran.

Cerotum matricale rotundum magnitudinis nebulae magnæ supra umbilico deferendum sex mensibus.

Cerotum pro sciatica, fit quasi sphericum longitudinis vnius spithamæ, latitudine sex digitorum continue deferendum.

Cero-

- Cerotum capitale ad formam manus super buginata.
Centaureæ dosi à drag. vna, ad duas, in decoctione
ab vnc. vna, vsque ad 4.
Chebulorum infusorum ad drag. 4. ad decem contri-
torum à drag. 2. ad tres.
Ciclamini ab vnc. duabus ad quatuor, & proprie suc-
ci eius.
Citronum conditorum vnc. 3.
Clysterium decoctio ab vnc. quatuor, vsq; ad cyathos
tres, olei vnc. 3. pul. 2. drag. vna. ad drag. duas, ele-
ct. vel sepi. vnc. 1. ad duas salis a drag. vna, ad tres.
Collirium pro oculis ex g. 3. aque cum sief. sine opio,
rutia præparata abl. dra. med. ad plus.
Colochintidis dosi à scrup. vno, ad duos.
Cōfectio in solidis cōmuniter à drag. quatuor ad sex.
Cōfectio anacardina secundum Mesuë ad drag. duas,
secūdm Modernos semidrag. cum vino bis in heb-
domada in hyeme, in estate vero semel.
Cōfectio magistralis in morsellis tanta fructuum,
quanta carniū, & pro qualibet libr. paste libr. vna
sacchari quantum sufficiat.
Cōfectio magistralis in rotulis pro qualibet drag. 1.
specierum, vult sacchari vnc. duas ad minimum, cō-
muniter tamen tres.
Cōfectio vsualis pro vermibus ad drag. tres.
Consolantis ad solutium subdupla pro portio requi-
ritur, vt turbith, drag. 2. zinzib. drag. 1. corrigē-
tium debet esse ad solutiuā proportio equalis ad
subdupla.
Conseruæ violatæ ab vnc. duabus, ad 3.
Cucurbitæ elixæ, seu frixæ expresionis eius cum sac-
cha. ab vnc. 4. ad tres.
Cucumeris asinini à gr. 10. ad 30. cum saccharo cum
N 2 pul.

Bart. Montag.

pul. à dragm. 15. ad 35.

Decoctum eius à drag. 2. ad drag. 4.

Cynoglossæ opiate à drag. med. ad dragmam vnam
ad plus.

Colaturarum decoctio, idest consumptio sit vsque ad
medium, nec transeat libr. vnam simplicium deco-
quendorum vnc. 1.

D

Decoctio caricarum erit nu. quatuor, sebesten nu. 6.
prunorum 7. iuiubarum octo.

Passularum drag. vna, tamarindorum drag. med. pru-
norum de pers. nu. 4. vsque ad 6. Iuiubarū ad octo,
ad decem sebesten a 6. ad 15. Caritæ a 3. ad octo,
passul. ad vnc. vna ad duas tamarindorum ad vncia
vna, ad duas.

Diacalamentum dragma vna.

Diacasix ab vncia vna, ad vncias duas.

Diacodii vnc. 1.

Diacori drag. 6.

Diacurcumæ

drag. tres.

Diacimini in forma solida drag. tribus.

Diacytoni laxat, ad vnc. 4. ad vnc. sex.

Diacytoni cum speciebus vnc. 1. siue vnc. duabus, so-
luti dragm. sex.

Diagalange in elect. drag. 3. in forma solida drag. 6.

Daireos drag. 6.

Dialaisse drag. quatuor.

Diamargarit. drag. med.

Diamoron sic. drag. sex.

Diambre in elect. dragm. 3. in forma solida a drag. 6.
ad vnciam vnam.

Diamarinati drag. duas.

Diamusci in electuariis dulcis drag. duas, sed in forma
solida

De Dosibus.

91

solida	
Dianthos	drag. quatuor.
Diapapaueris	drag. 1.
Diapenidi	drag. 1.
	vnc. duas.
Diaphenicon in elect. ab aureis 3. ad 4. in forma solida a dragm. 6. ad vnc. 1.	
Diaprunis solutiui drag. 6. simp. vnc. 2.	
Diarob descriptum communiter ab vncia media ad dragmas sex.	
Diarob cum agarico a semidrag.	ad drag. 6.
Diarob cum sena ab vnc. med.	ad drag. 6.
Diarob cum turbith	a drag. 2. ad drag. 6.
Diarrhodon abbatis	vnciam vnam.
Diasenæ	a drag. 5. ad dragmas septem.
Diasatyrion Mesue aur. 5. Nic.	drag. 3.
Diadrantum alb.	drag. 1. & rubri file.
Diatrium pipercon cum melle dragm. 2. sed in forma solida	drag. quatuor.
Diaturbith	ab vncia media ad vnam.
Diureticarum decoctionum vnc. 5. cum saccharo lacte sem. communi vnde vnc. 4. succi facilis drag. 3. fortis drag. 2.	

E

Elect. confortatiui ac laxatiui dragm. 1. atque aperit pul. drag. vna.

Elect. elefscoph. ab aureis 2. ad tres in forma solida a dragmis sex ad vnc. vnam.

Elect. lenitiui ab vncia vna ad vnc. duas.

Elect. de sebesthen simp. ab vnc. 1. ad duas.

Elect. per digest. humorum, vnc. med. cum vnciis duabus aquæ appropriatæ.

Elect. de succo ros. a drag. 3. vsque ad 6.

N 3

Elect.

Bart. Montag.

Elect. de sebesthē solutiui à dragmis quatuor, ad dragmas septem.

Elect. de psilio a drag. 2. ad sex.

Elect. de empithimio a drag. 2. ad drag. sex.

Elect. in decoctionibus, vel infusio à dragma vna, ad vnciam mediam.

Elect. de aromatibus vsque ad aureos 3.

Elect. de gemmis aureum vnum cum aqua buglosse, aut vino bono.

Elect. regum drag. vna, vsque ad drag. 2.

Elect. de baccis lauri per os vnc. med. in clystere vn. 2. vnc. vna.

Elect. de forbis

Elect. indum a drag. duabus ad quinque.

Elect. dulcis drag. 1. cum brodio cicerum rub.

Emblicorum infusorum ab aureis 3. ad 6.

Ellebori nigra a scrup. vno ad scrupulos duos, Epatis lupi dragma vna.

Epithemi decoctum ab vncia vna ad tres contriti vero a drag. tribus ad drag. 6.

Epithematum aquarum a libra media ad duas, aceti albi a drag. vna ad vnciam vnam, Croci vel Camphoræ a gr. 4. ad scrup. medium, & vsque ad vnum.

Embrocaturum pro qualibet libr. vna aquæ vini, vel alterius liquoris m. 2. herbæ, vel florum, vel seminū consumptio vero quartæ partis, vel tertiæ, vel mediæ pro communi embroca aquarum libr. 1 1. simp. in 24.

Emplastrorum pulueres confuso modo contritorum, vel radicum contusarum in aqua coctarum cuilibet m. 1. vnc. med. vel pinguedinis requiritur.

Euphorbii a gr. quatuor ad 12. dosis secundū Modernos a gr. tribus, secundum Veteres ad quinq; tantū.

Eupatorii decoctio ab vnc. 4. ad vnc. 6.

Esule

De Dosibus.

92

Esule dicte Asorbram Corticis radicis eiusdē a gr. 8.
vsq; ad 28. Sed lactis eius a gr. quatuor, vsq; ad 12.

F

Ficcum siccarum calefacti pro lenitione ventris do-
sis nu. 6. vel octo.

Fomentationum pro toto corpore situlæ aquæ 6. pro
vno membro 1. herbarum autem vel florum m. 10.
pro qualibet situla consumptio communiter deco-
cti vsque ad tertiam partem aquæ.

Fomentationum ex floribus in decoctionibus pro qua
libet situla aquæ m. 5. vel circiter, consumpt. vero
quartæ partis tantum.

Fricationum modus erit vsque quo rubent membra
quia resoluerē oportet, aut diuertere.

Fumiterræ succus ab vnc. med. ad vncias duas, deco-
ctio ab vnciis decem ad 15.

G

Galbani, vel alterius liquoris vnc. vna pul. vnc. vna,
pro pessariis crassitudo policis cum filo.

Gargarismatum decoctio, & consumptio fit vsque ad
medietatem, nec transeat lib. vnam, simplicium de-
coquendorum dosis fit vnc. vna dulcium cum sub-
scripto mellis, aut sacchari facturum vero cū aquis
sublimatis. Dos aquarum vnc. 3. vel quatuor sy-
rup. vnc. 2. elec. sub quadrupla.

Genistæ seminum ab vnc. vna ad vnc. tres.

H

Hamech elec. dragm. 2. ad aur. 3. montan. a dragmis
quatuor ad drag. 7.

Hermodactylorum a drag. 3. vsque ad 6.

N 4

Harmo-

Bart. Montag.

Harmodactylorum contritorū ab aureo vno ad duos.
Hidromellis mellis libr. vna aquæ libr. octo, consum-
ptio tertiæ partis.

Hiere simplicis Gal. in pil. drag. vna ad 2. confectæ cū
melle ab vnc. med. ad 1.

Hiere picre per os vnc. med. per cly. vnc. 1.

Hiere colocintidos dragm. 2.

Hisopi montani decoctionis ab vnc. octo ad 10. con-
tritæ a drag. tribus ad septem.

I

Indi maioris aurei 3. seu dragm. quinque minoris si-
militer.

Infusionum decoctio, vel cum aqua, cum succo rosa-
rum, vel alio ab vnc. duabus ad quatuor pul. vero
simpli. infundendorum à drag. vna ad tres, ad plus
infusionis ab hora octaua ad 14. Dosis aquæ in in-
fusione vsque ad uncias octo, ad plus consumptio
ad medium.

Ireos a drag. 2. ad dragmas 6. in decoctione, contrit.
vero a drag. 1. ad duas.

Iringiorum conditarum

uncia vna.

Iulep partem vnam, aquarum partes tres vbi confor-
tatione opus est, vbi autem extinctio necessaria est
faciemus iulep partem vnam, aquarum partes sex.
Iulep longum sit quantitas libr. vna, dul. aut vini gra-
natorum quantum de syrupo, vel saccharo aquæ in
syr. sit æqualis.

Iuris galli decrepiti a libra vna ad duas.

Iusquiami in iniunctionibus vsque ad dragmā vnam.

Iustini cum brodio cic. rubr. ad drag. vnam.

Lapidis

L

Lapidis armeni loti a dragm. vna ad 2. non loti a dra.
med. ad drag. 1. vel 2.

Lapidis lazuli præparati a drag. 1. ad duas.

Lauatiuorum siue brodii, siue aquæ hordei, siue mellis
dosis communiter vnc. sex, vel cyathus.

Lætificans almanforis ad dragmas sex.

Lenitiuorum quantitas forma digiti minimi faciendo
mellis ad puluerē proportio dupla fortium vnc. 1.
pulu. dragm. 2.

Litontripon drag. vna cum brodio cicerum rubrorū.

Loch sani vnc. 2. loch de squill. vnc. med.

Loch de pulmone vulpis dragm. sex.

Loch de papauere

vnc. vna.

Lupulorum seu volubilis magni vnc. 4. infusionis in
aqua casei cum libra vna.

M

Mannæ cum aqua hordei, vel endiuix dissolutæ vncijs
duabus.

Masticatoriorum simplicium quantitas auellanæ, cō-
positarum viscosarum ad non viscosa proportio ad
mitius ad sesquialtera. Conuenientius tamen vi-
scosorum partes sunt tres, non viscosorum vna. Et
cum sapa, vel melle viscosa mollescentur, & cum
aromatibus aromatizentur & grauiora sint & non
insuaui.

Mandragoræ in vnctionibus dragm. vna.

Mellis rosati

vnc. tribus.

Mezercon idest cataportia in decoctione a drag. media
ad vnam, pulueris egranis octo ad scrupulum vñ.

Mioletæ a dragmis sex ad vnciam vnam.

Mitridati

dragmis tribus.

Mirabola

Bart. Montag.

Mirabolanorum citrinorum infu. a drag. 5. ad 20. contritorum a drag. duabus ad quinque. Indorum infusorum a drag. quatuor ad decem, contritorum a dragmis duabus ad 4.

Mulæ enæ

dragmis tribus.

O

Opii per os a gran. tribus, ad sex. In colliriis, suppositoriis vsque ad scrupulum vnum, in iniunctionibus vsque ad scrupulos duos.

Opiati cinoglossæ vide in c.

Opoponacis a drag. vna ad dragm. duas.

Oximellis simpl. vnc. tribus, laxatiui a drag. quatuor vsque ad dragm. septem.

P

Papaueris albi vnc. med. syrup. vnc. 1. vel 2. Emulsionis ab vnc. duabus ad vnc. 5.

Passularum pro lenitione ventris ab vncia media, syrupi vnc. vna, vel media.

Penidiarum cum brodio carniū pinguiū pro lenitione ventris vnc. 2.

Pessariū quantitas sit vnc. 3. Crassitudinis pollicis cum filio dosis galbani, vel alterius pulueris ad alias pulueres sit æqualis.

Philonii romani, vel persici a drag. vna ad tres post cibum per vnam horam cum somnū prouocare oportet, quando vero sedare dolorem aut fluxum cohibere exhibendo per 5. horas ante cibum.

Pilulæ de Agarico a drag. 1. ad drag. duas.

Pil. aggregatiue a drag. vna ad drag. duas.

Pil. elephangine a drag. 2. ad dragm. tres.

Pil. arabicæ a dragm. vna ad dragm. duas.

Pil.

- Pil. az aicut a dragm. vna ad dragm. duas.
 Pil. aureæ a dragm. vna ad dragm. duas.
 Pil. anarasi a dragm. vna ad dragm. duas.
 Pil. aureæ alex. a drag. 2. ad drag. quatuor.
 Pil. de bdelio a drag. 2. ad aureos duos.
 Pil. cochie a dragm. vna ad dragm. duas.
 Pil. de euforbio a drag. med. ad drag. vna.
 Pil. de eupatorio ad drag. 2. cum aqua casei.
 Pil. foetide scrupulis duobus.
 Pil. de fumoterre a drag. 1. ad drag. duas.
 Pilulæ de hermodactilis minores & maiores a drag-
 ma vna ad dragmas duas.
 Pil. inde a dragmis 2. ad aureos duos.
 Pil. lapidis lazuli, & lapidis armeni ad dragmas duas
 cum aqua casei.
 Pil. lucis a dragma vna ad dragmas duas.
 Pilulæ de opoponaco a dragma vna ad dragmas duas
 cum aqua sua.
 Pil. mastichine a dragm. vna ad drag. tres.
 Pil. mirthine a drag. vna ad drag. duas.
 Pilulæ de rhabarbaro ad dragmas duas.
 Pil. sarcocollæ a dragm. vna ad drag. duas.
 Pil. de serapino a drag. med. ad drag. vnam.
 Pil. sine quibus a dragm. vna ad drag. duas.
 Pil. stomatice a dragm. vna ad drag. duas.
 Plinii arteticum ad dragmas duas.
 Prifane hordei ad consumptionem tantam vt ad me-
 dium veniat in liquido dandum.
 Polipodii a dragm. duabus ad drag. quatuor.
 Psili a dragma vna ad dragmas tres.
 Pulueris solutiui a scrupulo vno ad dragmā vnā cum
 cyatho medio aquæ hordei, brodi carniū aut vini.
 Pulmonis vulpis dragmis duabus.
 Prnuorum

Bart. Montag.

Prunorum recentium, aut siccarum per noctem infu-
forum in aqua florum violarum pro linimento ven-
tris numero sex.

Prunorum siccarum expressiones cum saccharo adili-
bram vnam.

R

Radices in dectionibus consumuntur ad medietatem.
Rhabarba. contriti a dragma vna ad dragm. quatuor
infusi a dragma vna ad dragm. 10.

Requies nicolai a dragma vna ad dragm. tres.

Rosati electi dragmas quinque secundum mesuem se-
cundum alios dragm. 8.

Rosate nouelle	vnciam vnam.
Rhob de macis	vnciam vnam.
Rhob vini	vncias tres.
Rhob de berberis	vnciam vnam.
Rhob de agresta	vncias duas.
Rubie throciscate	vnciam mediam.

S

Sacchari buglossati ab vncia vna, ad vncias duas.

Sacchari rosati ab vnc. medi. ad vnc. duas.

Sacculorum capitalium specierum medium ingredien-
tium vnc. vna, vel vltra figuræ oblongæ quadran-
gularis non transcendens tamen longitudinem sex
digitorum nec latitudinem quatuor, & sit cum sin-
done de grana.

Sacculus stomachalis simpl. mesuem 8. vel 10. est gr.
vnc. 2. vel 3. figuræ scutalis.

Sacculorum cordialium vnc. vna figura quadrata, aut
ad formam cordis in sindone retorta, cuius longi-
tudo sit digitorum 6. trium latitudo.

Saccularum

Saccularum hepaticarum, ac stomachalium formalarum, ut de cerotis dictum est in litera C

Sape pro quibuslibet vnc. 3. farinæ amili vncis duabus & amigdalorum dulcium recent, sacchari cum aqua florum violarum, vel ros. quantum sufficit.

Salis gemmæ ad aureum vnum.

Sarcocolle a dragm. vna ad dragm. duas.

Scammoneæ seu diagridii a gr. 3. ad 12.

Sene præparate pulvis a drag. 2. ad drag. tres, cum brodio senæ infusæ ab aureis tribus ad vnciam vnam.

Seri caprini in quo sunt infusa precedenti sero, epithimi, vel folliculi senæ dragmas duas, aut salis, dragm. med. ad drag. vnam, colati mannæ scutella vna.

Serpentariæ a dragm. 3. ad dragmas sex.

Serapini 2 dragma med. ad dragm. duas.

Sebelthen solutiui a dragm. 4. ad dragm. septem simplicis vero ab vnc. 1. ad vnc. 2.

Sternutamentorum quantitas sit gr. 1. frumenti humidorum vera pro qualibet vncia vna liquoris sit pulueris scrup. 1. vel dragm. med. tota autem quantitas humidorum non transeat vncias duas.

Stupefacientium non opiatorum quantitas a scrup. 1. ad drag. med. opiatorum vero fermentatorum ab vnc. 1. ad 2. med. pilul.

Syrupi violati dosis ab vnc. 2. ad vnc. 4.

Syrupi acetosi simplicis ab vnc. 2. ad vnc. 4. Et post ipsum duas horas bibatur vnc. quatuor aquæ hordei.

Syrupi communiter dosis est drag. duæ aquarum vero vnc. 4. pro syrupo.

Syrupi magistralis pro quolibet m. 1. herbarum lib. med. mellis despumati, vel sacchari addimus decoctionis, vel succi lib. med. mellis lib. med. vel sacchari ad minus licet sit melius 5. 8. permiscere.

Syrupi

Bart. Montag.

Syrupi de stechade dosiſ ad vnciam vnam.

Stæchados, vel decoctioniſ a vnc. 5. ad 7.

Succi granatorum vnc. 2. cum aliqua prædictarum
aquarum.

Succi roſ. puri ab vnc. 1. cum ſaccharo.

Succi viol. puri ab vnc. 1. ad 2. cum ſaccharo.

Succi violarum ab vncia vna ad vnc. duas.


Succi haboninabilis libr. vna, mellis vel ſacchari cū
libra vna addimus.


Specierum ſyrupos aromatizantium craſſo modo
contritarū, in petia linea ligatarum doſiſ erit vnc.
3. pro lib. ſyrupi, vel iulep.

Sudorum prouocantium decoctioniſ, vel aquæ drag.
5. vini albi vnc. 2. addimus.

Sacchari vnc. 2. electi drag. vna, cum vnciiſ quatuor
aquarum.

Laus Deo.





GVLIELMI
RONDOLETII

DOCTORIS MEDICI
ET MEDICINAE IN

SCHOLA MONSPE-
liensi professoris
regii & Can-
cellarii.

De Ponderibus : siue de iusta quantitate & pro-
portione Medicamentorum.



PATAVII,
Apud Gratosum Perchacium.
M D LXIII.

CAPITA QVAE HOC OPERB
continentur .

QVANTITATEM in medicamentis tam
simplicibus, quàm compositis, esse obser-
uandam.

Cap. 1.

Difficile esse iustam medicamentorum quantitatem
definire.

Cap. 2.

Observatione longa, iustam medicamentorū præscri-
bendorū quātitatē primū distinctā fuisse.

Cap. 3.

Medicamentorum augendorum, vel minuendorum
occasio, vnde petenda.

Cap. 4.

In quibus medicamentis magis religiosè quantitas sit
consideranda, & in quibus minus.

Cap. 5.

Quando in medicamentis iusta proportione compo-
nendis, æqualitas miscendorum, vel inæqualitas
seruari debeat.

Cap. 6.

Quæ quantitate, reliqua medicamenta in compositio-
ne superare debeant.

Cap. 7.

De his quæ minori quantitate, sumēda sunt.

Cap. 8.

Quibus mensuris, mensurarumq; notis hodie passim
medicamenta præscribantur.

Cap. 9.

Qua quantitate radices in quibuscumque remediis for-
mis præscribantur.

Cap. 10.

De dosi herbarū recentium, vel siccarum.

Cap. 11.

De florum necessaria quantitate.

Cap. 12.

De fructuum mensura.

Cap. 13.

De seminum dosi, seu quantitate.

Cap. 14.

De frugibus, siue cerealibus.

Cap. 15.

De leguminibus.

Cap. 16.

De lignis, & corticibus.

Cap. 17.

De cineribus.

Cap. 18.

De dosi animalium, & partium eorum.

Cap. 19.

O 2 De

De sanguine.	Cap. 10.
De vrina.	Cap. 21.
De sero lactis.	Cap. 22.
De lacte.	Cap. 23.
De coagulo, & butyro.	Cap. 24.
De adipe, & seuo.	Cap. 25.
De medulla.	Cap. 26.
De resinis, & picibus.	Cap. 27.
De oleis.	Cap. 28.
De ceræ dosi.	Cap. 29.
De aceto.	Cap. 30.
De saccharo.	Cap. 31.
De mellis quantitate.	Cap. 32.
De sappa.	Cap. 33.
De metallicis & mineralibus.	Cap. 34.
De argento viuo, & sublimato.	Cap. 35.
De lapidibus.	Cap. 36.
De terra.	Cap. 37.
De quantitate laxantium medicamentorū tam simpliciū, quàm compositorum.	Cap. 38.
De dosi pilularum.	Cap. 39.
De sirupis.	Cap. 40.
De oxymelite.	Cap. 41.
De pulueribus.	Cap. 42.
De confectionibus.	Cap. 43.
De trochiscis.	Cap. 44.
De eclegmatis.	Cap. 45.
De clysteribus.	Cap. 46.
De antidotis, colicis, & arteriacis.	Cap. 47.
De simpliciū medicamentorū collocatione.	Cap. 48.
Theriaces descriptio.	Cap. 49.

Gu-

G V L I E L M I 99
RONDOLETTI DE PON-

DERIBVS, SIVE DE IVSTA
QVANTITATE ET PRO-
portione Medicamentorū.

Quantitatem in Medicamentis tam simplicibus
quàm compositis esse obseruandam.

Caput 1.



EDICAMENTA

quæ ad morbos curan-
dos vsurpantur, siue so-
la sint, siue aliis miscen-
da, certa quâtitate vsur-
pari debêt: vt Galenus,
libro primo ad Glau-
conem, docēs in quibus
rebus sit à sit recta cu-
randi ratio, ait hanc &
quantitate, & qualita-
te singulorum medica-

Recta cu-
randi ratio

mentorum perfici, nec non vtendi modo ex temporis
occasione desumpto. Morbi enim non expugnantur
imbecillioribus remediis: sed fortioribus, aut saltem
æqualibus. Remedia autem imbecilliora dicuntur,
vel quæ sua natura efficacia quidem sunt, sed minori
quantitate sumuntur: vel quæ sua natura debilia sunt.
Ea omnino vel à morbo, vel à natura, vel ab utroque
vincuntur: victa autem inutilia esse solent. A mor-
bo vincuntur, quia excrementis permixta, vim suam
amittunt: vel quia morbus, multis numeris, natura su-

Quibus
remedii
morbi
pugnēt
Imbeci-
liora
media.

Victa à
morbo.

O 3 perior

Gulielmi Rondo.

Victa à natura. perior est. A natura autem, cum medicamentum ali-
 menti naturam habeat, vel familiaritatem cum assu-
 mentis corpore: vel huius indoles talis est, vt non ni-
 si multa vi possit moueri. Quod autem excrementa
**Excreme-
ntis mixta
medica-
menta.
Sinapi.
Minima
quantitas.** vires medicamentorum minuant, hoc euidentissimè
 apparet in sinapi, quod quanquam acre sit, & extrinse-
 cus appositum vesicatorium, intus tamen assumptum
 id non efficit, extinctum larga humiditate excremen-
 torum ventriculi. Et quemadmodum millesima pars
 vnius scintillæ ignis non vrit: neque item minima me-
 dicamentorum quantitas, corpus nostrum potest affi-
 cere. Quod eo minus mirum esse debet, cum etiã
**Deleteria
uantitas.
Canthari-
les.** deleteria aliqua, minori quantitate assumpta corpus
 nostrum non lædant. Hoc in cantharidibus videre est,
 quæ parua quantitate assumptæ, aliisque medicamen-
 tis permixtæ, vrinam mouent citra aliquã noxã. Illud
 verò apparet in compositis medicamentis efficacibus,
 vt in medicamentis laxantibus, & alexiteriis: quæ nisi
 iusta quantitate assumantur, vtilitatem corpori nullã
 præstant. Maior autem quantitas, vel nimium alte-
 rando, vel nimium repente, aut supra modum euacuan-
 do, aut abstringendo, aut relaxando, corpus nostrum
 lædit. Quod sola quantitate fieri certum est, eo ma-
 gis: quod medicamentorum quædam, ratione solum
**Maiores
uantitas.** suæ quantitatæ esse venenosa constet, vt opium, man-
 dragoram, hyoscyamum, cicutam, succum lactuæ:
**Venenosa
uantitate.
Uccus la-
tucæ.** qui non minus corpus nostrum lædere potest, magna
 quantitate assumptus, quàm reliqua frigida. Erit igitur
**Observan-
ti quanti-
tas.** utile medicamenta neque minori, neque maiori
 quantitate vsurpare: cum hac leuiore morbos curã-
 do grauiore inducat, ac pene deleteria sit illa noxa
 non careat. Sed certam & iustam eorum quantita-
 tem obseruabimus: vt tutæ, citæ, & probæ, suscepto-
 rum

rum morborum curationis fiamus compotes.

Difficile esse iustam medicamentorum quanti-
tatem definire. Cap. 2.

CV M aliqua sint medicamenta, quæ non nisi ma-
gna quâtitate assumpta prodesse possint: ut quæ
leuiter laxant, & quædam quæ non nisi parua quanti-
tate danda sint: ob eorum insignem laxandi vim, vel
cafaciendi, vel refrigerandi: quædam vero medio mo-
do se habeant. Difficillimum est proinde, medicamē-
torum quantitatem, vel modum, in tanta medicamen-
torum varietate, & corporum dissimilitudine, tamq; **Vnde di-**
varia ætatum, tempestatum, regionum, locorum, mor **cultas qu-**
borum, & humorum euacuandorum ratione, diffini- **titatis.**
re. Non enim ex equo omnia medicamenta opus suū **Medica**
peragunt: cum casia, manna, tamarindi, pruna, poly **mētorum**
podium quercinum non nisi magna copia laxent. Con- **dissimili**
tra diagridium, colocinthis, veratrum vtrunque, tur- **tudo.**
bith, elaterium pauca, quamplurimum. Castoreum,
euphorbium, piper, & quæ ad tertium, & quartum vs-
que gradum calefaciunt, vel minima quâtitate id pos-
sunt. Neque si refrigerare volueris, maiori opus erit
opii, vel mandragoræ, vel hioscyami, vel cuiuslibet nar-
cotici, cuiuscunque deniq; quod quartum gradum fri-
gidi attigerit. Sed rhabarbarum, agaricus, senna, &
quæ ad secundum & tertium gradum calefaciunt, vel
refrigerant, siccant, vel humectant (quandoquidem
moderatè corpus laceffunt) mediocri quantitate re-
cipiuntur. Talis autem varietas est, quæ ratione as-
sumendorum difficultatem incredibilem parit. Quâ
non minorem percipiet, qui quàm multiplex sit assu-
mentium conditio, considerauerit. Primum enim ca-
O 4 d m

Gulielmi Rondo.

diuersitas
assumen-
tium.
 dem non est in omnibus hominibus corporis constitu-
 tio, & temperatura. Alia enim facile à quouis medi-
 camento immutantur, alia autem difficilimè: Nam
 inter homines sunt, qui solo odore medicamentorum
 laxantium, ad excretionem excitantur: alii autem, ne
 magna quantitate quidem mouentur. Præterea æta-
 tis, & tempestatis diuersitas, facit, vt idem homo ea-
 dem quantitate, & eodem medicamento Vere, Aestate,
 Autumno, & Hieme, puer, iuuenis, vir, senex pa-
 riter non moueatur. Quòd etiam regionum, & lo-
 corum dissimilitudo inæqualitatem remediorum po-
 scat, apparet: Nam qui in regione Australi degunt,
 mitiori medicamento, & minori quantitate mouentur:
 quàm qui in Septentrionali. Et ne longius exempla
 petamus: Rutenenses non dragmis, sed vncijs medi-
 camentorum fortium purgantur. Hoc idem accidit
 Hispanis apud Perpinianum: quòd septentrionalibus
 ventis assiduè perflentur. Monspeffuli dragmæ duæ,
 vel dragmæ tres electuarii de succo rosarum suffiuiūt.
 Auenionenses medio modo se habent inter nos, & Ru-
 renenses. Parisienses, ob regionis humiditatem, aluum
 ferè semper lubricam habent: proinde minori quanti-
 tate medicamenti, vel mitioribus purgandi sunt. Cæ-
 terùm ad eandem difficultatem trahemur, vbi ad mor-
 bi, vel symptomatum naturam considerandam perue-
 nerimus. Apoplectici enim, & phrenetici, quibusque
 sensus sunt sopiti, vel mens laborat ob sensum in illis
 præsentem interceptionem, in his autem occupatio-
 nem nimiam, irritationem à medicamentis factam nõ
 sentiunt, cumque ob id, sphincteres à sua constrictio-
 ne non cessent: fit inde vt vel nullo modo, vel cum dif-
 ficultate possint euacuari. Purgatio contra facilis in
 his qui quolibet alui profluuiò laborant, conspicitur.
 Deni-

Denique non minor forsàn, quàm in præcedentibus, se dorù apti
 se offeret difficultas cùm humorum euacuandorum tudo.
 aptitudo fuerit nobis discernenda. Facile enim eua-
 cuantur humores tenues: vt serosi, quiq̃ue præterea
 acres: vt Bilis, tũ qui in ventriculo, intestinis, & primis
 venis sunt, & iam commoti. Difficillimè autem cras-
 si, vt melancholia, lenti, vt piritia viscida, nec non qui
 in vltimis venis, quæ circa habitum corporis sunt, &
 conquiescunt. Quare rectè dictum fuit antiquis, dif-
 ficillimum esse quantitatem medicamentorum præscri- Antiquo-
 bere: sed hoc situm esse in artificiosa coniectura, vnde rù opinio.
 prudentiores Medici hac in parte, aliis sunt futuri ex-
 cellentiores.

Observatione longa, iustam medicamentorum
 præscribendorum quantitatem, primũ di-
 stinctam fuisse. Cap. 3.

Observatio & experientia multa nobis declarant,
 quæ ratio ostendere non potest. Quis enim ra-
 tione inuenire potuisset vnquam, quæ medicamenta
 pituitam purgarent, quæ bilem, quæ melancholiam, τῶν ἀνεί-
 quæ aquas, aut quæ venenosa essent, aut quæ venenis τῶν ἐνέ-
 antipathia quadã aduersarentur? Nullus certe. Imo tio.
 sola experientia, longoq̃ue tempore à maioribus, ta-
 lia primũ fuerunt comprobata, vt medicamentorũ
 iusta quantitas, observatione, dehinc artificiosa con-
 iectura, cognita. Nam cùm aliqua non purgare in mi-
 nori quantitate, experti fuissent veteres, maximam
 quantitatem, ausi sunt dare: in quibusdam verò aliis, Quanti-
 ex mediocri quantitate super purgationem euenisse tis, &
 intuitu, proinde maximam quantitatem exhibere, po-
 stea cauerunt semper. Collegieruntq̃ue inde, quæ nã
 medi-

Gulielmi Rondo.

Scammonium.
Cassia.

medicamentorum quantitas neque maior, neque minor iusto, pro præsenti negotio, Medicis necessario foret usurpanda. Nec ullus est tam exercitatus, qui possit aliam rationem reddere, cur scamonii vnciam vnā: vt fit de cassia, non demus. Cassiæ autem grana duo, vel tria, vt scammonii, in laxando aluo non præscribamus: nisi quòd experientia perspicuum sit cassiam leuiter purgare, scammonium autem non nisi vehementer id facere.

Medicamentorum augendorum, vel minuendorum occasio vnde petenda. Cap. 4.

Experientia & rō.

Vnde certe medicamentorum doses.

Opus sagacis Medici.

Vnde particulares doses colligendæ.

Quæ experientia tradidit, ratio auxit, & confirmauit, vt in quantitate medicamentorum videre licet. Nam posteaquam maiores nostri obseruatione didicerunt, medicamenta certa quantitate laxare, vel aliud agere, singulorum medicamentorum dosim tradiderunt, vt aliquid certi de ea haberent studiosi, minimam, & maximam indicantes. Vt cum dicunt, rhabbari dosim esse à scrupulo vno ad vnciam vnā: hoc præcepto doceant, minorem quantitatem scrupulo vno inutilem, maiorem vero vncia vna, periculosam. Relinquentes à scrupulo vno ad vnciam vnā, multas, & intermedias dosium differentias, quas sagax Medicus peruestigando, in ea inuenienda quantitate, quæ unicuique foret comoda, suum opus haberet situm. Sed quo facilius id perficeret, eam ex peculiari natura ægrotantis, victu præcedente, locorū, & anni aerisq; constitutione, & ætatem, & sexus, & consuetudinum ratione, & ex humorum euacuandorum natura, locoque in quo collecti sunt, vel regione per quam educendi, morbiq; & symptomatum proprietate, viribus assu-

assumentis, & medicamentorum, esse colligendam docuerunt. Sed quia hæc clarius in medicamentis laxantibus apparent, ob id ab iis petamus exemplum. Primum peculiaris ægri natura considerata, facilis ne sit, an difficilis ad euacuationes, docebit, ut si facilis fuerit dragma semis, si difficilis, dragma una, vel duæ exhibeantur. Quare si Medicus ægrum non noverit, eum interrogare debet, quomodo se habeat ad euacuationes, & pharmacopolam qui medicamenta solet illi propinare, ut quantitatem medicamenti dandi, naturæ ipsius consuetam edoceat. Quam postea prudens Medicus augebit, vel minuet, habita ratione eorum quæ superius dicta sunt. Victus ratio quæ præcescit, recrementorum quantitatem, vel qualitatem manifestè docet. Qui enim tenui victu, & exquisito utuntur, paucis recrementis abundant, qui verò pleno, multis redundare solent, qui plenissimo, quàm plurimis. Quare minorem, in eo qui inedia usus est; maiorem autem in eo, qui multo plenior luxu, medicamentorum quantitatem adhibebit, ut medicamentorum proportio respondeat humoribus euacuandis. Qui non exquisito victu utuntur, sed citra delectum quibuscumque vescuntur, alia atque alia quantitate purgandi sunt. Nam qui fructibus astringentibus, vel alimenti fumo, vel sale siccatis, & crassis, vel aqua pluvia pro potu utuntur, ventris partes magis cōstrictas habent, & humores minus fluxiles, quam obrem erit medicamenti quantitas in talibus augenda. Et è contra, iis qui fructibus laxantibus, aut humidis, aut tenuibus, aut acris, aut amaris, & facultatem expultricem proritantibus utuntur, dosi medicamentorum minuenda. Regionū, locorumque natura, communē habet cum anni, aerisque constitutione observationem. Quo fit

Peculiaris
ægri natu
ra.

Victus ra
tio præce
dens.

Regionū
locorūque

Gulielmi Rondo.

natura, an
te aerisq;
cōstitutio

fit vt vno theoremate dicamus, loca frigida, anniq;
& aeris constitutionem frigidam, vel siccam augen-
dam medicamentorum quantitatem docere, vt minuen-
da contraria constitutio suadet. In siccioribus & fri-
gidioribus enim, humores minus mouentur, & in alto
delitescunt, & conquiescunt. In calidis vero, & hu-
midis facilius mouentur, quia calor facit ad meatuum
relaxationem & humorum motum, humiditas ad fa-
ciliorem fluxum, frigus ad constrictionem, & quietem,
siccitas ad pertinaciam. Et quo certius medicamen-
torum laxantium quantitatem, in omnibus locis, inue-
stigare possimus. Sentio non negligendam consuetu-
dinem eorum, qui in iis medicinam facere consueuerunt,
quæ ex eorum præscriptis in Pharmacopolarum offi-
cinis, sciri poterit. Vel interrogandi sunt Medici ipsi
(quod mihi accidit in Hispania) faciendum. Quæ re-
gio cum sicca sit, eius incolæ difficillimè mouentur ad
excretionem, præcipuè plebæ, potissimumque apud
Perpinianum, quo in loco medicamenta laxantia præ-
scribuntur, vt apud Rutenenses. Hac cautela, præter
eam quæ communis est toti regioni, etiam hominum,
qui in ea habitant, peculiarem naturam faciliè edoceri
poteris. Aetatem considerandam in deligenda medi-
camenti quantitate, etiam habemus necessario. Cùm
puerilis ætas ob humiditatem faciliè diarrhœa, aut alio
ventris fluxu corripiatur, & ob eupathiam, siue molli-
tiem faciliè robur dissoluatur, quare paruum quantita-
tem medicamentorum purgantium desiderat. Iuue-
nilis verò, cùm ob robur tum ob copiam recremento-
rum, maiorem. Senes, quibus, tempore iuuentutis
adstricta fuit aluus, & senescentibus humida est, quia
faciliè diarrhœa vt pueri corripiuntur, & ob virium im-
becillitatem eadem cum pueris quantitate euacuandi
sunt.

Actas.

sunt. Quibus vero alius adstricta est in senectute, maiori quantitate sollicitandi sunt, ut & ætate consistentes. Sexus nonnihil facit, nam mulieres, cum sint humidiore, minori quantitate medicamenti mouentur, quam viri, idem & in eunuchis spectandum, ut potè qui naturam virilem deponentes, muliebremque induentes humidi redduntur prorsus. Denique quicunque multa humiditate scatent, ut balbi, ita facile à medicamentis patiuntur, ut pauca copia illis sit satis. Consuetudo etiã longa, medicamenta familiariora reddit, ob id quantitas eorum augenda, vel fortioribus medicamentis additis vel eorum vehementiam augmentibus admiscenda. Tantam enim vim habet consuetudo, ut quæ etiam venenosa sunt alimenta plerunque reddantur, quod videre licet in puella aconito educata: quandoquidem solent minus afficere quæ consue-
ta sunt. Humor qui euacuandus est, maiorem quantitatem vel minorem docet exhibendam, ut si pituita tenuis euacuanda sit, sufficiat agarici dragma vna, nisi in partibus multum remotis posita sit. Ad Pituitæ vero viscidæ, & crassæ purgationem, dragma vna & semis, vel duæ sumendæ erunt, additis granis aliquot zingiberis, vel salis gemmæ, vel castorei. Ad Bilis autem euacuationem, minor quantitas requiritur, quam ad Pituitæ, vel ad melancholiæ: humoris enim coctio, & præparatio minorem quantitatem medicamenti postulat, ob euacuandi facilitatem. Cruda uerò si euacuanda sint, maiorem. solent enim difficilius euacuationem pati ob crassitiem, & visciditatem. A loco in quo humor collectus est augendæ vel minuendæ medicamentorum dosis indicatio suscipitur. Nam si in ventriculo, vel intestinis, vel primis venis humor qui euacuandus est, collectus fuerit, dragma vna agarici
suffi-

Sexus.

Eunuchi.

Balbi.

Consuetudo.

Puella aconito educata.

Humor euacuandus

Locus collecti humoris.

Gulielmi Rondo.

Regio per
quam edu-
cendus hu-
mor.

Azorum.

Præsens
robur.

Imbecil-
litas.

Facultas
expultrix
sopita.

Roboris
medica-
mentorū
perquisi-
tio.

Simpliciū

sufficiet, quæ quantitas non sufficeret, si à capite, vel thorace, vel articulis, aut carne, remotioribus denique venis, vtpotè quæ adcutim sunt, euacuandus esset. Si vomitione materia educenda sit, minori quâtitate sollicitanda est facultas expultrix, quàm si per ventrem, vel vrinas. Quod in azaro videre est. Azari enim radices, vel seminis scrupulus exhibitus in aqua calida, vomitionem excitat, dragmæ duæ ventri è laxant, si tenuissimè terantur, dragmæ tres vrinam mouebūt, si dragmæ quatuor, menses, si dragmæ sex per inferiorem, & superiorem, ellebori modo purgabunt. Præsens virium robur medicamentum dandū maiori quantitate, suadet. Imbecillitas verò, de quantitate ipsius nos detrahere, cogit. Facultas expultrix sopita magni momenti est, ad quantitatem medicamentorum determinandā, vt in apoplexia, caro, lethargo, & aliis soporiferis affectibus experimur, in quibus maxima quantitas medicamenti parum euacuat, quemadmodum etiam in phrenitide, & aliis morbis, in quibus mens occupata est, & excrementa sursum trahuntur. Hactenus persecuti sumus indicationes sumendæ medicamentorum quantitatis, quæ tantum ab ægro, vel ipsius circumstantis habetur. Superest vt præsens caput absoluamus in ea peruestiganda, quæ à medicamentis, eorumque viribus sumitur, vt minorem fortium maiorem autem debiliū quantitatem præscribamus. Virium autem perquisitio optimè fiet, si, cum medicamentorum alia simplicia, alia composita sint, simplicia ita considerauerimus, vt præter naturam quam habent à sua specie, verbi gratia, quod hoc vel illud scammonium, vel rhabarbarum sit, vel senna, etiam loco vnde erunt progenita, aliquid tribuamus. Orientalia enim omnia maiorem habere vim nemini est dubium,
nec

nec non ætas est animaduertenda, cùm ætate secundum aliquas qualitates augeantur, secundum alias diminutionem patiantur, vel prorsus earum iacturam. Hoc manifestissime apparet in cassia recenti, quæ ob suam largam humiditatem mediocri quantitate superpurgationem facit, antiqua verò corpus alit, & minime ventrem mouet. Non minus in oleo, quod vetustate acrimoniam acquirit, & siccandi vim, relaxandi autem amittit. Lachrymæ recentes emolliunt, antiquæ vini emolliendi perdunt, digerendi acquirunt + Semina frigida maiora, & amygdala recentia refrigerant, & humectant, vetusta calefaciunt, & siccant. Castoreum, thapsia, balsamum, post duos annos, vim suam amittunt. Compositorum verò ratio, in componendi modo, simpliciumque ex quibus componuntur, iam explicata conditione, tota est sita, nec non ætate. Theriacam enim sciunt omnes, annis amittere vim increfandi, siccandi verò, & calefaciendi acquirere efficacitatem. Ergo, ut vires medicamentorum præparatorum in officinis, perspicui possint. Pharmacopolarum & doctrina, & probitas est cognoscenda. Solent enim alii melius, alii deterius præparare medicamenta, alii alia medicamenti præparatione, alii melioribus medicamentis uti consueuerunt. Ob id & descriptiones medicamentorum, & simplicia quibus utuntur, Medicus diligenter animaduertere debet. Nam & in quibusdam compositionibus, ut Catholico, & syrupo rosato laxatiuo scammonii, vel diagridii partem aliquam addunt, cùm ut aliorum simplicium imbecillitatem, prauamque compositionis præparationem tegant, cum suis medicamentis fucum quendam addant.

Compositorum.

Præparatorum in officinis.

In

Gulielmi Rondo.

In quibus medicamentis magis religiose quantitas sit
consideranda, & in quibus minus Cap. 5.

Medicamenta omnia, quæ nostrum corpus affice-
re possunt insigniter, postulant sui quantitatem
religiosius exhiberi, in aliis ea minus est consideran-
da. Cum autem medicamenta omnia primo sese no-
bis offerant, vel tanquam interna vel tanquam exter-
na, quia hæc minus periculi habent, ideo quod iam di-
dictum est, citra ampliorem explicationem, hac in par-
te, satis esse poterit. Sed cum nullum sit internorum,
in quo assumendo de vita agi non videatur, ea de cau-
sa, attentionis in his multo plus requiretur. Non ta-
men quod internorum una appellatio, unicam quanti-
tatem postulet, imò noua se se offert hic denuo facien-
da distinctio, ut quæ ventrem laxant immoderatè, do-
sim permittunt paucissimam. ventrem enim agitādo,
vel nimium laxando vires deiciunt, ob id eorum quā-
titas maior est vitanda. In iis verò quæ minus laxant,
vel constringendo, vel leniendo, vel trahendo, minus
accuratè quantitas est obseruāda. Porro in Antidotis,
& Arteriis, & Collicis, quia hæc omnia opium re-
cipiunt, potissimum cum recentia sunt, minorem co-
piam recipere est necessarium. In iisdem composi-
tionibus antiquis, minus periculosa maior quantitas
erit. Antidota, quia mediam naturam habent inter
nos & venena, plus, quàm reliqua, habent periculi.
Theriaca. Quam ob causam, theriacam pueris dare, prudenter
Galenus prohibuit. Quod si danda foret, certè à scru-
pulo semis, ad scrupulum vnum tantum esset præscri-
benda. Idque in valde senibus non minus est obser-
uandum, cum non minus, in his, periculosa sint recen-
tia, medicamenta parata ex opio, quàm in pueris, quia
cum

cum parum calidi innati habeant, facile extinguitur magna eorum medicamentorum quantitate. Item medicamenta omnia, quæ ad quartum gradum vel calefaciunt, vel refrigerant, minori quantitate sunt usurpanda ob insignem eorum vim agendi. Religiosè etiã quantitas venit obseruãda, eorum quæ valde cara, aut foetida, denique quibus sapor, vel odor est ingratus. In mitioribus autem remediis, & imbecillioribus, familiaritatemque habentibus cum corpore, & ventriculo gratis, minus religiosè exhibebitur. Nos, ob eã causam, in hoc libro, rudi vt aiunt minerua, quantitatem simplicium, & compositorum medicamentorum docebimus, & miscibilium, quam debent habere ad inuicem proportionem, pro remediorum formis, & scopis. Nam exquisitius doceri non fas est, ob corporum, & affectuum maximam differentiam.

Quando in medicamentis iusta proportione componendis, æqualitas miscendorum, vel inæqualitas seruari debeat. Cap. 6.

Medicamenta, quæ in vsum veniunt, rarò sola, & per se usurpantur, sed aliquibus permiscentur, vel vt conseruentur, vel vt commodius exhibeantur, vel quæ periculosa sunt, tutius administrètur, vel quæ parum efficacia sunt, efficaciora fiant, vel quæ ingrata sunt magis grata reddantur lingnæ, palato, ventriculo, vel ad certam formam medicamentorum reducantur. Sed quia aliquando quæ commiscentur similia sunt, & ex æquo affectui, causæ, & symptomati aduersantur, & pariter corpori, & parti, conueniunt, & materia apta est formæ inducendæ, tunc in eadem proportionem, & mensuram æquali definiuntur, & è contra,

Ad quartum gradum agentis.

Cara. Foetida. Mitiora.

Præsenti opusculi argumētum.

Quare permiscantur medicamenta.

Æquali quantitate miscenda. Inæqualitate miscenda.

P si da.

Gulielmi Rondo.

si qua istarum conditionum desit, non æquali mensu-
 ra, vel pōdere permiscetur, illudque factum est in cō-
 positione Basiliconis. Quæ recipit ceræ, picis, resinæ,
 adipis tauri, vel eius loco olei æquales partes. Hæc
 simplicia, quia ex æquo suppurationem iuuant, ob id
 æquali pondere permixta fuerunt. Adde quòd hæc
 compositio nullam materiam desiderat, vel ad con-
 seruationem, vel ad formam inducendam, sunt enim
 ex eorū numero, quæ facillè non putrescunt, quia pin-
 guia, & viscosa sunt, & ipsa formam vnguenti liquata
 simul constituunt, addique solent vnguentis, vel em-
 plastris ad inspissationem, & ad vnguenti, vel empla-
 stri formam inducendam. Euenit aliquando, vt me-
 dicamenta, ob æqualem efficacitatem simpliū ex qui-
 bus componuntur, ex æquis debereht constare quidē
 partibus, sed quia amara, aut alio modo ingrata sunt,
 ad dulcorem inducendum, vel mel, vel zaccharum,
 vel sappam, vel aliquid aliud tale desiderant, maiori-
 que copia, licet nihil, vel parum ad effectum sint pro-
 futura aliquando. Vt in Theriaca diateffaron euiden-
 tissime apparet, quæ recipit gentianæ, baccarum lau-
 ri, myrrhæ, aristolochiæ rotundæ, singulorum vncias
 duas, mellis vero libras duas. Sunt enim amara &
 ingrata valde omnia, proinde ad dulcedinem his in-
 ducendam, mel in maiori quantitate est positum, tum
 etiam vt oppiatæ, vel confectionis formam induceret.
 Quod si eorum quæ in compositionem ingrediuntur,
 vnum, vel plura morbo, omnium reliquorum maximè
 conueniant, ea quantò sunt conuentiora, tanto maio-
 rem sui quantitatem dabunt. Vt videre est in compo-
 sitione Philonii, in qua opium, castoreum, & reliqua
 quæ ipsum perficiunt, quia dissimilia sunt, nec ex æquo
 conuenire possunt, non æquali quantitate recipiuntur.

Pi-

De ponde. medic. 106

Piperis enī, & hyosciami antæ dragmę viginti ponuntur, cum opii dragmæ decem, croci dragmæ quinque, spicæ, pyretri, euphorbii ante dragma vna, addantur tantum.

Quæ quantitate reliqua medicamenta in compositione superare debeant. Cap. 7.

Igitur, cum medicamentorum, alia quantitate superent, alia sint inferiora in compositionibus, de illis primum agemus. Dicemusque id fieri, vel qua ratione formam dant, & vice materiæ sunt toti medicamento, vel præter id etiam affectui, & præcipue ad eum expellendum actioni, vel etiam tantum morbo, aut præsentis morbi occasione potissimum apta sunt, vel eorum vis nulla, vel pauca est, nisi sub grandiori mole. Ergo hoc commune & vniuersale præceptum erit in omnibus remediorum formis parandis, ut quæ materiæ naturam referunt, & formam medicamenti inducunt, vel ad conseruationem reliquorum adhibentur, quantitate reliqua, vel singula, vel omnia simul, superent, ut saccharum, & mel in sirupis, electuariis, confectionibus, oleum, & cera in vnguentis, lithargyrium verò, pix, resina in emplastris. Aloë in pilulis. Præterea, si quæ sint à quibus, præterquam quod materiæ vices gerunt, potissimū dependeat operatio (quod studiosè in multis compositionibus obseruatū fuit) ea quantò pluribus de causis etunt conuenientiora, tanto maiori quantitate reliquis potiora erunt, ut in compositione Hieræ picæ videre est, quæ recipit azari, cinamomi, croci, spicæ nardi, mastichis, Xyobalsami ante dragmas sex aloes dragmas centum. Ceterum si quod sit à quo tota agendi vis pèdeat, & quo

Causa maioris quantitatis.

Præceptum

Materia dantia & vim.

Hieræ picæ.

Præcipuum totius compositionis.

P 2 in

Gulielmi Rondo.

positionis in scopum potissimum collimemus, reliqua verò tan-
 medica -- tum vel ad verò tantum vel ad incisionem, vel ad te-
 numentum . nuationem, vel ad deterfionem, vel corroborationem
 ventriculi posita sint, illud iure optimo primas, tunc
 temporis, etiam ratione quantitatis, obtinebit. Quod
 in præcedenti Hieræ picæ exemplo videri potuit, si
 quis opus dandæ formæ medicamento nō spectet, quia
 à sola aloë tota purgandi vis penderet, ipsa copia lon-
 gè reliqua superauit. Idem contingit, eademque ra-
 tione, in Hieræ colocynthidos, reliquis enim medica-
 mentis, quanta aptitudine præstantior, tanto pondere
 iis est superior colocynthis. Recipiuntur enim hic me-
 dullæ colocynthidos mollis vnciæ sedecim, chamæ-
 pytheos vnciæ sex, florum iunci odorati, vel radicum,
 vel caulium vnciæ tres, cassiæ, cinamomi, spicæ nardi,
 myrrhæ añ. vnciæ quatuor, croci exagia septem, opo-
 panacis vnciæ tres piperis longi, & nigri añ. vnciæ
 tres, marrubii, stechados añ. vnciæ septem, gentia-
 næ agarici añ. vnciæ quinque, sagapeni vncia vna,
 mellis quod sufficit ad excipiendum, & dulcorandum.
 Talis descriptio reperitur apud Galenū libro de para-
 tu facilibus, in qua compositione, colocynthidos vn-
 ciæ sedecim recipiuntur, cū aliorum medicamento-
 rum pondus maximum sit tantum vnciarū sex. Quod
 si à pluribus medicamentis depēdeat actio, ea pondus
 minus necessariorū, suo vincere debent. Secundū hanc
 rationem agaricus, turbith, colocynthis, carthamus
 in remediis ad pituitam purgandam superant ea, quæ
 alios humores purgare possunt, vt in biliosis scammo-
 nium, & rhabbarbū, in melancholicis thymus & epi-
 thimus, & hoc ita simpliciter pronūciamus, quatenus
 ad vnum tantum humore euacuandum medicamentū
 Quando aliquod paratur, vel præscribitur. Nā si plures humo-
 res

Hieræ co-
 locynthi-
 dos.

Quando
 plura in
 cōpositio-
 ne excel-
 lunt vi.

Quando
 plura in
 cōpositio-
 ne excel-
 lunt vi.

res sunt euacuandi, animaduerrere oportet qui illorū plures hu-
magis coctus sit, aut qui sit in viis ductuum, etiā si co- mores sū
ctus non sit, euacuationi denique paratior, aut qui ma euacuādi
gis vrgeat, in eoq; casu nos maiorem copiam eius me-
dicamenti quod talem humorē euacuat, non neglectis
aliis humoribus minus vrgentibus, vel paratis minus
ad excretionem, ponimus. Humores enim simul per- Humore
mixti non facile ab vno medicamento trahuntur. Hoc permixti
in febribus compositis, & spuris consueuimus facere:
vt cum tertiana spuria curanda est, agarico, & rhabar-
baro vtimur, maiorem tamen rhabarbari copiam, quam
agarici, quia bilis citius coquitur, & quia magis vrget
sua tenuitate, & caliditate, in prima euacuatione po-
nimus. In declinatione verò plus agarici, quam rha-
barbari. Rhabarbarum infusum intelligo, cui maio-
rem quantitatem incidentium, & attenuantium vt ci-
namomi, & spicæ adiungimus in principio propter ob-
structiones, quæ tunc maiores sunt quam in declina-
tione. In compositis verò febribus, & in quibus bi-
lis peccat, ea magis euacuanda est, & primò. Pituita
autem quia lenta, & viscida tardius concoquitur, &
proinde postremò euacuāda. Porro superant reliqua Imbecil-
medicamenta quantitate, quæ sub magna mole vires lia.
habet imbecilliores, quales sunt oēs ferè flores, & oīa
medicamēta rēperata, sed hoc faciēdū est, si forma me
dicamēti nō prohibeat. Nā pilularū forma, sub parua Pilula:
mole, vires fortiores continere debet, ne molestum sit
ægrotañti pilulas tā multas deuorare. Quare flores, Flores.
neq; alia medicamēta imbecilliora poni debēt in pilu-
lis, quia si imagna quātitate ponātur, molē medicamē-
ti augēdo, vires eiusdē minuent, vnde dosim pilularū
cogeremur augere, quod ægrotañtibus esset admodū
molestum. Fructus idem faciunt in pilulis, proinde Fructus.
P 3 in

Gulielmi Rondo.

Quæ pri-
mum ordi-
nem dein-
ceps se-
quuntur in
præscrip-
tis. in eis non sunt ponendi. Id similiter de aliis formis
remediorum intelligendum est. Verum hæc hætenus
de iis quæ in medicamentis compositis primas tenere
debent. Sed non est prætermittendum, reliquorum
ne aliqua sint, in quibus ordo, post primum locum, etiã
fit obseruandus, vt aliis secundas, aliis tertias, & ita
deinceps dare oporteat, ad quod satis erit addidisse,
vt si præter scopũ purgandi præcipuũ, detergẽdum &
incidendum sit maiorem tamen incisionẽ requirat af-
fectio, incidentia tunc detergentia superent, contra
autem fiat, si magis detergendum sit, vt semper ad id
quod magis vrget, scopum nostrũ dirigamus, non ne-
glecto tamen eo quod minus vrget, vel sine quo aliud
fieri non potest, vel minus bene fit.

De his quæ minori quantitate sumenda sunt.

Cap. 8.

Minori autem quantitate sumuntur omnia medi-
camenta, quæ vel ingrata, vel nimium cara ob
raritatem, vel nimium efficacia sunt, vel aliquid vene-
ni habent, vel tantum præcipuorum medicamentorũ
actionem aut castigant nimiam, aut ope egentẽ iuuat.
Ingrata. Ingrata autem esse possunt, vel ob odorem, vel ob sa-
porem, vel ob consistentiam. In internis itaque reme-
diis, hæc quidem essent fugienda: sed si, ob eorũ usum
necessarium, quandoq; sint vsurpanda pauca, eadem-
que castigata in compositionem debent iniici. Talia
Fœtida. autem sunt, ratione odoris, quæ fœtidum spirant, vt
assa fœtida, castoreum, galbanum, opoponax, euphor-
biũ, sagapenũ, & aliæ lacrymæ acres. Ex herbis, fabi-
na, ruta domestica, & agrestis, pulegium, mentastrũ,
anagyris. Sapore autem ingrata sunt, quæ acria, ama-
ra,

ra, nitrosa, vel acida existunt. Acria, ut euphorbium, Acria.
 thapsia, pirethrum, synapi. Amara, ut colocinthis, Amara.
 succus absinthii. Nitrosa, ut nitrum. Acida ut succus Acida.
 limonum, omphacium, acetum. A consistentia ingra Ingrata
 ra sunt viscus, & viscosa omnia, item pinguia, q̄ ven- cōsistētia
 triculum subuertant. Rara, & quæ magno pretio ven Rara.
 duntur, ut moscus, ambra, ciueta, balsamum. Hæc
 omnia in quantitate parua poni debent, cum ob rari-
 tatem, & pretiositatem, tum ob odorem insignem, ob
 quem in aliquibus affectibus, & in nonnullis homini-
 bus fugienda sunt, ut quæ caput feriunt, & mulieribus
 afferant vteri præcipationem. Nimum efficacia, Nimum
 quod immoderatè corpus nostrum immutent, vel alio efficacia
 modo afficiant, qualia sunt ea quæ ad quartum vsque
 gradum vel calefaciunt, vel refrigerant, aut prorsus
 vitanda, aut parcius assumenda. Idem venit facien-
 dum in iis, quæ tota substantia corpori nostro aduer- venenosa
 santur, ut venenosa qualis est caro viperarum, scorio
 num, cantharidum, & pleraque alia. Mineraliū qui- Minerali-
 dem aliqua sunt, quæ, & tota substantia, & agendi vi
 immoderata periculum creant, eiusmodi est lapis cya
 neus, qui ventrem supra modum laxat, & crustas exci-
 tat, vitreolum sua vehementi acrimonia erodit, alumē
 immodicè adstringit, sulphur vero nimium exsiccat,
 itaque præcedentium normam subibunt. Quæ porro Castigan-
 ad castigationem malignorum medicamentorum ad- tia.
 hibentur, paucam tantum sui copiam permittunt, ut
 castoreum opio adiunctum non æquali proportionē
 poni debet, si ad castigationem opii tantum admitta-
 tur. Quod si ex æquo conueniant affectui, ut si mate-
 ria attenuanda, & dolor sedandus, pro partis etiam
 natura, æquali mensura commiscentur, sed in parua
 tantum quantitate, ob eorum insignem vim. Quod
 P 4 quidem

Gulielmi Rondo.

Colicus quidem in colico affectu ob materiæ frigiditatem, ad
Effectus. flatuum verò, discursionem, & sensum obtundendum
Castoreū obseruari solet. Id in vehementissimis quoque aurium
in aurium doloribus faciendum, in quibus, ob sensum auditus,
doloribus castoreum confert quam plurimum. Idem de croco,
& myrrha sentiendum est, quando ad castigationem
Croci. opii adduntur, crocus in iis affectibus, in quibus & cō
Myrrhæ. coquere, & somnum conciliare oportet, myrrha verò
aperien- ubi detergere, vt in vlceribus renum, & vesicæ. Ape-
ria & de- rientia autem & deducenia minori quantitate, quàm
ducentia. alia quæ deducuntur poni debent, nisi ex æquo affectui
vel corpori, cum reliquis conuenirent. Sunt verò de-
ducentia medicamenta, quæ vim medicamenti purgā-
tis, sua partium tenuitate, ad renes, vel vesicam vel iun-
cturas, deducunt. Ad iuncturas quidem, vt hermoda-
ctyli, semen rutæ, radix penthaphyli. Cientiæ vrinas
as. etiam commodissimè interdum medicamenti laxan-
tibus admiscuntur, sed non pari mensura, atque si ad
propriū opus, hoc est ad mouendas vrinas destina-
rentur. Purgationem enim potius alioqui minuerent,
humoris motum reuocando ad renes. Quod si dedu-
centia simul centium aliqua sint, quæ vim aliquam purgandi, præ-
terquam deducendi, habeant, ea largiori quantitate, si
purgan- imbecillius euacuantibus misceantur, quam quæ sim-
plicem deducendi vim obtinent vsurpabuntur. Id in
hermoda- hermodactylis videre est, qui creduntur deducere vim
tyli. medicamenti ad iuncturas, simul & ab iis educendi hu-
mores vim habere, quod tamen non facit semen rutæ
operatio agrestis, aut domesticæ, aut radix penthaphyli. Idem
in facili iudicium esto de facilitantibus operationem, vt zingi-
ber, & sal gemmæ, agarici, & turbith operationem
faciliorem præstant, faciunt enim vt pituita crassa cele-
rius faciliusque trahatur, & purgetur: Zingiber quidē
atte-

attenuando, & incidendo, citra reficcationem magnā. Sal autem gemmæ attenuando, incidendo, & facultatem expultricem irritando, Pituitosorum medicamentorum operationem augent, & accelerant, sed semper maior quantitas salis gemmæ, quam zingiberis, dum multum euacuare volumus, apponenda, ob id zingiber à granis tribus, ad grana sex in pituitosis medicamentis. Sal gemmæ verò à granis sex, ad scrupulum vnum, pro dragma vna agarici admiscetur: In turbitis verò sufficit scrupulus semis zingiberis, vel salis gemmæ. In colocynthide verò grana tria, quia ista Colocynthis. duo sua nimia acrimonia dysenteriam excitare solent, quòd idem facit sal gemmæ. Proinde potius in lacte infunduntur, vel mucilagini gummi tragacanthi, vel mucilagini psyllii, vt eorum tenuitas crassitie mucuginis castigetur. Castoreum etiam supradictis pituitosis additur eadem proportionem. Rhabarbarum iuuatur, aut potius castigatur, cum de obstructione metus est, spica nardi, cinamomo, schœnantho, spica celtica, aliisque aperientibus, & odoratis additis. Quorum omnium eadem mensura non est. Cinamomum enim propter odoris, & saporis gratiā Cinamomum. quam habet, in maiori quantitate imponi potest, videlicet pro dragma vna rhabbari, cinamomi à granis, tribus ad scrupulum semis. Cassia siue cinamomum Cassia siue cinamomum crassum minus laudatur in castigando rhabbaro, ad strictionis enim cuiusdam est particeps & paucam in attenuando vim habet. Spicæ, cuius parum suavis & gratus est odor, vsus negligendus esse videtur, vel ad grana sex tantum assumenda pro dragma vna rhabbari, adeo enim molestus & ingratus eius odor est, vt nauseam faciat, & vomitionem excitet. Spica porrò Celtica, schœnanthum propter maiorem partium

Gulielmi Rondo.

partium tenuitatem, in parua portione poni debent, quo fit vt à granis tribus, ad grana quatuor tantū, pro dragma rhabarbari recipiuntur. Si enim maior eorū quantitas admitteretur, vrinas prouocando, & ad renes ab intestinis deriuando materiā, sua tenuitate partium, vt antea dictum est, purgationem impedirent, potius, quam iuuarent. Augenda est igitur horum quantitas, pro tempore morbi quo dantur, & pro natura ægrotantium, & morborum. Quod si ob medicorum male receptam & inueteratam opinionē, quæ si omnino rescindi nequit, vt minus tamen mali post se trahat ad curandum, vel consuetudinem ægrotantis, Rhabarbarum in principio febrium intermittentium propinare necesse sit, plus cinamomi tunc quam in declinatione infusioni adhibebitur, vel si ante vsum syruporum aperientium obstructions detur, maior quantitas exhibebitur. Aegri quinetiam constitutio, siue natura quæ venas angustas habet, maiorem portionem cinamomi monet admiscendam, vt & morbus qui cum obstructione est, vel scirrhus, vel cum tumore frigido, aut denique cum bilis crassa, pituitæ permixta, euacuanda erit. Si verò morbus cum defluxione sit, vel cum sanguinis reiectione, aut cinamomo prorsus abstinere, aut exiguam eius portionem assumere satius erit, propterea quòd cinamomum & fluxiones excitat, & fluxum sanguinis, in eoque casu magis laudatur vsus spicæ nardi, quæ fluxum compescendi vim habere deprehenditur.

Quibus mensuris, mensurarumq; notis hodie passim
medicamenta præscribantur. Cap. 9.

Quomo- **A**Ntequam ad singulorum medicamentorum se-
do circum cundum

De ponde. medic.

110

cundum genera doses veniamus, operæ pretium mihi scribatur
facturus videor, si prius mensuras, mensurarumque medica-
notas, quibus passim utimur in præscribendis medica-
mentis, in tyronum gratiam, breuiter perstrinxero. doses.
Sciendum igitur est simplicium, & compositorum me-
dicamentorum quantitatem circumscribi, vel ponde-
re vel numero, vel mensura. Pondere ut Libra, Quar-
tario, Vncia, Dragma, Scrupulo, Grano. Quæ tali se-
fe habent ad inuicem ratione, ut Libra, quatuor quar-
taria contineat: Quartarium tres uncias: Vncia octo
dragmas: Dragma tres scrupulos: Scrupulus grana
viginti quatuor apud omnes antiquos, & probatos au-
thores. Hodie tamen inualuit apud Pharmacopœos
pertinacia, quam à suo Nicolao contraxerunt, ut in vi-
ginti grana tantum diuidant scrupulum. Sed de his
exactius hoc loco dicere non est animo, cum hic sco-
pus sit tantum docere iuuenem Medicum, ita suas præ-
scriptiones facere, ut aptè, & commodè à Pharmaco-
pœis intelligi possint, & confici. Characteres com-
munes, quibus passim ista pondera breuitatis gratia,
notantur, tales sunt.

Pondus.

Characteres
responde-
rum.

Libra	lib.	Dragma	3
Quartarium	4.	Scrupulus	3
Vncia	5	Granum	Gr.

Ergo si vnum tantum istorum ponderum velimus, po-
nimus lib. 1. 4. 1. vnc. 1. drag. 1. scrup. 1. gr. 1. si dimi-
diam partem tantum, primum notam ponendo eius
quod volumus, semis deinde, quod hac nota sem. signi-
ficabimus, subiungendo, exprimemus, ut lib. sem. Idq;
in omnibus erit facere, præterquam grano, quod om-
nium sit minimum, sui que diuisionem non patiatur. Si
quis plura velit, notam ponendo eius ponderis cuius
opus habet, subiungit 1. ser. vel. 2. vel 3. vel 4. vel 5.
vel

Gulielmi Rondo.

Latinorū
 numeri.
 Ciphra.

vel 6. & ita deinceps. Satiūque existimo, his prisco-
 rum latinorum numeris vti, quā ea quam Ciphram
 vulgo appellamus, quæ ab Arabibus creditur cum hu-
 iusmodi characteribus ad nos peruenisse. Ratio au-
 tem hæc ad id me mouet, quòd duo sint characteres
 ponderum, qui figura cum duobus illorum cōueniant,
 quartarii videlicet, & dragmæ. Vnde error creari
 posset, vt si quis scribere vellet quartaria tria, in hunc
 modum 4. 3. vel dragmas duas, in hunc 3. 2. quadra-
 ginta tria, & triginta duo alter scripta existimare pos-
 set, si distinctio in medio prætermitteretur, quod inter
 scribendum nimium frequenter accideret. Præterea
 est notandum, esse obseruatu dignum, vt commodissi-
 mē omnia scribantur, vt si 4. 2. velimus, potius per
 lib. sem. exprimamus, si drag. 4. potius per vnc. sem. si
 scrup. i. sem. potius per drag. sem. quantum fieri po-
 terit, maiorum ponderum notis pro denominatore
 vtentes, tantoque numeratorem minuentes, quanto
 denominator erit factus superior. Quòd si sese of-
 ferret aliquando necessitas, libra vna, sumere & drag.
 quatuor mallet ad vnum denominatorum reducere,
 diuidendo maiorem per numerum rationis, quam ip-
 sum habet ad minorem, id quod superest addendo, vt
 libra dragmas 96. valet, præterea quatuor erant, quæ
 additæ dragma C. perficiunt. Quod Galenus fe-
 cit in compositione Hieræ picæ, in qua ponit aloë
 dragma C. Certum est tamen, aliquando apud anti-
 quos legi, vt apud Paulum, Dosim alicuius medica-
 menti, cum duplici denominatore, & recentiorum,
 apud Nicolaum frequentissimè. Sed scito, id factum
 esse, dum ob nimiam molem medicamentum aliquod
 secundum haberent, tunc enim se aliquando offere-
 bat facienda, Dosim alicuius, talis diuisio, quam deinde

Comodè
 scribenda
 esse om-
 nia.

Ad vnum
 denomi-
 natorem
 omnia esse
 reducenda.

Antiquos
 vno deno-
 minatore
 non sem-
 per esse
 vsos.

De ponde. medic.

III

de ad vnam denominationem non reduxerunt, vel ne-
 gligentia, vel quòd ob paruitatem minoris deno-
 minatoris, esset futurus immensus numerator magni
 denominatoris, si is diuideretur. Melius autem fe-
 cerunt illi antiquorum, qui non istis notis, sed ipsis Bonus an-
 tiquorum
 nominibus sunt vsi. Quos si imitaremur, forsitan me-
 lius, & tutius cum ægris ageretur. Sed ne ninium mos i præ-
 superstitiosi videamur, communem morem seque-
 mur, diligenter animaduertentes, ne quid incom-
 modi per incuriam, detur. Numero item metimur, Numerus
 ab vnitatem ad mille vsque, vel vltra progredien-
 tes, scribendo Nu. 1. vel 2. vel 3. vel paria sic no- Paria.
 tantes 1. 2. vel 3. vel 4. & sic vtrouique dein-
 cept. Mensuram verò (quanquam commune no- Mensura
 men sit omnibus mensuris, ponderibus, numeris,
 & liquidorum, & solidorum) pro vna tamen tan-
 tum forma metiendi, quæ deinde, pro ratione in-
 strumenti quo metimur, sui diuisionem patitur. dum
 vel plicato brachio, vel plena manu, vel in digitos
 acuminata sumitur, separatim vsurpamus. Maxi- Fascicu-
 mam mensuram Fasciculum appellamus, quam bra- lus.
 chio altero complicato metimur. Secundam quan-
 titatem, quæ fit quantum manus capere potest, ma-
 nipulum vocamus, quam hac nota M. exprimimus. Manipu-
 Minorem Pugillum nominamus, quæ fit digitis si- lus.
 mul in extremitate compressis, nota eius est P. Quæ Pugillus.
 ante dicta sunt de numeratoribus in ponderibus, huc
 recuocentur, vt si his dimidiatis vti velimus, vel mul-
 tiplicatis, commodè, & scienter id facere possimus.
 M. enim 1. vel 1. se. vel 2. scribimus. De Fasciculo, &
 pugillo idem intellige. Non mihi videtur, in numero
 mensurarium prætermittenda Mica, quo genere mēsu Mica.
 ra vsus est Galenus libro de Antidotis, cū in antidoto
 Pro-

Gulielmi Rondo.

χόνδρος.
 Prophylactico Apollonii ficibus, nucibus, & foliis
 rate χόνδρος hoc est Micam salis adhibendam di-
 cit. legitur & λιβάνα χόνδρος hoc est thuris Mica;
 apud Dioscoridem, & Galenum. Ita ut inde pateat,
 hanc mensuram usurpatam in rebus, quæ solent faci-
 lè in particulas æquales Grano friari, unde etiam vul-
 gus per Granum exprimere solet, dicendo granum sa-
 lis, vel thuris, & re vera respondent melius significa-
 tioni χόνδρος quod granum significat. Sed ne confu-
 sio sequeretur cum ea mensura, quæ pondere peditur,
 & granum appellatur, Micam verterunt Latini, quæ
μικὰ. propriè μικὰ Græcis dicitur, sed ferè usurpant in plu-
 rali, cum medicamenta præscribunt, ut ad reliqua re-
 cipienda, dicent, μετὰ μικῶν cum Micis panis, hoc
 est multa Mica friata, à minuatum enim frangendo, μικὰ
 est Græcis μικὰ & μικίων dicitur, verum apud
 Latinos, etiam in singulari numero, vel Mica vna, vel
 id quod præter crustam est quòd minuatum frangi pos-
 sit, significari potest, Sed facilè est videre, ubi hoc, vel
 Liquidò - fit, significari potest, Sed facilè est videre, ubi hoc, vel
 rum men- illo modo usurpetur. Præterea licet olim liquida pro
 sura. prium metiendi modum haberent, Libram quam men-
 Libra mē suralem appellamus, quæ secundum tres dimensiones
 suralis. metitur, quæ in suas partes èt, Sextaria videlicet, Cya-
 thos Cochlearia diuiditur, certo èt numero ab aliis cō-
 tinetur: tamen quia fuit semper multa varietas, & ho-
Libra pō die est in eo Libræ genere, ponderalem Libram malu-
deralis. mus usurpare, ad maiorem certitudinem. Liquida er-
Quæ pon go mensurabuntur libris ponderalibus, & vnciis, raro
dere men dragmis, nisi medicamenta sint nobilissima, ut balsa-
surentur. mi succus, aqua angelorum vulgo dicta, & fella in col-
Quæ nu- lyriis & aliis formis, in quibus talia vix drag. sem. ex-
mero. cedunt. Interdum etiam minimam illam quantitatem
 guttis exprimimus vna, vel duabus, aut tribus, aut cō-
 muniter

De ponde. medic.

112

munitur hac formula loquendi utimur aceti, vel olei, vel vini parum. Libris, vel Libræ partibus mensurantur herbæ, & radices siccæ, flores, semina, succi, lacrymæ, cortices, metallica, & alia quæcunque supradictorum, aliis etiam mensuris possunt mensurari. Numero verò fructus, & potissimum legumina maiora, ut fabas, cicera etiam aliquando, metiri possumus. Fasciculis herbas recentes damus, ut in balneis. Manipuli etiam herbarum, & radicum recentium. Pugilli vero florum, cerealium, & leguminum præscribuntur. Igitur medicamentorum potissimum interiorum, non solum nomen sed & certam quantitatem designamus, ægro exhibendam, nisi tantum alicui compositioni forma danda fuerit. Tunc enim plerumque, quia res subvisum cadit, iudicio Pharmacopolæ permittimus quanta Pharmacopœi iudicio relinquenda quantitas.

Qua quantitate radices in quibuslibet remediorum formis præscribantur. Cap. 10.

Vnus cuiusque medicamenti quantitas, qua ipsum mensurari debeat, cognoscenda, quæ varia est pro diuersitate formarum quæ dantur remediis, temporis, scopi, vel quantitatis totius compositionis. A radicibus autem ordiemur, quæ in balneis, Libris, vel manipulis multis mesurantur. Quod si vna tantum imponatur radix, ea in maxima quantitate ponetur, si lux eiusdem facultatis, dimidiam partem supradictæ quantitatis miscemus, ut duæ simul iunctæ æquipolent quantitati vnus. Quod in omnibus medicamentis

In balneis

Gulielmi Rondo.

In clisteri
bus.

Quanda
plura re-
media ex
vna deco-
ctione e-
runt faciē-
da.

Materia
clisterum
quādo au-
genda.

Nota.

ris facultate similibus, & ex æquo conuenientibus af-
fectui, obseruandum, vt antea diximus. Quando in
clysteribus vsurpantur radices, si pro vno clistere pa-
retur decoctio 4. 1. radicum liliorum, altææ, vel emol-
lientium aliarum, vnc. 2. autem detergentium, vel ape-
rientium sufficient, quando morbus talia medicamen-
ta desiderat. Quod si plures clisteres ex eadem deco-
ctione parandi sunt, vel clister, forus, irrigationes, en-
cathismata, & balneum, dosis augenda erit, pro ratio-
ne multitudinis, & quantitatis remediorum, quæ vna
necessaria sunt, & præscribuntur. Hoc vsu venit in
colico dolore curando, & nephritico leniendo, & cal-
culo deturbando, in quibus ex eadem decoctione, &
fotus, & clisteres, & cataplasmata parantur. Vt in do-
lore lateris, eadem decoctio clisteris in vase æneo, vel
vesica lateri apponitur. Materiam autem clisterum
augemus, quando ex decoctionis residentia cataplas-
mata parare volumus. Sed cum tales decoctiones pa-
ramus multos vsus, animaduertendum est, vt ea adii-
ciantur, quæ dum vni scopo, & formæ remedii conue-
niant, alteri non aduersentur. Vt si laboranti dolo-
re lateris paretur clister, ex relaxantibus herbis, & ma-
lacticis, & discutientibus flatus, parandus erit, citra
violarum, vel seminum frigidorum maiorum additio-
nem, aut eorum quæ nimium acria sunt, vt mercuria-
lis, ne hæc nimium trahendo fluxionem irritent, illa
verò repellendo, cordi, & pulmonibus periculū suf-
focationis creent. Igitur talia non iniiciuntur, licet
alioqui alui mouendæ ratione, aut febris, aut renum
conuenirent. Sed quæ emolliunt vt malua, bismal-
ua, vel semina quæ flatus discutiunt vt semen anisi, fœ-
niculi, & quæ dolorem soluant discutiendo, & digerē-
do, vt semen lini, fœnugræci, semen maluæ, bismaluæ,
flores

De ponde. medic. 113

flores chamomeli, meliloti. Hic autem clister parandus erit, vt docebitur Libro de formis remediorum internorum. In syrupis, vel apozematis, radices ponantur ab vnc. 1. ad vnc. 2. vel vnc. 3. si pro multis dosibus paratur remedium, si pro vna dosi, à drag. 3. ad vnc. sem. vel vnc. 1. magis vel minus pro radicum natura, & viribus. Sunt enim quædã laxantes, siue purgantes, aliæ detergentes, vel aperientes, vel adstringentes, vel rarefacientes, vel refrigerantes, vel aliud aliquid efficientes: quæ omnes diuersa quantitate petuntur, pro diuersitate virium, scopi, & forma remediorum, vt radices apii, petroselini, graminis, asparagi, & aliæ aperientes obstructions. Si ex his syrupi parentur ad aperiendas obstructions, cum vna tantum usurpabitur, & pro multis dosibus ad vnc. 2. apponentur: si pro vna dosi, sufficiet vnc. sem. Si duæ vel plures usurpentur, fiat idem quod dictum est in principio capitis, cū de radicibus ad balnea fieret mentio. Quod si in syrupo purgante, ad faciliorem educationem crassorum humorum, egedem ponantur vnc. sem. ad summum vnus, vel duarum radicum simul sufficiet. Nā hæc omnes, vt & reliqua attenuantia, & incidētia, si in maiori quantitate ponantur, humores tenues, & serosos à ventre ad renes deducendo, & deriuando, alui subductionem minuunt. Nam quemadmodum mictio noctu plurima facta, deiectionem minorem per aluū facit: sic cientia vrinas, fluxus ventris deriuant, & medicamentorum actiones eludunt. Quare grauiter peccant qui in maiori quantitate, vel maceratas in vino albo, vel aceto syrupis laxantibus admiscent. In thoracis affectibus vnc. 1. sufficit. In obstructionibus renū, vel vesicæ, & in remediis prouocantibus sudores, vn. 2. vel vnc. 2. apponere possumus. Detergentes verò radices

In syrupis
& apoze-
matis.

Aperien-
tes.

Aperien-
tes in syru-
po purgā-
te.

Mictio no-
cturna plu-
rima.

Detergen-
tes.

Q in

Gulielmi Rondo.

in syrupis pectoralibus, & in medicamentis renum, &
 vesicæ, si sine vlcere, vel inflammatione sint ad vnc. 2.
 vel 3. possunt poni, si vlcus sit, vel inflammatio, vel san-
 guinis grumus in renibus, vel vesica, in quantitate mi-
 nori, vt ad vnc. sem. est enim necesse crassos succos vri-
 nam retinentes, vel sanguinem concretum, vel pus, me-
 dicamentis leuiter detergentibus à parte tollere, &
 vrinam retentam prouocare. Detergentes radices in
 cientibus vrinam, & medicamentis purgantibus, me-
 diocri quantitate poni possunt, quia vtramque opera-
 tionem iuuant. Purgantes radices, hoc si mediocriter
 faciant, ab vnc. 1. ad lib. sem. in magnis compositioni-
 bus vsurpari possunt, in minoribus autem ab vnc. sem.
 ad vnc. 1. nec minus vnc. sem. alioqui inefficax esset re-
 medium, & ventriculum læderet. Tale est polypo-
 dium quercinum quod purgat, & adstringit, quare le-
 uiter decoquendum, ne nimia coctione facultas aërea,
 in qua est laxandi vis, deperdatur, & ponendum in suf-
 ficienti quantitate. Quæ verò fortissime purgant, vt
 turbith, bryonia, si per se; hoc est nullis additis aliis
 laxantibus, & in paruis compositionibus, vt in deco-
 ctionibus laxatiuis, & syrupis quæ ad vnam dosim dan-
 tur, à drag. 1. ad drag. 2. in magnis multarumque do-
 sum, à drag. 3. ad vnc. sem. aut vnc. 1. Quod si hæc,
 vel alia purgantia qualiacunque sint in substantia den-
 tar, quia ipsa magis corpus offendit, quam infusum,
 vel decoctum, ea ratione, tunc minori quantitate assu-
 mi debent. Turbith igitur, si detur in substantia, suffi-
 cit drag. sem. in infusione autem quæ quantitatis er-
 go, media est inter decoctionem, & administrationem
 eam quæ fit in substantia, drag. 1. idque paruis compo-
 sitionibus, in magnis ἀνάλογον. Cum rhabarbarum
 duplici substantia constet, terrea videlicet, & aërea,

in hac autē purgandi vim sitam habeat, in illa restrin-
gendi, rectē fecerunt veteres, qui arte eas conati sunt
separare, ut eam plurimam haberent, cuius egerent.
ope, eam autem quæ esset futura incommoda, si non
tollerent prorsus, saltem minorem multò facerent.
Quidam tamen Medicus nostræ ætatis, alioqui certē
doctus, & de literis bene meritus, paralogismo cona-
tus est ostendere, rhabarbarum in substantia, ut vulgo
dicitur, hoc est nulla ipsius parte diminut, aerea vide-
licet, aut terrea, multo efficacius fore ad purgandum,
quàm si infusum exhiberetur, agens ex hypothesi, quā
à Galeno mutuatur ex libro de Theriaca ad pisonem.
medicamenta purgantia à tota substantia purgent, cō-
stat rhabarbarum purgare, à tota igitur sui substantia
soluit. Sed quæ à tota substantia operantur, maius
opus efficiunt, ubi plus substantiæ, quàm ubi minus.
Atqui in toto rhabarbaro, longè plus substantiæ, quàm
in eius diluto inest, cum in hoc solum pars tenuis, &
aerea, in illo præter hanc, & terrea quoque insit, erit
itaque & plus virium in soluendo, plus itaque rhabar-
barum tota sua substantia exhibitum, quam eius dilu-
tum, mouebit, quod erat probandum. Probandum
equidem certē fuerat, sed vide quam parum probarit,
& in hac ratiocinatione sibi imposuerit, ex eo quod
rhabarbarum purget à tota substantia, quod apud Ga-
lenum est determinatum sibi humorem cum delectu à
proprietate occulta, vel à similitudine substantiæ pur-
gare, vel ut Mesues locutus est à coelesti quadam fa-
cultate, concludens, si omnes ipsius partes seruentur
quas simul iuncta (ut iam dixi) vulgus appellat totam
substantiam, ipsum ad actionem illam, quæ ab occul-
ta vi dependet, fore robustius, & commodius. Sed
non vidit ille diuersitatem significationis, & quomo-
do

plici sub-
stantia cō-
flare.

Rhabar-
barum in
substantia
minus pur-
gare quā
infusum.

Quid e-
purgare
tota sub-
stantia.

Gulielmi Rondo.

I
b
Quæ pars
adstringat
n & quæ pur
get in rha
barbaro .
Rhabarba
doses.
 do talis vis non sit sita in omnibus simul partibus Hoc
 enim si esset, ut ad vnam talem actionem vna conspira
 rent, aliam actionem diuersam non producerent pri
 mò & per se. Actiones enim diuersæ, quæ primo
 & per se fiunt ab vno medicamento, à diuersitate
 partium oriuntur. Sed sita est talis vis in ea parte quæ
 & ratione, & experientia ad talem actionem cernitur
 melius nata. Rhabarbaro tribuitur facultas purgan
 di, & adstringendi, astrictio nonne debetur terreæ por
 tioni, purgatio magis violentæ, hoc est succulentæ, &
 aëreæ, cum in hac plus sit caloris, qui occultam dele
 ctus facultatem iuuat, & efficaciorē facit, contra
 terreā seigniorē, & inertiorē. Et certè me ista ta
 cente experientia hætenus est satis comprobatum.
 Non quòd dicam expresse succo adstrictionem deper
 di prorsus, & residentiæ expressiōis purgandi vim,
 sed eas admodum paucas retineri, idque tantum, quia
 quæ simul primæ conformationis, & incrementi com
 munis vinculo iuncta sunt, nunquam ita exactè sui se
 parationem patiuntur, quin vnum perpetuo retineat
 aliquid de ingenio, & indole alterius. Vnde mihi vi
 detur eum verisimilius potuisse argumētari, si dixisset
 in substantia magis purgare, quia nunquam ita po
 test exprimi succus, quin perpetuo aliquid remaneat
 in residentia, cuius absentia vim laxandi minuit. Sed
 neque hoc satis fuisset firmum, quandoquidem eius
 præsentia, non tantum utilitatē præstare posset, quan
 tum impedimentum seignities, & obstructio difficul
 tasque penetrandi, quæ à terreā portione aduehere
 tur, præterquam quòd multa fieret astrictio, qua non
 est opus in omnibus morbis, imò plerunque valde no
 xia est. Rhabarbari igitur doses, pro diuersitate mo
 di exhibendi, cuius indicatio sumetur à commodita
te

te præfenti, tales constituemus. Primum si opus sit leuiter purgare, simul & constringere, in substantia dabitur à scrup. 1. ad drag. 2. Quidam voluerunt à drag. 2. ad drag. 4. sed talem quantitatem non probo, ob molestiam saporis & odoris, & periculum. Nam si vsquam in substantia exhibendum sit, hoc est faciendum in morbis, qui sunt cum fluxu ventris disenterico, vel diarrhæa, sed in talibus, etiam tanta quantitas est periculosa, ob facultatem laxandi, quam habet, præter adstrictionem, paucamque familiaritatem quam habent cum corpore nostro, omnia medicamenta purgantia, & malitiâ quæ maior est, & pertinacior in portione terrea. Et si quis bene consultum velit ægro, satius ducet rhabarbarum diu infusum, & valde expressum exhibere: sic enim longa infusione diminuetur laxandi vis, & expressione forti terrei plus assumetur ad constringendum, sed mitioris & minus molesti, & maliciosi, satisque erit dare à drag. se. ad drag. 1. Si quâ plurimū adstringendū sit, & nihil vel parū laxandum, vstulatū dabitur à scrup. 1. ad scrup. 4. quæ tamē propter empirema, mihi minus arridet, mallēque reiecta priori decoctione, denuo & diu coquere, & tale exihere. Iōga enim coctione absimitur laxandi vis, præterquam quod id quod est magis tenue, & purgans, priori decoctione extractum abiicitur. Si quis ad bilis purgationē in febribus det, quia hic est fugienda adstrictio, minus infusum, & leuiter expressum dabit à drag. se. ad drag. 2. vel drag. 3. nec sine ratione hic tanta exhibetur quantitas, quia parum succi ob leuem expressionē trahitur, ne forsan quicquid est trahendo, vna terrei aliquid, & adstringentis sequatur. Verum si per tempus non liceat infundere, leui decoctione perficietur id, quod lōga infusione opus haberet. Si quis rhabarbarum sy-

Q 3

rupo,

Gulielmi Rondo.

rupe, vel alii decoctioni addat ad laxandum, in pulve-
 rem redactum in decoctionem feruentem iniiciet, vel
 in clarificatione apponet ligatum in linteo, frequen-
 ter exprimendo, vel in syrupo iam perfecto etiam li-
 gatum suspendet, & cum vsus requiret, exprimet, non
 autem coquet, quia eius substantia laxans facile deper-
 deretur ob tenuitatem. Quod autem tenue sit, osten-
 dit magnus ille odor quem habet. Quod si ad con-
 stringendum adhibeatur, poterit coqui vnâ, quantitas
 autem erit à drag. sem. ad drag. 2. vel plures, pro quan-
 titate dosium ad quas parabitur compositio. Radices
 amaræ recentes vt helenium à drag. 1. ad vnc. 1. acci-
 piuntur, siccæ verò à drag. sem. ad vnc. sem. Iridis
 radix si recens, & ad purgationem ponatur, à drag. 2.
 ad vnc. 1. si sicca ad expectorationē, vel alias affectio-
 nes à scrup. 1. ad drag. 2. vel drag. 3. vt in eclegmaris,
 & in antidotis. Nullius aristolochiæ radix, neq; item
 gentianæ, neque alia amara in internis remediis ob
 amarorem, nisi raro vsurpantur, in antidotis, vel pil-
 lulis idque tantum, atque in minori quantitate, vt si per
 se sumantur, & in substantia, & pro vna dosi à scrup. 1.
 ad scrup. 2. cum multo melle, & saccharo, vel aliquo
 syrupo dulci, in decoctione vero à drag. sem. ad drag.
 2. vel drag. 3. hoc de omnibus amaris, & odoratis est
 intelligendum. Valerianæ radix, cyperi, galangæ ma-
 ioris, & minoris, zedoariæ, zingiberis, ben albi, & ru-
 bri, & daronici in antidotis, & magnis compositioni-
 bus, in pulueribus cordialibus, pectoralibus, & aliis
 remediis internis à scrup. 1. ad scrup. 4. vel drag. 1. se.
 in externis vero à drag. sem. ad vnc. ponuntur. Cyclami-
 nis radix recens vim habet purgandi, & vomitum
 prouocandi, quare in parua quantitate est sumenda, vt
 ad drag. 1. sicca autem ad drag. 3. vrinas, & sudores
 mouet.

I
b

Radices
amaræ.

Radix

Cyclami-
nis radix.

mouet. Azari radix vomitum excitat, vrinas mouet, Azari ra-
 ventrem purgat, si ad drag. 6. assumatur ex aqua mul- dix.
 sa, menses & sudores similiter mouet, sed quia elle-
 bori modo purgat, satius est minorem quantitatem
 præscribere, vt capite 4. ostensum est. In vnguentis
 ad aluum subducendam & tumores lienis minuendos
 ab vnc. sem. ad vnc. 2. poni poterit. Omnia medica-
 menta, quæ in decoctione iniiciuntur, maiori quantita-
 te ponenda sunt, media quantitate, quando infundun-
 tur, in substantia vel alio modo vsurpata, minima quã-
 titate. Radices acres omnes, mordentes, vel deter- Radices
 gentes, vel digerentes vt cucumeris agrestis, serpen- acres mor-
 tariæ, iari, asphodeli, scillæ, cepæ, porri, aliorum, & dentes de-
 pancrati ponuntur in cataplasmatibus vnguentis, & tergentes
 aliis externis remediis à 4. sem. ad lib. sem. vel lib. 1. digeretes.
 In balneis verò a lib. 1. ad lib. 2. Denique radices Radices
 omnes in cataplasmatibus, & vnguentis, & ablutionibus in exter-
 pedum, & capitis lixiuiis, & fotibus vsurpantur eadẽ nis.
 quantitate, qua in iniectionibus sunt accipiendæ, vt
 prius dictum est. Quanquam agaricus radix non sit, Agaricus
 sed potius fungus laricis arboris in caudice nascens, quid sit e-
 vt *avrofia* docuit, tamen quia apud Græcos dubium iusque do-
 erat, esset ne radix, an fungus ad radices nascens, vel sis.
 in arborũ caudicibus, ea ratione de eo hoc capite age-
 mus, dicemusque si in decoctione vsurpetur à drag. 1.
 ad vnc. sem. in infusione à drag. sem. ad drag. 2. in sub-
 stantia à scrup. 2. ad scrup. 4. vsurpandum. Maiorem
 autem sui quantitatem non permittit, non quòd ha-
 beat aliquam eximiam laxandi vim, sed quia decoctũ,
 vel infusum vomitionem excitat, in substantia, propter
 leuitatem, molem medicamenti auget.

Gulielmi Rondo.

De dosi herbarum recentium vel siccarum.

Cap. 11.

I
b
Recentes.

Herbæ, vel recentes, vel siccæ in medicamentis solent usurpari. Recentes autem fasciculus, vel manipulis pluribus in balneis, in aliis formis, manipulis tantum. In clysteribus quidē paucis, tum in decoctionibus iniectionum, vt vno, vel 2. vel M. sem. vel tertia parte M. i. vt quando minus conueniunt, vel quando efficacissimæ, vel ingratae sunt. Siccæ verò in externis, & magnis remediis eadem mensura mensurari possunt, vt in balneis, & lauacris. In aliis autem remediis, vt pulueribus capitalibus, stomachicis, omnibus alarum insersionibus, vel aliarum partium, quæ ex herbis aliquibus siccis parantur, à drag. i. ad vnc. sem. vel ad vnc. i. recipiuntur. Eadem quantitate etiam, in quibusdam fumigiis, vt in iis quæ ad tussum paranter tusfilago sicca, & ad fumigia capitis folia rorismarini, ladicisti origani, imponi possunt. In internis verò, vt in antidotis, colicis, & nephriticis pulueribus cordialibus, & capitalibus, vel qui ad ventrem vel vterum præscribuntur à drag. sem. ad vnc. sem. exhiberi debent. Idem in herbis obseruandum, quod de radicibus dictum est antea, siue aperientes, siue detergentes, siue gratae, siue ingratae sint: vt aliquando maior, aliquando minor quantitas usurpetur, pro natura, vel quantitate remedii. In excitando venerem, vtendum est herbis recentibus, vt eruca, & mentha, quia plus habent flatus. Ad flatus verò discutiendos, ad vrinas mouendas, & ad humores attenuandos, siccas eligere conducibilius est, propter humiditatem enim assumptam, ad id efficaciores sunt. Herbæ quæ laxant, magis laxant recentes quàm siccæ,

f. Siccæ.

ri

Ma

c

i

c

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Herbæ la
antes.

De ponde. medic. 117

cz, vt mercurialis herba, brassica marina, thymelea, chamelæa.

De florum necessaria quantitate Cap. 12.

Flores siccos pondere, & mensura metimur, recentes mensura tantum. Nam in antidotis, & nobilioribus compositionibus, in quibus parua tantum quantitas recipitur, sicci à scrup. 1. ad drag. 2. admittuntur, vt in pulueribus cordialibus, capitalibus, stomachicis, & vnguentis. In syrupis autem, & apozematis, & aliis decoctionibus à P. sem. ad P. 2. vel 3. vel plures, vt & in balneis, & clysteribus: Sunt enim parum efficaces, nisi in mole magna. Quare in pilulis nunquam vsurpandi sunt, quia augendo molem, vim aliorum medicamentorum minuunt. Sunt tamen præstantiores ob suam tenuitatem partium, ideo vsurpantur in aliis. Recentes, quia efficaces tantum ad refrigerandum, humectandum, & laxandum, in syrupis, & apozematis, & aliis huiusmodi decoctionibus solum immituntur, idque, à P. sem. ad P. plures vel manipulos. Non autem pondere, nisi in conseruis parandis, ad proportionem cum saccharo seruandam.

In antidotis.

In decoctionibus.

In pilulis.

Recentes

De fructuum mensura. Cap. 13.

Fructus non vno & eodem modo mensurantur, alii enim pondere, alii numero, alii utroque modo. Fructus igitur magni, integri, & discreti vt pruna, poma, pyra, mala punica, mala cotonea, mespilla, forbæ, ficus, passulæ iuiubæ, sebesten, dactyli, corna, nuces, amygdalæ, auellanæ, & iis fructus similes Numero præscribuntur. Quorum 1. 3. 4. 10. C. vel

Fructus magni, integri & discreti.

Gulielmi Rondo.

vel numero 4.5.6.7.8.15.20.L. & ita deinceps dici-
 mus, exceptis pomis cydoniis, & punicis, quæ ob ma-
 gnitudinem, ad tantum numerum in præscriptis nun-
 quam perueniunt. Interdum etiam fructus pondere
 mensuramus, cum ab iis aliquas partes detrahimus,
 vel aliquas partes tantum in vsum reuocamus. Vt cū
 dici mus, carnium cydoniorum abiectis cortice, & gra-
 nis lib. 1. vel corticis malorum granatorum vnc. 3.
 Vel cum religiosius proportionem miscendorum ser-
 uare volumus, vt in sinapismis, in quibus pro vnc. 1. se-
 minis sinapi, aliquando ficuū lib. sem. miscemus, & ali-
 quando lib. 1. Nam si numero ficus metiremur, minus
 certa esset proportio, cū ficus aliæ maiores, aliæ mi-
 nores sint. Neque hic erratum esset leue, si enim mi-
 nus ficuum iusto, vel plus sinapi adhiberetur, esset pe-
 riculum vlcerationis. Non minus religionis est ob-
 seruandum in masticatoriis, quæ parantur ficubus, vel
 passulis, & acribus medicamentis, cum idem eadem ra-
 tione, qua in sinapismo impendat periculum. Inter
 fructus sunt nonnulli qui ad varios vsus vsurpari so-
 lent, & diuersa mēsurā, pro diuersitate scopi, aut vsus,
 vt pruna, sebesten, tamarindi, quæ bilem extinguunt,
 eamque expurgant, vel partes refrigerant. Quare si
 ad refrigerationem vel ad bilis alterationem vsurpa-
 buntur, paruo numero iniicientur, vt ad paria duo, vel
 tria, si verò ad laxandum, quia imbecilliter laxant, ad
 paria viginti. Idem facimus de passulis, & ficubus, nā
 si ad laxandum, magno numero, si ad leuiter detergen-
 dum, vel calfaciendum præscribantur, minori, & hoc
 de internis remediis est intelligendum. Nam in bal-
 nea ficus, & passulæ iniici possunt, si detergere, & re-
 laxare sit animus, maxima quantitate, quia forma re-
 medii, & paucitas virium id postulāt, vt ad paria quin-
 qua-

Pondere
 etiam ali-
 quando mē-
 surari.

Sinapif-
 mus.

Masticato-
 ria.
 Quosdā
 pro varia
 & multi-
 plici vi ē
 varia mē-
 sura vsur-
 pari.

quaginta. Fructus laxantes, detergentes, & emollientes ad Pa. 10. vel 20. dantur. Refrigerantes, & lenientes in iniectionibus inflammationum, vteri, vesicæ, & intestinorum, decoqui possunt ad Pa. 10. qualia sunt pruna, sebesten, tamarindi. Dulciores fructus, in clysteribus sedantibus dolorem, lenientibus, laxantibus, detergentibus, & vermes deorsum trahentibus, eodem numero ponuntur commodè. Nec non adstringentes, in clysteribus ad fluxum ventris, præscribuntur eodem numero, in decoctionibus verò alterantibus, ne obstructiones pariant, minori. Detergentes in laxantibus ad Pa. 20. vel 30. vel 40. poni possunt, in alterantibus ad Pa. 5. vel 6. in decoctis vero pectoralibus, vel syrupis, media quantitate, fructus enim detergentes, in pectoralibus maiori quidè numero sunt opus, quam in alterantibus tantum, ut vis medicamenti seruetur, donec ad pulmones peruenierit, minori verò quàm in laxantibus, nam si equalis mensura ut aut Pa. 20. aut 30. ponantur, nimium detergendo ventrem laxant, & ad partes superiores non perueniunt. In alterantibus ergo ponantur ad Pa. 5. in laxantibus ad Pa. 20. in pectoralibus ad Pa. 10. ut medius modus seruetur. Quod de passulis, ficibus, iuinibus, sebesten, & dactylis volo intelligi. Horum item fructuum pulpa, ceu caro præscribitur in eclegmatis, opiatis, & cataplasmatibus, sed pondere, non numero, quia eorum tantum pars usurpatur. Pulpa passularum in opiatis laxantibus ad vnc. 2. in eclegmatis media mensura, in cataplasmatibus hepaticis corroborantibus, vel malacticis à 4. sem. ad lib. sem. vel lib. 1. ponitur. Pulpa prunorum dulcium laxantibus tantum medicamentis, & opiatis misceri potest, acidorum in cataplasmatibus adstringentibus ventrè, ut & alii fructus omnes adstringentes,

Laxantes,
detergen-
tes emol-
lientes.

Refrige-
rantes, le-
nientes.

Dulces.

Adstringē-
tes.

Detergen-
tes in laxā-
tibus.

Fructuum
pulpa.

Gulielmi Rondo.

Capita pa-
paueris.

Fruetus
minores.

Fruetus
contusi.

gentes, vt pyrorum, pomorum, malorum cotoneorū
à 4. i. ad lib. i. Dactylorum pulpa in hepaticis corro-
borantibus, vel malacticis poni solet ad lib. i. Capi-
ta papaueris vt fructus numeramus, vt ex descriptio-
ne Diacodii apud Galenum patet lib. *κατὰ τόπον*. Fru-
ctus minores vt passulæ Corinthaicæ, myrthi fructus,
siue baccae, vel berberis, vel lentisci, vel balsami, vel
terebinthi pondere maiore, vel minore, pro scopo, na-
tura, viribus, & forma remediorum vsurpantur, ma-
xima ex parte à drag. i. ad vnc. i. Fruetus indiscreti,
vel cōtusi, vt tamarindi pōdere nō numero mēsurant.
Passulæ vraq; mensura, dicimus enim passularū drag.
2. vel 3. interdum passularum Paria 10. 20. 30.

De seminum dosi seu quantitate. Cap. 14.

Calida
grata.

Ingrata.

Acria.

Téperata.

Prouocan-
tia urinā.

Semina semper pondere metimur, sed diuersa, di-
uerso pro natura ipsorum, & scopo, & forma re-
mediorum. Ea vel calida sunt, vel frigida, & ex iis
alia dicuntur maiora, alia minora. Præterea calido-
rum alia sunt magis grata vt semen anisi, foeniculi, ob
id ad drag. i. vel 2. præscribuntur, vt in pulueribus
post pastum: Quæ minus grata sunt ob odorem vel
saporem à drag. sem. ad drag. i. vt semen cumini, se-
seli Masiliensis, carui, ameos. Sed in multo minori
quantitate, quæ magis acria sunt, vt rutæ agrestis, na-
sturtii, thlaspi. Quæ temperata sunt à drag. i. ad vnc.
i. in internis remediis poni possunt. In balneis verò,
& foribus, vel clysteribus ab vnc. i. ad plures. Sunt au-
tē huius generis semen maluæ bisinaluæ, lini bomba-
cis. His proximè accedit semen lini, & foenugræci, sed
hoc paulo calidius illo. Semina prouocantia urinam
pro scopo, & sua acrimonia, diuersis ponderibus ad-
mi-

De ponde. medic. 119

ministrari debet, si ad ciendam vrinam dentur à drag. 1. ad drag. 3. vel 4 exhibentur, si verò laxantibus permisceantur, ad humoris attenuationem, vel medicamenti deductionem, à scrup. 1. ad drag. 1. tantum propter rationem quâ de aperientibus medicamentis reddidimus. Possent enim impedire, deriuando ad renes, vim medicamenti laxantis. In aperientibus obstructions, media quantitate poni debent. In arteriacis à scrup. 1. ad drag. 1. ne fluxionem sua acrimonia excitent. In bechicis à scrup. 1. ad drag. 1. tantum, ne pituita resiccata in pulmonibus retineatur, vel etiam sua acrimonia fluxionem excitent. Hæc eadem flatus discutunt, quæ si polypodio, aut flatum generantibus iungantur, augenda erit dosis à drag. 1. ad drag. 2. In clysteribus autem & sedantibus dolorem, & aliis colicis remediis, à drag. 2. ad drag. 6. in antidotis à drag. 1. ad drag. 3. decoquuntur. Calidissima autem semina, qualia sunt semina nasturtii, ruræ agrestis, thapsiæ, synapi, erucae in internis remediis à scrup. 1. ad drag. 1. in externis autem à drag. 2. ad vnc. 1. hæc si decoquantur siue ad internum, siue ad externum remediū, maior quantitas eorum est necessaria, quàm si tota in puluerē redacta assumerentur, potissimū cum in aqua simplici decoquuntur. Dos is igitur erit à drag. 1. ad drag. 3. in externis autem remediis à drag. 3. ad vnc. 1. sem. vt cū ex thapsia, & oleo remedium paramus ad alopeciam, pro lib. 1. olei, vnc. 1. feminis thapsiæ imponimus. Sūt aliqua semina odorata, quæ aliquando fructus appellantur, vt carpobalsamum siue semen, balsami, cardamomum, grana parady si, cubebæ, piper, quæ iuxta acrimium omnium mensuram præscribi debent. Semina frigida alia maiora, alia minora dicuntur, id est alia aliis sunt frigidiora, quæ oīa differūt viribus, sapore, & odore,

In laxantibus.

In aperientibus.

In arteriacis.

In bechicis.

Flatus discutientia.

Calidissima.

Quedā semina etiā fructus appellantur.

Frigida.

Gulielmi Rondo.

Frigida minora. odore, & familiaritate. Semina enim frigida minora, refrigerant cum leui quadā adstrictione, & siccant, tanquam amara vtcunque, ob id magis in externis, quàm internis imponi solent. In internis autem ponuntur, vt pulueribus à scrup. 1. ad drag. 1. & drag. 2.

Frigida maiora. in externis à drag. sem. ad vnc. sem. Semina verò frigida maiora refrigerant, & humectant, eo pacto nihil adstrictionis habent, sed potius relaxant partes cōstrictas nimia siccitate quam constringant, & corpori nostro magis familiaria sunt, si cortex externus ablatus fuerit, neque antiquitate rancida sint. Dosis diuersa erit pro diuersitate scopi, & forma remedii vt in humectantibus, in refrigerantibus, & cientibus vrinam à drag. 2. ad vnc. 1. In pectoralibus verò remediis à drag. sem. ad drag. 2. vel drag. 3. In laxantibus medicamentis à scrup. 1. ad drag. 1. Pro forma autem remedii augentur, vt in clisteribus ad vnc. sem. ad vnc. 1. In balneis detergentibus, refrigerantibus, humectantibus ad vnc. 2. ad vnc. 4. vel vnc. 6. Raro in aliis externis remediis vsurpantur, præter oleum quod ex

Quadam frigidorū essemagis familiaria quædā minus. illis paratur. Semina autem frigida alia aliis magis familiaria sunt, ob id maiori copia assumuntur, & frequentius, vt semina papaueris albi magis quàm nigri, semina hyosciami albi potius quàm nigri, vel flauī, idque in stupefacientibus, vt in colicis, inspissantibus, & arteriacis à drag. sem. ad drag. 2. vel drag. 3. In colicis tamen maiori quantitate debent recipi, quàm in aliis, vt si quis semē cicutæ dare vellet, in his & lubentius, & largius, quàm in illis id faceret. Licet rarò medicamentis internis inferatur, est enim & siccum & adstringens & venenosum. Quare non leuiter peccant, qui in pilulis ad articulare morbum harmel, quod

Semen cicutæ.

Harmel.

est cicutæ semen, interpretantur pro semine rutæ agre
stis

ffis quod est Harmala. Sed liberius in externis reme Harmala.
 diis constringentibus, refrigerantibus, stupefacienti-
 bus imponi potest à drag. 1. ad vnc. sem. vt in iis quæ
 ad mammarum indurationem præscribuntur, intelli- Mamma-
 ge de singulis applicationibus, his enim minor copia rum indu-
 esset inutilis. Semina aliqua sunt præterea quæ antea ratio.
 odorata diximus quæ fructus etiam dicuntur, vt semē
 myrthi, corymbi hederæ, & similia, vt & nuclei mali
 granati. Ea mensurantur pondere, verbi gratia, se-
 men hederæ in syrupis cientibus aquas imponi solet à
 drag. 1. ad vnc. sem. semina myrthi in constringenti-
 bus externis, & internis, poni possunt à drag. 1. ad
 drag. 2. in externis aliquando ab vnc. 1. vt in capitali-
 bus, & in pulueribus adstringentibus ventrem, cata-
 plasmatis, & clisteribus, fotibus, & balneis, augendo
 vel minuendo dosim pro forma remedii, & scopo. Ea
 dem erit dosis seminum vuarum, quæ omnino similem
 facultatem habent, & in iisdem remediis imponi pos-
 sunt. Semina rosarum & in externis, & in internis re-
 mediis à drag. 1. ad drag. 2. ponuntur. Semen corian-
 dri inter medicamenta resiccantia reponitur, sed alii
 calefacere, alii refrigerare existimant. Ego puto se-
 mē calefacere, vt Galenus existimauit, herbam autem
 recentem refrigerare, & minus resiccare. Semen cali-
 dum est ad primum gradum, & siccum ad secundum
 est igitur in quibus parum calefacere, & magis resicca-
 re conuenit vsurpandum, vt in pulueribus capitalibus,
 pulueribus ventriculi, & hoc a drag. 2. ad vnc. 1. In
 internis autem remediis, a Medicis vsurpatur, vt in
 pulueribus post pastum ab vnc. 1. ad vnc. 2. sed præpa-
 ratum aceto, vt effumatio illa, quæ caput tentat, & ve-
 luti ebrietatem inducit, extinguatur. Acris enim aceto
 macerata fiunt mitiora, insipida verò eandem acrimo-
 niam

Mamma-
rum indu-
ratio.

Semen he-
deræ.

Semē myr-
thi.

Semina
vuarum.

Semina
rosarum.

Semen co-
riandri.

Herba co-
riandri.

Gulielmi Rondi.

Quid acetū in acria & in insipida possit.

Granū tinctorum.

Sericū tinctorum eius sanie.

niam acquirunt. Sed quòd adeo caput tentet, ut Nican-
der vult, hoc agresti non præparato, vel herbæ ipsi
tribuendum potius quam nostro, quo hodie utimur,
quod colitur in hortis, & cultura mirius fit, & mace-
ratione in aceto facta, commodius redditur. Ego in
morbis capitis, in quibus vel ficare, vel vim aliorum
medicamentorum ad caput ducere oportet, ab vnc. sc.
ad vnc. 1. soleo iniicere. In morbis factis per consen-
sum, ut in scotomia, & doloribus capitis abstineo, vel
ab drag. 1. ad vnc. sem. tantum, aliis multis permixtū
& saccharo conditum, ad evitandam illam effumatio-
nem, potius, quàm non conditum usurpo. In exter-
nis remediis à drag. 3. ad vnc. 1. Granum tinctorum
vulgo appellatum, quod neque granum est, neque se-
men, sed vesicula quædam qua continentur ova par-
uorum insectorum, quòd manifestum, nā si aceto non
extinguantur, abeunt in paruos papiliones rubros, ea
que nascitur tantum in foliis, vel caule, vel trunco vel
radice ilicis humilis, propter eius magnam humidita-
tem, priusquam glandem ferat. Utuntur Medici hu-
iusmodi grano, in pulueribus capitalibus ad resicca-
tionem, scrup. 1. ad drag. 2. vel drag. 3. vel in sanie gra-
ni recentes, sericum tingunt, pro confectiōe Alker-
mes paranda. Annumeratur etiam inter ea medica-
menta quæ nervos siccant, & consolidant, quare in
enhæmis, & conglutin, antibus medicamentis à drag.
2. ad vnc. sem. vel vnc. 1. poni potest.

De frugibus siue cerealibus. Cap. 15.

FRuges, siue Cerealìa in medicamentis internis, &
externis, præscribuntur, sed diuersa mensura: nam
si integra usurpentur, Pugillis, vel manipulis mensu-
rantur

De ponde. medic.

121

rantur, in farinam verò redacta, pondere, vt lib. 1. lib. sem. vel vnc. aliquot, idque maximè si in parua quantitate vsurpentur, vt farina hordei, tritici, aut quæ ex iis parantur, vt amilum, sed si magna earum quantitas foret necessaria nihil impedit eas manipulis metiri, vt semper de furfure fit, siue sit tritici siue aliorum, ob eius vtilitatem, & imbecillitatem. Sunt autem cerealia quibus frequenter vtimur alica, frumentū siligo, sequalis, hordeū, speltra, auena, miliū, panicū, oriza. Quibus adiungi potest foenugræcū, ex quo frequenter farina fit, & quamuis inter semina reponatur, eadē mensura tamen præscribitur, quia ipsa cerealia siue integrum siue in farinam redactum. Denique cerealia sunt, quæcunque in farinam redacta panis materiam dare possunt. Erit ergo dosis cerealium diuersa, pro diuersitate formarum remediorum. Nam si in balneis vsurpentur integra, vel confracta ad M. plures, in clysteribus, P. 1. vel 2. in decoctionibus verò syruporum, iniectionum, gargarismatum ad P. 1. vel P. sem. Farina autem, si ad cataplasmatum cōpositionem vsurpetur, à lib. 1. ad lib. 2. Si ad inspissationem succi herbarum, quantum sufficit, imponitur, donec mellis consistentiā acquirat, vt in bechico medicamento, aut arteriaco farina hordei, vel amyllum à drag. 1. ad drag. 2. vel 3. imponitur.

Amilum.

Furfur.

Quæ dicuntur cerealia.

Farina.

De Leguminibus.

Cap. 16.

Legumina quod manu legantur dicta, vt cerealia Vnde dicuntur legumina. mensurantur, nam si integra vsurpentur, M. vel P. metimur, si verò in farinam reducantur, pondere sunt præscribenda. Legumina autem sunt, cicera, lentis, fabe, lupini, orobi, faseoli. Quantitas eorū ex forma, mina.

R

ma, mina.

Gulielmi Rondo.

ma, & quantitate remedii, & viribus ipsorum, colligitur. Vsurpantur autem in externis & internis remediis, in his quidem integra, veluti in decoctis ad ciciendam vrinam, in illis redacta in farinam.

De lignis & corticibus. Cap. 17.

Efficacissima, odoratissima, cara. **L**igna non raro à Medicis & vt & alia medicamenta in vsum trahuntur, quorum cum magna sit varietas, in efficacia, odore vel raritate, varia est eorum quoque dosis. Si enim efficacissima, odoratissima, vel cara, pondere drag. 1. vt plurimum præscribuntur, vt lignum aloës & xylobalsamum, & santali omnes. Horumque vsus est non in internis solum, sed & in externis remediis, vt in antidotis, in pulueribus cordialibus, capitalibus, in vnguentis ventriculi, hepatis, & vteri. Item in epithematis cordis, & ventriculi, in suffumigiis etiam vsurpantur, his adiungere possumus ebenum, quod in externis vt in collyriis est vsui. Ligna autem crassiora, & minus nobilia, ex quibus decoctiones parantur, vt ligni gaiaci, palmæ sanctæ, fraxini, tamarisci ramenta maiori pondere vsurpantur, vt ab vnc. 1. ad lib. 1. quando ex iis decoctiones parantur. Corticis nomine integumenta plantarum interna, & externa, & fructuum putamina comprehendimus: dicimus enim malorum granatorum corticem, & nucum. Quarum corticum differentia sunt multæ, quando Nobiles. quidem aliæ nobiles, & efficaces, aliæ ignobiles. Nobilium vt cinamomi, thuris, nucis moschatæ dosis erit à scrup. 1. ad drag. 3. vel vnc. sem. Ignobilium arborum, & fructuum, nisi ingratitude prohibeat ab vnc. 1. ad multas dosis erit vt gaiaci, capparis, fraxini, tamarisci, sambuci, populi, vlmis, pini, quercus, malorum gra-

De ponde. medic.

122

granatorum nucumque, & suberis. Et in medicamen-
tis adstringentibus, & exsiccantribus eadem copia ad-
misceri possunt, vt cortex pini, quercus, suberis, & nu-
cum, potissimum in externis remediis.

De Cineribus.

Cap. 18.

Cineres ex lignis, corticibus, fructibus, lapillis, ani-
malibus iisque integris, vel eorum partibus pa-
rantur. Pondere autem solo mensurantur, eoque va-
rio pro forma remedii, & pro sua natura acriori, vel
minus acri. Ex iis si conficiantur remedia externa, lar-
giore copia quam si interna, dantur. Intus autem si as-
sumantur abluti, maiori pondere, si verò non abluti,
propter acrimoniam, in parciore copia recipi debent,
vrunt enim calcis modo. Lixiuum ex aqua & cineri-
bus facimus, verbi gratia, lib. 3. aquæ lib. 1. cinerum in
fundimus, sacramentorum, & salicis maiorem copiam,
brassicæ, & fabarum minorem fumentes, quia hæ ma-
gis acres. Omnium antispodiorum, quæ possunt pa-
rari ex fructibus adstringentibus, summatibus arborum
adstringentium, vt ex myrthi ramis cum fructu olea-
stri, & similium dosis erit à drag. 1. ad drag. 2. vel à
drag. 2. ad vnc. 1. in interno remedio quod instituitur
ad multas doses. Spodium verò Græcorum est, quod
hodie Tuthiam vocant barbari. Corallium porrò vri-
mus, vt tenuitatem partium acquirat, & siccitatem,
vsum autem in externis remediis à drag. 2. ad vnc. 1.
imponi potest, in internis, & deuorandis à scrup. 1. ad
drag. 2. In dentifriciis à drag. 3. ad vnc. sem. aut ab
vnc. 1. ad vnc. 2. Cineres hirundinum, vel cuculi, vel
vermium, vel intestinorum gallinæ, ad dolorē, & ven-
triculi humectationem. Lupi autem vel cornu cerui,

Abluti.

Lixiuum

Antispo-
dia.

Spodium
Coralliu

Dentifrici
Cineres
animalit

R 2 in

Gulielmi Rondo.

interno aliquo alio remedio assumuntur. Dosis erit à drag. 1. ad drag. 2. vel a drag. 2. ad vnc. 1. pro multis dosibus. Cæterum vruntur testacea marina, & ossa animalium, sed ea calcis naturam referunt. Quo fit vt eorum tantum vsus parcior sit vsurpandus. Verum quia sequenti capite de animalium dosi, & cinerũ quæ ex iis fiunt, sermo ex professo instituitur, plura hoc loco de iis non esse dicenda videntur.

De animalium dosi & partium eorum.

Cap. 29.

Integra
vsta.

Canthari
des.

ANimalia quorum vsus ad medicamenta conueniens est, interdum tota, vel eorum partes aliquæ tantum vsurpantur, vel vna tantum, vel duabus partibus remotis, aliquando vna tantum pars eligitur. Vermes toti recipiuntur in oleo de vermibus, totique vruntur, cum ex eis cineres conficere opus est. Idem de scorpionibus vsu venit, toti enim & vruntur, & in oleum recipiuntur. Idem de hirundinibus & cicadis sentiendum, cuculis, & passerculis, troglodytis, & caudis tremulis. Vipere quinetiam totæ vruntur, vel ad trochiscorum qui ab his de nominantur præparationem, caput, cauda, pellis, ossa, & interiora omnia eiiciuntur, carnes vero retinentur cum iure. Quæ integra vsurpantur uumero frequentius mensurantur: quæ vero mutilata aliqua parte sui, & numero, & pondere, quanquam nihil prohibet etiam integra animalia, si minora sint pondere metiri, vt cimices, asellos, siue centipedes, & Blattas, Cantharides aliquando totæ vt in vesicatoriis, imponuntur, & in quibusdam aliis internis remediis, quanquam neotrici, alas & pedes auferunt semper, quod aliarum partium

De ponde. medic.

123

rium antidota dicantur si Dioscoridi credimus. Par-
tes animalium siue maiores sint, siue minores, etiam
liquidiores, vt fell', penduntur omnes: item quæ vstæ
sunt, vel alio modo præparatæ, dosi earû erit à drag.
sem. ad drag. 1. Quæ minus ingrata sunt, vel parum
efficaces à drag. 1. ad drag. 3. vel drag. 4. præscribi
possunt, vt rasura eboris, vel cornu capræ, vel cerui,
vel cineres ossium astragali leporis, rasura vnicornis,
quæ quia carius emitur, minori pondere datur, vt alia
medicamenta pretiosa, quanquam eius vis neque ma-
ior, neque certior sit ea quæ est eboris, aut cornu cer-
ui. Partes autem quæ acres, aut foetidæ, aut nimium
odoratæ sunt, in internis remediis à G. 2. ad scrup. 1.
vel 2. vel ad drag. 1. admisceri possunt. Cuius gene-
ris sunt castoreum, moscus, ambra, ciueta, tum quia
acria sunt, & pretiosa. In externis verò remediis po-
test eorum augeri quantitas. Intestina lupi, & galli-
næ in furno vruntur, & a drag. 1. ad drag. 2. per se, vel
cum vino propinantur. Sed si opiatas, & pulueribus
inserantur ad vnc. 1. vel 2. imponi possunt, propterea
quod ad multas doses componuntur. Ex pulmone etiã
vulpis & hepate lupi non raro remedia comparantur,
sed quia ingrata, & male olentia minus placet, siccata
in furno à scrup. sem. ad drag. 1. imponimus ad drag.
2. vero si aliis odoratis admisceantur. Excrementorû
alia aliis sunt efficaciora, & magis acria, ob id diuersa
præscribuntur mensura, vt sterces gallinarû aduersus
fungos à dra. 1. ad drag. 2. sterces colubarû à drag. se.
ad dra. 1. Idè de stercore sturni. Imò in externis reme-
diis hæc ab vnc. se. ad vn 2. vel plures possunt imperari.
Sterces ouis, & capræ & boû pōdere nec mēfura eadē
præscribuntur: sterces enim ouis in cataplasmatas ab
vn. 2. ad vnc. 6. sterces verò caprarû, ad vnc. 4. at vacce
R 3 sterces

Partes ani-
malium.

Nō ingra-
ta & par-
efficaces

Acres au-
fetidæ au-
nimium
odoratæ.

Excremen-
ta.

Gulielmi Rondo.

Fella: Stercus ad lib. 1. vel plus, habita semper ratione quantitatis remedium, & partis cui applicabuntur. Fella, ut acrimonia, & consistentia differunt, sic etiam pondere: fel enim auium, cum minus acre, tenuius autem felle quadrupedum sit, acrius vero, sed minus tenue felle piscium, fellis quadrupedum dosis erit drag. 1. auium drag. 2. piscium verò drag. 3. Cornua, quia dura sunt, vel vruntur ut ostracea, vel lima raduntur in tenuissimas partes, earum dosis erit à drag. 1. ad drag. 3. vel 4. Saporis enim & odoris ferè sunt, proindeque omnis alterius efficaciam expertia nisi in resiccando valere multum deprehenderetur. Quamuis etiam non nihil refrigerare possint, & quibusdam quadam antipathia serpentes fugare, & vermes credantur. Nonne autem latet, plures facultates dari ab iis qui vendunt, ut & rasuræ unicornis quam auro pendunt, propterea quod venenis ut plurimum aduersetur, quod non minus præstare cornu cerui, rasuramque eboris existimo. Et quemadmodum cornu capræ, eandem vim habere dicitur cum cornu cerui: sic certe rasura eboris, cum cornu unicornis, ut experientia docet. Quare pauperibus ea quæ minus cara & preciosa sunt, dentur, diuitibus autem (quibus nihil carum esse potest) unicornis imperetur. Cuius dosis erit à G. 6. ad drag. sem. vel drag. 1. Testæ similiter ostreorum, mitulorum, concharum venerearum quas vulgus gallicum Pourcelaines appellat, purpurarum, buccinarum, & aliorum ostreorum, item cancrorum marinorum, & fluuiatilium, vruntur, ut facilius in partes tenuissimas reduci possint, earum dosis à drag. 1. ad drag. 2. vel 3. si vsta extincta sint aqua, vel si abluta fuerint, in externis autem remediis ab vnc. sem. ad vnc. 2. Nacra quæ alias mater perlarum dicitur non male pro vnionibus,

De ponde. medic. 124

nibus, & margaritis vsurpari posse videtur, idque nō remere cum easdem vires inesse vtrifq; & ratio quod fiat eiusdem animalis partes, & ex eadem materia pro creatæ, & experientia qua id à me comprobatum est persuaserit, affirmare audeo: Dosim autem statuo à scrup. 1. ad drag. 1. vel 2. in antidotis pauperum, quia vili pretio venditur. Vniones vero, & perlas, siue margaritas, quas vsus in antidotis & pulueribus cordialibus, & quibusdam collyriis recipit à scrup. 1. ad drag. 2. assumo, parumq; perforatas aut non perforatas esse curo. Ceterum quoniam aliquarum partium dosis exactiorem doctrinam requirit, ea ratione peculiaris de illis sermo instituendus esse videtur.

De Sanguine. Cap: 20.

A Sanguine autem animalium exordiemur cuius non minus quam aliorum excrementorum, vel partium in medicamentis, tum internis, tum externis, frequens est vsus, sed diuersa proportionem pro diuersa virium facultatumque quas vniuscuiusque animalis sanguis obtinet ratione. Sanguis enim anatis & an- In inter-
feris, cum valeat aduersus venena, tum sanguis testi- nis.
tudinis marine, & terrestris, & hoedi recipiuntur in an-
tidoto ex sanguinibus ad drag. 2. Atque etiam in an-
tidoto illa tantoperè celebrata, ad omnes internos af-
fectus, & descripta lib. 2. de antidotis à Galeno supra
dictorum animalium sanguis ad drag. 7. admittitur,
quia magna est compositio. Sanguis hirci cuius ad
lapidem comminuendum magna est utilitas à drag. 1.
sem. ad drag. 3. vel ad drag. 6. præscribitur. Sanguis
item testitudinis marinæ ad epilepsiam ad drag. 2. da-
datur. Testitudinis vero terrestris ad hecticam impe-
ratur

R 4

Gulielmi Rondo.

In exter-
nis.

Pituitosū
(bilioso in
(fluxib⁹ sā
guinis si-
stēdis prę-
stare.

Ranę vi-
ridis.

ratur recens, & crudus ad vnc. i. & hoc faciunt no-
strę mulieres, quia actu frigidus est, & quadam refri-
gerandi vi, humectandi que pręditus est. Decoctum
tamen carnis eius, mihi magis humectare, licet mi-
nus refrigerare, videtur. Atque hæc de sanguinis
in medicamentis internis assumendis præscribenda
mensura dicta sunt. Eius verò qui externa medica-
menta subit mensuram quantitatemque definire nullo mo-
do necesse est, sed ea arbitrio & necessitati relinquen-
da. Ut cum ad vulnera recentia oculorum sanguinem
columbæ, vel turturis imperamus, guttas aliquas in
oculum iniiciendas monemus. Et cum fluentem san-
guinem sistere volumus, quamuis alii sanguinem bilio-
sum imperent, quia talis minus est emplasticę facul-
tatis particeps, ideo pituitosum, & viscosum malu-
mus, exsiccatum, & in puluerem crassum redactū, eius
quantum sufficit pro parte læsa sinapisanda imperan-
tes. In emplastris autem vsurpamus eam quantitatem
quę necessaria est ad puluerem excipiendum, ut in em-
plastro de pelle arietina fit. Sanguine porrò ranarum,
vespertilionum, & similibus psilotra conficimus, eius-
que quantitatem quam volumus præscribimus, si qua
autem inæqualitate in proportionem illorum deprehen-
datur, non alia ratione fit, quàm quòd non liceat æqua-
lem horum animalium sanguinis copiam habere. Ra-
na enim viridis parum sanguinis habet, ut & vesper-
tilio, tinnus autem multum. Quare in eo loco in quo
haberi potest, maiori quantitate vsurpamus.

De vrina Cap. 21.

VRina animalium in remediis externis admo-
dis quam in internis conuenientius admittitur:
quia

quia vilia, & abominanda remedia ex recrementis ve-
ficæ, & alui parata à Galeno lib. 7. Simplicium im-
probantur. Scribonius tamen Largus urinam apri ad
epilepsiam commendat. Rustici, & mulierculæ uri-
nam puerorum sanis, & ægris dant bibendam ad pe-
stis præcautionem: ut urinam mulæ, ad sterilitatem in-
ducendam, aliqui turpiter & scelestè bibendam mulie-
ribus præbuerunt. Hominis verò, ad aquam intercu-
ratem, vel venenum, rustici similiter assumunt, idque alia
ratione mihi facere non videntur, nisi quod vim deter-
soriam eandem quam serum habeat. Quare in affe-
ctibus in quibus conuenit serum, urina pueri præscribi
potest, idque rusticis & ignobilioribus tantum. In cly-
steribus autem, quæ dantur ad detergendam pituitam,
& ad appetentiam comparandam & conciliandâ inii-
citur ad pondus vnc. 4. si cum aliis detur, si verò per se
ad lib. 1. Ad multa porrò remedia paranda, urina pue-
ri impubis ab antiquis usurpata est, ad eam quantita-
tem, quæ necessaria est pro externo remedio, ut in re-
solutione, ab argento viuo, in qua affectione tantum
eius assumimus: quantum necesse est pro magnitudi-
ne partis resolutæ.

Vrina ap-
ri.Ad pestis
præcautio-
nem.Ad steril-
tatē indu-
cendam.Vrinæ vi-
res.Vrina pue-
ri impubis

De Sero lactis.

Cap. 22.

Serum lactis, urinæ proportionem responderet & re-
uera, eadem est substantia, nisi quod minus fœ-
tidum, & abominabile est, propterea quod à san-
guine in renibus non fuit separatum, ob quam separa-
tionem excrementorum naturam accipit, fetorem sci-
licet, habent enim minus calidi innati ob idque facilè
putrescunt. Ex eo instituuntur remedia ut clysteres
& iniectiones in vterum, & vesicam. Ad decoctio-
nes

Differētī:
feri & ur-
inæ.Vnde fœ-
tor excre-
mentorū

Gulielmi Rondo.

Quomo- nes autem faciendas, vsurpatur quantum sufficit ad de
do debeat coquendas herbas. Vel per se bibitur ad purgationē
dari adpur vel deterfionem. Qua in re non satis est semel, sed
gationem. per multos dies eius vsum experiri. ita vt primo die
vnc. 4. assumantur & his quotidie superaddatur vnc.
1. donec ad lib. 1. vel vnc. 10. deuentum sit. Tunc de
maiore quantitate licebit eodē modo ἀνάπαλιν singu
lis diebus vnc. 1. demere, donec redeatur ad primam
quantitatem. Si quando autem eo ad purgationem
vti velimus. Id potentius præstabit si sub dio perno-
Nocturni Etauerit: nocturni enim rores habent vim subducen-
rores. di aluum. Quam ob id impertire fructibus ante exor
tum solis collectis, deprehenduntur. Quin etiam suc-
cum rosarum vel fumiterræ vel absinthii ad ichorum
purgationem testulæ admiscemus, vel flores tantum,
aut ipsas herbas contusas maceramus in eo, per totam
noctem, & sic præparatum exhibemus. Delicatis ta-
men, ob amarorem admixtarum herbarū, mellis vel
sacchari addi quantum ad potionis amarorem tempe-
randum, & ad gratiam saporis conciliandam sufficere
videbitur, præcipimus.

De Lacte. Cap. 23.

Ad purga **L** AC asinæ, si ad purgationem propinatur, vel de-
tionē vel terfionem, eadem mensura qua serum lactis præ
deterfio - scribendum est. Si verò ad nutritionem, ne turbet ven
nem. trem, minori copia, & chalybeatum, vt & camelinum
Ad nutri ad drag. 4. tantum. Lac verò muliebre, & vaccæ im-
tionem. peratur ad lib. sem. ouis, & capræ, media quantitas
dari potest inter lac asinæ, & mulieris. Iis autem qui
lactis potu assueti sunt, licet quantum erit animo
assumere, obseruatis semper iis quæ ab Hyppocra-
te

De Coagulo, & butyro.

Cap. 24.

Coagulum pondere castorei datur, à G. 1. videlicet ad G. 12. pro vna dosi, idque in internis remediis, extra verò maiori copia requiritur, vt à scrup. 1. ad drag. 1. Butyrum similiter in externis, & internis remediis admitti consuevit, ex eo enim Looch conficiuntur, dupla quantitate sacchari addita. Eius proinde dosis est ab vnc. sem. ad 4. sem. non enim assumitur vna dosi, sed quantum baculo glycyrrhizæ apprehendi potest, lambendo, vel quantitate fabæ. In linimentis, ynguentis, acopis suppurantibus, mollientibus, & relaxantibus ab vnc. 1. ad multas vnc. apponi solet, pro quantitate remedii.

Butyrum.
Quādo ad
sumantur
Looch.

De Apide, & Seuo.

Cap. 25.

Adeps, & seuum differunt consistentia, & temperamento, calefaciunt tamen ambo, sed seuum exsiccat, & minus relaxat. Axungia verò & relaxat, & humectat propter humiditatem quam habet maiorem. Seuum porrò est, quod ex animalibus cornigeris colligitur, & in duriores consistentiam concrevit, quam axungia, eo quod inagis sicca terreæque substantiæ particeps existat. Axungia vero, siue pinguedo est omnium aliorum animalium, vt hominis, porci, vrsi, gallinæ, anseris, anatis & piscium. Seuum ergo vsurpatur in ynguentis vlcerum internorum, & externorum, ab vnc. sem. ad vnc. 1. vt in dysenteria, in reliquis autem ynguentis, pari vel maiore quantitate. At pinguedo, siue axungia in linimentis, & ynguentis

Differētia
seui & adipis.

Seuū quid
est.

Axungia
quid est.

Gulielmi Rondo.

guentis relaxantibus, & emollientibus ab vnc. sem. ad vnc. 3. vel 4 pro quantitate remedii. Axungiam tamē porci à lib. sem. ad lib. 1. in vnguentum ad morbum gallicum, præscribimus.

De medulla. Cap. 26.

Medulla seruat proportionem axungiae, vel seui, ob id eadem mensura præscribi potest, nisi quia minor medullæ nobis copia suppetit, maior autem inopia proinde parcior mensura eius vsurpanda, quam axungiae.

De Resinis & picibus. Cap. 27.

Earum diuisio.

Multæ arbores Resinam fundunt, terebinthus terebinthinam, lentiscus mastichen, abies abietinam, pinus pinæam, larix laricæam, cypressus cypressæam, picea, eam quam etiam picæam possumus appellare. Quarum partitio, præter colorem, & partium tenuitatem, talis esse potest ratione consistentiæ, quod ex ea ponderis diuersitas potissimum sumatur, vt vna partitionis extremitas, liquidas siue humidas vt pinæam, liquidiores vt abietinam, liquidissimas vt laricæam obtineat, altera vero siccas siue duras vt cupressinam, duriores vt terebinthinam, durissimas vt mastichen, picæa ferè in medio est, cum liquiditate enim valde spissa est, & picosa. Diuersitas autem ponderis, ratione scopi, affectus & formæ remedii, talis est. Si assumantur per se quæ liquidæ sunt vt larycæa, & abietina à scrup. 1. ad drag. 2. vel 3. exhibemus, cum dolorē leuare consilii nostri est, & detergere renes, si aluum subducere à drag. 2. ad vnc. sem. In emplastris,

De ponde. medic.

127

plastris, & vnguentis ab vnc. sem. ad vnc. i. vel plures. In emplastris.

Nā cū emplastrum, vel vnguentū ex viscosis, vel em-
plasticis conficiatur, sufficit pauca quantitas liquidæ
resinæ, quæ efficit vt adhærere possit: si autem ex oleis
tantum, spissiores resinæ eligendæ sunt, & in maiori
quantitate vsurpandæ, si verò ex aridis, magis viscosæ
resinæ eligi debent, & in maiori quantitate. Augetur
etiā, vel minuitur eorum quantitas pro scopi ratione.

Nam si ad sedationem doloris medicamentum acopū
pareretur, abietina vel laricea imponitur ad plures vn-
cias. In suppurantibus, vel emollientibus vnguentis,
maior quantitas poni debet, quā in sarcoticis, vel po-
tius maltiche, & resina fricta, vel vulgo appellata co-

Colopho-
nia.

De pice idem sentiendum, quæ cum ex iis lē-
nibus, à quibus resinæ siccæ decidūt, trahatur, præ
paratione tantū ab iis differt, quòd resina sponte fluat
vulnerata arbore, pix autem igne extrahatur. Ea du-

Pices vn-
de.

plex est, sicca, & liquida, quæ licet alioqui commo-
da, & efficax, ad multos morbos sit, & deportatu

Liquida
pix.

æquè facilis ac resinæ liquidæ: hodie tamen, ignoran-
tia ne, an incuria medicorum neglecta iaceat, magno
agrotantium incommodo, nescio. Ergo, cū siccam

solam passim habeamus, in externis, quam internis,

in emplastris quam vnguentis iisque suppurantibus,
vel trahentibus, & sedantibus dolorem, & picationi-

bus, meliori est vsui. In vnguentis, & emplastris vl-

terum, pix deresa è nauibus magna quantitate vsur-

pari potest, quia magis siccat. Omnium in externis

remediis dosis est ab vnc. se. ad vnc. i. vel plures. In

internis quoque remediis, nostri rustici picem vsur-

are solent, vt ad sanguinem concretum dissoluen-

um qua in re tantum valet, quantum mumia ara-

um, si redacta in puluerem in ouo sorbili exhi-

beatur,

Gulielmi Rondo.

In Ecleg-
matis.

beaturn, à drag. sem. ad drag. i. vel duas assumi potest.
Ea non minus vti possumus ad expectorationem quam
liquidis resinis, eademque dosi. In eclegmatis eadem
mensura, & quia eclegma elingitur paulatim, & ma-
gna copia eius paratur, pro quantitate remedii plus vel
minus accipiaturn, vt in vnguentis etiam faciendum,
omnibus denique iis quæ ad plures doses præparanturn,
& asseruanturn.

De Oleis. Cap. 28.

Cõmune
in clysteri-
bus.

Oleum de genere internorum & externorum re-
mediorum est, in cuius speciebus magnæ dissi-
militudines reperiuntur propter oleorum varietatem.
Quod fit vt oleo non vna tantum debeat ascribi men-
sura, sed ea diuersa pro natura eius quo vti volumus
& pro medicamento forma, & scopo, vel aliorum quæ
miscenda sunt. Oleum enim commune per se, vel
cũ aliis commixtum vsurpatur, vt in clysteribus, quod
si solum, à lib. sem. ad lib. i. sem. iniici debet, pro cor-
poris, magnitudine, & ventris plenitudine. In pue-
ro, & in tumore magno alicuius internæ partis, vt vte-
ri, vesicæ, renum, & intestinorum lib. sem. dabiturn tan-
tum. Verum si venter vacuus, & absque tumore ali-
quo, lib. i. sem. erit opus, vt cum etiam alius perueni-
re volumus. In sedatione doloris lib. i. sufficit, etiam
si actio dependeat ab oleo potissimum. Miscetur etiã
vino, vel decocto, & tunc æquis partibus iniici debet
ana 4. i. paruo corpori: maiori autem ana lib. sem. vt
in colico dolore, ad doloris sedationem. Si ad duro-
rum recrementorum mollitionem, vel ad intestino-
rum humectationem vtile sit, ad vnc. 3. poni debet.
Idem de omnibus oleis temperatis sentiendum est, ve
de

Olea tem-
perata.

de oleo chamæmelino, amygdalarum liliorum, & seminis lini. Aliorum verò oleorum multum calfacientium, tertia pars sufficiet supra dictæ dosi, vel dimidia, nisi morbus extremus esset, in quo licebit commutem dosim viurpare ad vnc. 3. Minuitur verò quantitas olei, quando ex decocto pingui clyster paratur, vel quando butyrum, vel axungia porci admiscetur. In externis vero remediis, oleum quod scopo, vel parti magis accomodatum est, vsurpatur. Si autem vnum tantum vsurpetur, nihil refert quam quantitatem præscribamus, modo sufficiat ad partes inungendas. Quod si diuersa olea commiscenda sint, seruanda est illa proportio, quam superius monstrauius de aliis medicamentis, scilicet æquali proportionem, si ex æquo conueniant, esse miscenda, inæquali autem, si non ex æquo, ut in augmento inflammationem, in quo solemus oleum rosatum oleo chamomeli admiscere. In principio plus olei rosati, & minus chamomelini accipimus, deinde vice versa, ut si primum tres partes olei rosati, vnam olei chamomelini accipiamus, tandem vni olei rosati tres chamomelini miscebimus. Si vero miscentur ceræ, ut melius hereant parti, & ad continenda alia ne diffuât, pro vnc. 2. olei ceræ vnc. sem. addimus, ut sit quadruplum olei. Si fiat ex axungis liquefactis, non minuenda est quantitas ceræ, quia axungia oleo mixta non concrevit, si ex seuo, quia consistentiam habet terream, & spissam, minui potest quantitas ceræ: ut etiam si medulla animalium cornu gerentium adiungatur. Oleum in vnguentis, etiam ea proportionem ponitur, ut addantur drag. 2. ceræ pro vnc. 1. olei. In ceratto vero, seruant contrariam proportionem, quam in linimento, nam pro vnc. sem. olei, ceræ vetustæ, & duræ vnc. 1. adduntur. Nec mirum sit, si to.

In externis.

In augmento inflammationum.

Ceræ admixtum.

In vnguentis.

In ceratto.

In linimento.

ceræ

Gulielmi Rondo.

In empla-
stro.

ceræ in linimento, & vnguento eadem, ponatur quan-
titas, quandoquidem linimentum præter olea, axun-
gias, vel resinas liquidas, vel buryrum, vnguētum præ-
ter ceram, pulueres recipiant vt plurimum. In empla-
stro aliquando æqualis mensura olei, & ceræ vel eius
rei quæ ceræ vices gerit, datur. Si emplastrum fiat
ex decoctione herbarum, radicum, vel seminum, pro
lib. i. olei M. i. herbarum iniici potest. Quod si in de-
coctione sit aliquod viscidum, vt radix althææ, ceræ
quantitas minui potest. Subrahentur etiam vnc. ali-
quot à lib. i. olei, si in regione calida, aut tempore ca-
lido emplastrum paretur, aut aliqua terebinthina im-
ponatur, aut lacryma liquida, vel fel liquidius. Au-
getur autem olei quantitas, si hyeme fiat compositio:
nec non si cerusa, vel lithargyrium sine aqua vel aceto
diutius sint decoquenda, absumentur enim longa coctu-
ra oleum, vt si pix vel colophonia ceræ addantur, nam
pro regione, sine, & tempore, & iis quæ admiscuntur
vnà, ceræ quantitas mutatur. Quare difficillimum
est ceræ quantitatem certam, vel olei imperare. Quod
si emplastrum siccius redditum fuerit, ob admixtionē
picis siccæ, vel puluerum aliquorum, terebinthinæ pa-
rum addere oportet, vel ceræ quantitatem augere, &
olei. Si vero axungia aliqua addatur, olei quantitas
est minuenda, vel ceræ quantitas augenda ad dimi-
dium, addit. Eadem proportio seruanda est, cum iis
quæ ceræ vices gerunt, vt cum propolide, & ladan-
o. Vt si sola propolis miscenda oleo sit, & mollior, æqua-
li vtriusque quantitate fiet, si verò siccior, & durior,
minuenda quantitas propolis, vel augenda quantitas
olei. Oleum in maiori quantitate ponendum, si me-
tallicis aridis, vel acris miscatur, quia hæc multū
olei ebibunt, tum vt eorum frangatur acrimonia. De-
nique

Ceræ vi-
ces geren-
tia.

In metal-
licis ari-
dis, vel a-
cridis.

De ponde. medic. 129

nique augendum, vel minuendum pro consistentia, vel natura miscendorum, vel pro fine, & scopo. Nam si ad sedandum dolorem, vel emolliendum, vel relaxandum plus olei: si verò ad constringendum, vel siccandum minus ponendum est.

De Cera dosi. Cap. 29.

Cera in externis, magis quam internis apponi solet, quanquam non desinit, qui pilulas ex cera cōficiant, & Dioscorides cum iure forbili præcipiat, in vlceribus intestinorum. Non quælibet autem cera sine delectu est vsurpanda, cum aliqua sit quæ arte paretur, vt alba, & hæc, quia durior, ad excipiendos pulveres ponitur in masticatoriis, verū in suffumigiis, quando ex lignis, & aridis fiunt, flava & pinguior. Earum dosis est quantum sufficit ad excipienda alia medicamenta. Eligitur autem mollior, in ceratis, vnguentis, & emplastris, ad consistentiā, & liquidorū inspissationē: & hoc diuersa mensura, vt de oleo dictū est, pro forma diuersa remediorum, & pro miscendorum materia, scopo & intentione. In linimentis verò ad olea retinenda sufficit illa quantitas drag. 2. ceræ pro vnc. 1. olei. In vngentis eadem proportio seruatur, vt dictum est, & insuper drag. 1. puluerum vnc. 1. olei additur, spissat enim puluis, & vnguentum crassius reddit. In cerato maior additur quantitas cære, potissimum si nihil ad inspissandum addatur. Sed hæc omnes ex præcedenti capite, cum huius & illius separatu difficilis sit doctrina, ob subiectorum convenientiam, satis sunt nota.

Pilulæ ex
cera.

Alba.

Flava.

Mollis.

§ De

Gulielmi Rondo.

De Aceto Cap. 30.

In Ad pene-
str rationē .

Oxyrodi
num .

Vires ace
ti .

ACetum in multis remediis internis & externis ap-
ponitur, vt in externis ad repellendum, vel ad pe-
netrationē medicamentorū. Si autē ad penetrationē,
sufficit guttas aliquot tēpore inunctionis addere un-
guētis. In perfusionibus capitis, aut irrigationibus, ma-
ior quātitas addenda, pro natura morbi, aut scopo. Nā
si Oxyrhodinū paretur ad dolorē capitis, vel ad phre-
nitim, sufficit vnc. se. pro vnc. 3. olei rosati. Si verò in
principio lethargi, aut alterius affectionis soporiferæ,
ponatur vnc. i. se. pro vnc. 3. olei erit necessaria, quan-
doquidē acetū sua acrimonia, & siccitate vigilias exci-
tat, & sua partium tenuitate incidit, & attenuat. In-
flammationibus verò ad Oxycratum faciendum, vel
Oxymel, vel Syrupum acetosum simplicem, tantum
aquæ miscendum vt bibi possit. Quare relinquēdū est
iudicio pharmacopolę: nā pro natura aceti plus aut mi-
nus aquæ additur, cum aliud alio sit acidius & acrius.

De Sacharo Cap. 31.

Quātitas
sacchari .

In sirupis

Saccharum, Mel, & Sappa, multorum remediorum
materia sunt: ponuntur enim in medicamentis ad
formam inducendam, vel ad gratiam, vel ad conserua-
tionem admiscuntur: quare de singulis particulatim
erit dicendum. Sacchari quantitas varia est, pro fine,
ceu scopo, & pro remedii forma, & pro natura eorum
quibus admiscetur: alia enim quantitas in sirupis, alia
in tabellis, alia in pulueribus, alia in opiatīs, alia in
eclegmatis, ponitur. In sirupis quidem paratis ex
amaris, acidis, & acribus ad maiorem gratiam, maior
quantitas requiritur, multo maior, si ex succo paretur,
vel

De ponde. medic.

130

vel diutius seruandus sit. Quod videre licet in syru-
 pis de buglossa, qui ex succi buglossæ depurati lib. 4.
 sacchari lib. 3. paratur. Si ex succo apii fœniculi, & si
 milium, æquali proportionem miscetur saccharum. Si
 vero ex succo efficaciore, & magis acri, in maiori quā
 titate poni debet, vt si ex succo limonum, vel citri pa-
 retur syrupus, succi lib. 1. sem. addere oportet, saccha-
 ri lib. 3. Si vero ex infusionibus florum non laxantium
 æquali mensura, vt si ex floribus nenupharis paretur,
 & similibus. Si vero ex multis infusionibus florum
 laxantium, & lenientium syrupus paretur, lib. 1. infu-
 sionis superare debet quantitatem sacchari, vt si infu-
 sionis lib. 5. ponantur, sacchari tantum lib. 4. adhiben-
 da erunt, ne vis laxandi impediatur, aut minuatur. In
 electuariis alia mensura obseruatur proque natura mi-
 scendorum puluerū augetur, vel minuitur ipsius quan-
 titas. Si puluis gratus sit, quales sunt cordiales, sto-
 machici, & capitales intrinseci, pro drag. 1. pulueris,
 sacchari in aqua dissoluti, & cocti drag. 1. addimus. Si
 efficacior sit, & minus gratus puluis, maiorem saccha-
 ri copiam addimus, ad gratiam. Si vero puluis laxa-
 tiuus sit, pro drag. 1. sem. pulueris sacchari drag. 1. im-
 ponimus, quod respondet rationi quæ est inter lib. 1.
 sacchari, & eam puluerum quantitatem, quæ est ab
 vnc. 2. ad vnc. 3. In conditis additur sacchari parum, si
 conseruæ odoratæ sunt, vt in conserua rosarum, viola-
 rum, & capillorum Veneris. Si vero amaræ, vt con-
 seruæ florum cichorii. Enulæ campanæ, si acres vt an-
 thos, stœcados, saluæ, vnc. sem. sacchari pro drag.
 1. conseruarum imponenda. Quod si ex conseruis, &
 pulueribus fiant, seruanda erit proportio pulueris, &
 sacchari, habita ratione conseruarum, quod facien-
 dum quoque est in tabellis paratis ex pulueribus, con-
 S 2 seruis,

In electua-
 riis.

In cōdiri-

Gulielmi Rondo.

In opiatīs seruis, & aqua. In opiatīs raro saccharum ponimus, nisi quando sirupus ingratus est sapore: tunc enim ad

In ecleg- gratiam inducendam iniicitur. In eclegmatis expecto-
rantibus, & detergentibus ponitur in larga quantita-

In pulue- te, quia per se conuenit affectui. In pulueribus acri-
stribus. bus ut ex pipere, & zinzibere, pro drag. i. pulueris
vnc. i. sacchari additur, in dulcibus vnc. sem. maxime

quando glycyrrhizam, aut anisum puluis recipit. Si

vero ex insipidis, ut ex cineribus, vel cortice cucurbi-
tæ, paruat quantitatē sacchari imponimus, nisi quā

do dulcem facere volumus. Multum facit, ad quanti-
tatem sacchari conuenientem inueniendam, præter

scopum remedii, etiam sacchari natura. Nam in pul-
ueribus capitalibus, & detergentibus, ut supradictum

est, liberalius saccharum additur, aut si humectandum
potius quā exsiccandum, aut laxandum potius quam

constringendum. Quod autem natura sacchari au-
gendā vel minuendā indicet quātitatem, inde est,

pectāda. quod multæ sint sacchari differentiæ. Est enim aliud
candum arte factum, aliud defecatisimum & candi-

dum, aliud quod rubrum dicitur, sacculentum, & ad
mellis naturam accedens, aliud quod rosatum tabula

tum appellatur. Horum delectum habere oportet,
& quantitatē augere vel minuere, pro eo quod erit

Candum. opus. Nam saccharum candum, cum extergendum
est, aut expectorandum, aut siccandum, eligitur, & mi-

Candidif- nori quantitate miscetur, quia potenter id facit. Sac-
mum. charum illud candidissimum, defecatisimumque, mi-

Rubrum. nus deterget, & minus siccāt saccharo cando, minusque
humectat, & deterget saccharo rubro. Saccharum ve-

rosatū ta ro rosatum tabulatum minus calfacit, magis siccāt, at-
ulatum. que plus constringit propter aquam rosaceam, quare

in fluxu ventris, vomitibus, ac distillationibus sistēdis

dis conuenientius est. Tempus assumptionis quanti- Tēpus as-
tatem auget, vel minuit, vt & natura morborum. Nam sumptio -
si à cibo puluis præscribatur, minorem decet esse quan nis spectā
titatem sacchari, vt si ad effectus vteri, aut ad morbū dum.
flatulentum, aut ad vomitionem, nihil aut parum sac-
chari addere oportet, vel saccharum rosatum tabula-
tum. In pulueribus autem, & in remediis assumendis
ante cibum, saccharum candidum, vel candum, in ma
gna quantitate ponitur ad detergendum, vel relaxan
dum. In morbis flatulentis parum aut nihil, siue an-
te siue post cibum exhibeatur, quoniam flatus semper
auget. In clysteribus laxantibus, vel detergentibus In clyste-
saccharum rubrum ponitur ab vnc. sem. ad vnc. 2. vel ribus.
vnc. 3. in dysenteria verò saccharum rosatum tabula-
tum, vice mellis rosati, tutius ponitur.

De mellis quantitate.

Cap. 32.

Melle vtebantur antiqui, antequam sacchari suf- Saccharū
ficientem quantitatem haberent, verū postea- primū non
quam ratio copiosioris extrahendi sacchari adinuen- fuisse pas-
ta est, factaque palara hominum delicatiora, negle- sim vsui.
cto melle sacchari vsum introduxerunt in multis re- Cui sac-
mediorum formis, vt in sirupis, confectionibus, ecleg- charo mel
maris, in aliis deniq; quam plurimis, sunt enim eiusdē simile sit.
ferè facultatis, potissimum saccharum rubrum & mel
magis tamen deterget mel. Saccharum verò gratius
est, & aptius ad aliquas formas inducendas, vt ad ele- Saccharo
ctuaria sicca, & dura conficienda. Citius enim quā quādā po
mel, exsiccat, & induratur, & ficcatur, & indu- tius para-
ratum facilius dissoluitur, & masticatur. Sunt tamen ri.
quæ mel postulant potius, remedia aliqua, alia verò Mel qui-
quæ saccharum, alia mel & saccharum simul admit- busdā ma-
tunt. Antidota cum melle parantur, quorum descrip- gis conue-
nire.

S 3 tiones

Gulielmi Rondo.

tionibus nobis ab antiquis relictæ sunt, quanquam, nihil veraret, etiam cum saccharo vino dissoluto illa parare. Item colica etiam cum melle componuntur. Item sirupi aliqui cum melle similiter, ut qui ad effectus pituitosos, quales sunt de Stœchade, de Artemisia imperantur, & alii pectorales ex melle & saccharo conficiuntur. Mellis porrò quantitas eadem erit quæ sacchari rubri, in omnibus, in quibus mel convenit, vel ad dulcedinem inducendam, ut in amaris compositionibus, vel ad conseruationem, ut in conseruis venerè prouocantibus, quæ melle potius quam saccharo parari debent, vel quia sua facultate iuuat, ut in gargarismis, & aliis detergentibus remediis. Aliqui volunt, in antidotis, & confectionibus, pro lib. 1. mellis pulueris vnc. 2. addi. alii vnc. 3. alii vnc. 4. alii 5. vel 6. Galenus 7. Sed tres posteriores doses efficaciora, & vehementiora remedia faciunt, prima autem debiliora, media igitur erit turisima. Sed nos puluerum saporem, & odorem considerandum esse ducimus, ut si puluis valde sit amarus vel admodum acris, ponatur illa magna quantitas, præterquam in compositionibus laxantibus, & antidotis, in quibus materia non debet medicamèti vim extinguere, vel minuere, oportet enim antidota vehementissima esse, ob morbi vehementiam: tunc quia his frequenter non utimur. Adde quòd facilius est addere pulueri mel, quam iam mixtum detrahare, vel puluerem antidotis adiungere, cum mellis copia semper suppetat, pulueris non item. Quare pharmacopolæ iudicio relinquendum est, nisi quando propter aliquas occasiones pharmacopolæ incognitas, religiosius dosim, & proportionem seruare volumus.

**Côpositio
nes laxan
tes & anti
dota.**

De

Sappa in sirupis quibusdam pectoralibus, & compositionibus aliis frequenter ponitur, ut in compositione Diacodii apud Galenum ex Sappa parata. Deterget enim, & dulcis est, minusque defluxiones excitat quam mel, ob minorem facultatem detergendi. Eadem erit quantitas sacchari, mellis, & sappæ.

Sappa effi-
cacitas.

De Metallicis, & Mineralibus. Cap. 34.

Mineralia hic voco, quæcunque ex terra effodiuntur. Metallica verò quæ præterea possunt liquefieri concreta. Hæc omnia ponderibus diuersis metimur, pro eorum efficacia, & acrimonia. Quæ ergo parum efficacia sunt, magna copia imponi debent. Quæ autem possunt liquari, & emplasticam vim habent, in emplastris vices materię gerere possunt, ut lithargyrum, plumbago, & cerussa, hæc ab vnc. i. ad lib. sem. vel lib. i. vel plures imponimus. Quæ autem summæ sunt efficacitatis à drag. i. ad vnc. i. Quæ vero acriora sunt ex sese, vel ob vstionem, minori rursus quantitate imponi debent, ut ærugo, æs vstum, flos æris, diphryges etiam minori quantitate, ut à drag. sem. ad drag. 2. Quæ ex vstione acria sunt, si abluantur post vstionem, maiori copia erunt ponenda quam antea, si verò vsta fuerint, & non abluta, ut dictum fuit. Parum acria ut plumbum non vstum, sed longa trituratione in tenuem puluerem redactum, si tempore pholyx, tuthia, lithargyrum, cerussa, denique quæ sine morfu siccant, à dragm. i. ad vnc. i. ponuntur: possunt tamen maiori quantitate usurpari. Mineralia vero ut sulphur, chalcitis, alumen, chalcanthum, sanda-

Quid sint

Emplasti-
cæ.

Acria.

Parū acria

Mineralia

Gulielmi Rondo.

Caustica. racha, hæc omnia cum sint acerrima, non nisi in fortio-
ribus remediis sunt vsurpanda. Caustica, vt sandara-
cha, chalcitis, chalcantum, & chrysocolia à scrup. se.
ad scrup. i. per se imponuntur, si vero mitioribus ad-
miscantur ad drag. i. Realgal vero, quia acerrimum
est, in externis tantū vsurpatur ad quantitatem grani hor-
dei, alumē verò, & sulphur minus periculosa sunt, quæ
si in internis ponantur à scrup. se. ad scrup. i. si verò in
externis à drag. se. ad drag. i. vel plures dari possunt.

De Argento viuo & sublimato. Cap. 35.

Argentum viuum quia efficacissimum est, diuersa
mensura præscribitur, nam si ad resiccationem
tantum, siue prouocationem sudorum vt in scabie, vel
pediculari morbo, sufficit vnc. sem. pro vnc. 4. vnguen-
ti cui admiscetur, si vero ad sudores mouendos, vt in
morbo gallico non inueterato, & pro corpore tenui,
vel debili vnc. 1. pro 4. fatis erit. In fortioribus vero
naturis, & morbo inueterato, pro 4. 1. aliorū quæ vn-
guentum conficiunt, ponitur ab vnc. 1. sem. ad vnc. 2.
Sublimatum mensuratur ad drag. 1. vel drag. 2. in ex-
ternis remediis, si ad resiccationem tantum, & ad ar-
rosionem, vt in carbunculo, vel in vlceribus putridis.
Eadem quantitate accipietur si per se, & in substantia
ponatur, si vero vnguentis addatur, ad carnis putridæ
arrosionem, pro vnc. 1. vnguenti à drag. 1. ad drag. 2.
potissimum si basiliconi, vel aliis pinguibus, & oleosis
admiscetur, quod si aliis vnguentis arrodentibus, mi-
nor quātitas addetur à G. 5. ad G. 6. pro vnc. 1. aquæ,
vel vnc. sem. vnguenti.

De

L Apides diuersis mensuris metimur, vt de metalli-
cis dictum est, sunt enim aliqui preciosi, & rari, vt Pretiosi.
hyacinthus, saphyrus, smaragdus, hæc parua quantita-
te debent accipi, quia in parua mole durissimam, &
valde desecatam materiam habet, ob idque valde ef- Forū ma-
ficacem, ob efficacitatem autem solam id fieri certum teria.
est, cum fragmenta minus chara sint, quæ in pulueri-
bus cordialibus ad vnā dosim, solent vsurpari tan-
tum à scrup. sem. ad drag. 1. Sunt aliqui efficaciores, Acres.
quique acrimoniam quandum habent, ob id periculo-
si, vt lapis armenus, & cyaneus. Ii pro diuersitate
scopi, & præparationis ratione, alio atque alio pon-
dere mensurantur. Nam si in cordialibus ponatur la- Lapis la-
pis lazuli, vt in compositione alkermes vritur vt chal- zuli.
citis, & frequentius abluitur vt cadmia, & minori quā
ritate ponitur, quā non vsus, & ablutus, & quam
in medicamentis laxantibus, quare in cordialibus à
Gr. 7. ad scrup. sem. pro vna dosi, in laxantibus verò
medicamentis à drag. 1. ad drag. 2. sem. si per se, & vna
dosi assumatur in compositionibus maioribus, maio-
ri copia, pro earum videlicet quantitate, vt videre est
in confectione Alkermes, & pilulis de quinque gene-
ribus myrobalanorum, indis & pilulis de lapide lazuli, in quibus ponitur, ad purgationem melancholiæ, lo-
tus, tamen hi lapides sunt naturæ veratri, qui si in mi- natura.
nima quantitate sumuntur, in ventriculo remoran-
tur, eumque exulcerant, si in paulo maiori quanti-
tate, ventrem mouent, & purgant, multamque vti-
litatem præstant. Lapidēs vero nulla acrimonia Nō acres
præditi, vt lapis iudaicus, & lapis lincis à drag. sem.
ad drag. 1. vel duas, magis enim pondere suo calculos
detur-

Gulielmi Rondo.

Quavical
culos de-
turbent.

deturbant, quàm proprietate occulta, ob id, si tenuis-
simè triturentur, & maiori quantitate assumantur ex
vino albo, vel aqua graminis, aut aliqua substantia te-
nui quæ penetret ad renes, magno vtilique erunt vsui.

De Terra. Cap. 37.

Nō acris.

Marina :

Acia.

Terra medicamentosa eo pondere mensurari de-
bet, quo lapides, nam si acris sit, vt oca vsta, à
scrup. 1. ad drag. sem. alia autem quæ sine acrimonia
est, vt sigillata, rubrica fabrilis, bolus armena, à drag.
sem. ad drag. 2. Marina, siue quæ ex mari petuntur, si
naturam lapidis referant, pondere lapidum, aut terræ
mensurabuntur, vt corallum rubrum, & album, testæ,
ostreorum, concharum, purpurarum, & buccinarum,
os sepia & mitulorum. Si vero marina acia sint, à
scrup. 1. ad drag. 1. vel drag. 2. ponuntur, talia sunt al-
cyonii genera, & flos salis, ossa magnorum piscium,
vt siluri vel lucii, quibus in puluerem redactis vtimur,
nec non loco spodii eorum cineribus, quorum pon-
dus, cineres ossium eorum animalium quæ in terra de-
gunt, imitatur à scrup. 1. ad drag. 2.

De quantitate laxantium medicamentorum, tam simplicium quàm compositorum Cap. 38.

Difficilio
esse cō-
positorū
quā simpli-
ū quāti-
tē.

Quantitatem medicamentorum iustam inuenire
nimium esse difficilè, superius monstrauius, at
tamen facilius est in simplicibus medicamentis, quam
in compositis simplicia enim si bona sint, ferè eodem
modo operantur, at compositiones tunc maiorē, nunc
minorem suam vim reddunt: hoc autem euenit ob di-
uersam

uersam compositionis descriptionem, aut ob diuersam præparationem, aut ob aliquorum, aut omnium simplicium deprauationem, vt in Catholico videre licet: possunt enim in eo infiniti errores committi, vt potest prætermitti polypodium, vel senna, vel rhabarbarum. vel possunt simplicia sine effectu esse, aut vitiosa, idque verustate, vel alia ratione: alia enim minus tritura sunt, aut magis, propter quam diuersitatem magis aut minus operantur, vt de azaro superius dictum fuit, quod fortiter tritum vrinas mouet, crassius ventrem laxat, alia incocta, alia minus cocta, ex iis omnibus immutatur vis medicamenti compositi. Quare utilius est simplicibus vti, quam malè præparatis compositionibus: possumus enim quod non licet in his, priusquam parentur illa, eorum delectum facere, vt rhabarbari, mannæ, cassiæ, diacridii, eaque optimè præparare. Nos tamen, vbi simplicia aliquot fuerimus persequuti, præparatarum etiam compositionum communem dosim indicabimus, quam augere, vel minuire ex superius monstratis, poterit Medicus. De rhabarbari quantitate, obiter superius monstratum Rhab. fuit, siue in decoctione, siue in substantia, siue in infusione ponatur, vt de esulæ quantitate, turbit, agarici, Esulæ turbit agarici & polypodii, cum de radicum quantitate agere incipimus. polyp. Nunc de diacridii, scammonii, colocynthidis, mannæ, Laxantia & aliorum medicamentorum dosi, agendum est. Laxantia vel humida medicamenta, quæ sua humiditate, vel visciditate laxant, vel sua dulcedine, in magna quantitate administrari, debet, vt ab vnc. i. ad vnc. i. sem. talia sunt viscida te vel de pruna, sebesten, tamarindi siue oxyphoenici, mucilago psyllii, cassia, manna. Quæ verò sua acrimonia, non cedunt. Laxantia acrimonia leuiter laxant, à G. 2. ad G. 12. poni debent, vt diacridium, scammonium, colocynthis, euphorbium & elaterium.

Gulielmi Rondo.

Laxantia adstringēdo. terium. Quæ vel astringendo, vel quæ sua substantia mediocriter laxant, vt agaricus, aloë, myrobalani, omnia, media quantitate dantur, sed quo certiores sint studiōsi, de eorum singulorum agemus dosi. **Cassiaē dosi.** si recens sit, est à drag. 3. ad vnc. 1. si per os assumatur. Nam experientia sæpe comprobauit, ob largam humiditatem, tunc superpurgationem facere, si in clysteribus, ab vnc. 1. ad vnc. 2. poterit dari, si non recens ab vnc. sem. ad vnc. 1. sem. vel ad vnc. 2. secundum aliquos: quæ tamen quantitas mihi videtur esse nimia. **Tamarindorum.** Tamarindi per se, pro vna dosi, à drag. 4. ad vnc. 1. vel vnc. 1. sem. vsurpantur: non enim magis laxant quàm pruna acida. In apozemate bilem laxante, aut aliis medicamentis permixti, ab vnc. 1. ad vnc. 2. In sirupo detergente, aut refrigerante à drag. 3. ad vnc. sem. **Myxorū.** Myxa numero mensuramus, si integra sint, in apozemate quidem laxante Pa. 20. in alterante verò ad Pa. 2. vel 3. **Pulpa sebesten,** ab vnc. 1. datur ad vnc. 1. sem. **Prunorū dulcium.** Prunorum dulcium eadem quantitas est, vt sebesten. **Acidorū.** Acida pruna, vt tamarindi, mensurantur, siue ad alterandum, siue ad laxandum, siue cum passulis, & ficibus ad deterfionem, ponantur, ad Pa. 5. vt superius monstratum est, sunt ponenda. **Myrobala nos diuersis cōstare substantiis.** omnes ex diuersis substantiis sunt, ob id diuersas habent facultates, laxant enim, & adstringunt, & detergent, vt rhabarbarum. Quare separandæ sunt istæ substantiæ, pro diuersa intentione, verum multo difficilius separantur, quam in rhabarbaro. quia rhabarbarum rarū est, myrobalani verò densæ sunt, & aëream substantiam terreæ magis permixtam habent, separantur autem infusione, aut leui coctione. **Dosis ergo myrobalanorum** erit pro diuersa compositione, & materia. **Chebularū** dosi est, in substantia à dra. 2. ad vnc. 1. se.

De ponde. medic.

135

se. in infusione verò ab vnc. se. in infusione verò ab vn.
 se. ad 1. se. si per se sumatur. Indarū eadē dosi est. Em Indarum.
 blicarū dosi est à drag. 3. ad drag. 4. vel 5. in substan- Emblica-
 tia, in infusione verò ab vnc. sem. ad vnc. 1. Bellericæ rum.
 eadem dosi mensurantur. Citrinæ verò in substantia Bellerica
 à drag. 2. ad drag. 4. Infusæ verò à drag. 3. ad dra. 10. ruu.
 sed raro dantur nisi infusæ, & decoctæ, per se. In sub- Citrinarū
 stantia verò in dysenteria tantum, & aliis alui fluxioni
 bus, in quibus, non nisi in principio, damus illam ma-
 gnā quantitatem, cum corpus inanitū non est. Si de-
 coquantur, in maiori quantitate drag. 1. quam in infu-
 sione dandæ sunt, quia minuitur vis laxandi decoctione.
 Aloe vario pondere recipitur: si enim pilulis materia Aloe.
 fit ab vnc. sem. ad vnc. 1. ponetur in massa, in substantia
 verò pro vna dosi per se à drag. 1. sem. ad drag. 2. in in-
 fusione verò à drag. 1. ad drag. 3. Decoquitur etiā à nō
 nullis sed id leuiter faciendū est, & in magna quantita-
 te, si ad morbum gallicū præscribatur: habet enim fa-
 cultatem potentissimē exsiccandi, & hæc de non lota
 sunt intelligenda. Lota enim in multo maiore quan-
 titate, si ad laxandum detur: si autem ad siccandū, vel
 corroborandum, minori. Lotionē verò intelligo quæ Aloes'lo-
 fit cum aqua simplici saltem aliquo humido non laxan- tio.
 te; vt fit in pilulis ælephantinis, in quibus aloe aqua, in
 qua odorata decocta sunt, abluuntur. Si enim in deco-
 ctione aliqua laxante ablueretur, vt succo rosarum,
 minuenda esset quantitas. Manna vt cassia mensura- Manna do
 tur, secundum alios à drag. 6. ad drag. 25. Senna in sis.
 substantia a drag. 2. ad vnc. sem. decocta autem a dra. Sennæ.
 ad drag. 1. Raro infunditur, quia mucilaginosam
 infusionem reddit, quare si infundi debeat, non diu,
 sed in aqua calida id faciendum, eadem quantitate Epithymi
 qua decoquitur, si ad morbum gallicum detur, sola & Cuscu-
 in tæ.

Gulielmi Rondo.

<p>Lapidis cyaneti & armeni. Scammonii dosis. Diacridii euphorbii Castorei Colocin- thidis. Trochisco rū alādal. Catholici Diaprunis simplicis. Diaprunis solutiui. Diaphœ- nici. Electuarii de psillo. Confectio nis hamek Electuarii de succo rosarum. Diacartha- mi electua- rii de citro solutiui. Indi maio- ris. Benedi- cta, Hierę simplicis.</p>	<p>in decoctione Gaiaci ab vnc. sem. ad vnc. 1. sem. poni de- bet. Epithymus, & cuscuta in substantia à drag. 2. ad drag. 7. in decoctione verò à drag. 5. ad drag. 20. po- nitur, & hoc hyeme fit, nam æstate minori quantitate sunt danda, quia acria, & valde sicca. Lapidis cya- nei, & armeni dosis dicta est inter lapides. Scammo- nii dosis est à G. 5. ad G. 12. per se, ad aliorum verò agitationem à G. 2. ad G. 5. Diacridium, quod antiquis erat lacryma scammonii dissecta, hodie scammonium coctum, maiori quantitate usurpari potest, quia eius vis & tenuitas imminuta est, coctura in malo cotoneo facta, & ita imminuta aliquando, vt nihil ei superfit virium. Euphorbii à G. 2. ad G. 3. & secundum alios à G. 4. ad G. 12. quarum prima est tutior, quia secunda nimium calfacit, & propemodum inflamat, & for- titer subuertendo vomitionem prouocat. Castorei do- sis maior esse potest, quàm euphorbii, quare ad G. 12. usurpari potest. Colocynthidis à G. 12. ad G. 20. cum per se exhibetur, quod tamen raro fit, ob amarorem, & exulcerandi vim, quare tutior erit vsus Trochisco- rum alandal. Trochiscorum autem alandal dosis est, si per se sumantur à G. 6. ad G. 12. Catholicum & Dia- prunis simplex ferè eadem dosi dantur qua casia, siue per os, siue per clysterem sumantur. Diaprunis ve- rò solutiui dosis est à drag. 2. ad vnc. sem. Diaphenici, à drag. 2. ad drag. 5. Electuarii de psillo, à drag. 3. ad drag. 4. sem. Confectionis hameck, à drag. 2. ad vnc. sem. vel ad drag. 6. Electuarii de succo rosarum, à dra- g. 2. ad drag. 5. Diacarthami, & Electuarii de citro so- lutiui, eadem mensura à drag. 1. sem. ad drag. 6. Indū- maius, à drag. 2. ad drag. 6. datur. Benedicta, & Hie- ra simplex à diag. 3. ad drag. 5. quanquam Hiera ab vnc. sem. ad vnc. 1. dari possit, minus enim laxat quam Bene-</p>
--	--

De ponde. medic.

136

Benedicta. Quod aliqui scripserunt à drag. 1. ad drag. 1. sem. hoc fortè de pilulis intellexerunt, vel de pulueribus, in quibus nihil mellis est quod molem augeat. In clysteribus à dra. 6. ad vnc. 1. sem. vel vnc. 2. si aliis medicamentis admisceantur, si per se sola ponantur, ut in nephritico dolore, ab vnc. 1. ad vnc. 2. in primo clystere. In aliis autem ad vnc. se. tantum, laxat enim, & discutit flatus, dixi in primo clystere, ad stercora illa indurata vacuanda, sed in sequentibus non est ponenda tanta quantitas, ne acrimonia dolorem excitet. Aliarum compositionum laxantium dosis erit similis compositionibus traditis hactenus, si eundem humorem purgent, & eandem quantitatem diacridii, vel scammonii, vel colocynthidis acceperint, ab his enim, magna ex parte sumitur quantitas medicamenti laxantis.

A quibus simplici-
bus laxan-
tiū cōposi-
torū quāti-
tas potissi-
mū defu-
matur.

De Dosi pilularum.

Cap. 39.

Pilularum dosis ferè eadem est. Imbecilliorum enim quarum segnior in agendo vis est, portio magna est imperanda. Cui non imparem fortioribus quas magni morbi tantum postulant, sed fortè eandem audacter tribuimus. Inter eas autem mediis mediam, quæ non multum tamen à maxima recedat. Pilularum imbecilliorum numero Aelephanginas, de Hiera simplici, Sebellinas, Stomachicas comprehendimus, quæ à scrup. 1. ad drag. 2. præscribuntur. Hæ tamen interdum quidem vna vel duabus horis ante cibum sumuntur, sed minori quantitate, scilicet à scrup. 1. ad drag. sem. ne si magis mouerent, cibi concoctionem interpellarent, post cibum autem, à scrup. 1. ad drag. 1. vel 2. Pilulæ porro de rhabarbaro, & sine quibus,

Imbecil-
liores.

Gulielmi Rondo.

bus, & de Hermodactylis, & alijs quæ paucum diacridii recipiunt, & quæ, ob magnam myrobalanorum quantitatem, minus valide sunt, præscribuntur a scrup. 1. ad drag. 1. vel secundum Mesuem a drag. 1. ad drag. 2. sed hæc longè a cibo sumendæ. Paulo autem fortiores, siue mediæ, quales sunt Aggregatiuæ, de Sarco-colla, de Agarico a scrup. sem. ad scrup. 4. Fortissimæ vero & vehementissimæ vt pilulæ de Lapide lazuli, Lucis maiores, & minores, Foetidæ maiores, & minores, de Euphorbio, Cochæ, Indæ, Aureæ, & quæcunque elleborum, vel colocynthin, vel lapidem lazuli recipiunt a scrup. 1. ad drag. 1. vel scrup. 4. Hæc est hodie facientium medicinam cõmunis dosis: olim enim Galenus pilulas 15. dedit, pilularum ex colocynthide, quarum pondus minus esse non potuit dragm. 2. Quod si ad maximam quantitatem illam veniendum sit, quia molestum est ægrotantibus tot pilulas vna vice deuorare, vtile fore censeo mediã dosim inter magnam & paruam assumere, addendo diacridii, vel Trochiscorum alandal, ad supplendum id quod detraximus de mole, G. 3. 6. 7. vel 10. secundum vires ægri. Quod si drag. 1. harum pilularum, ob difficultatem ægrorum, tantum vsurpemus, plus diacridii in biliosis morbis. Trochiscorum verò alandal in pituitosis addemus, & melancholicis, vel lapidis lazuli tantundem. Animaduerte, fortissimarum pilularum minimam quantitatem esse scrup. 1. quia si minor assumeretur, exagitaret ventrem, & non purgaret, & nõ euacuando magis offenderent corpus, & quam pilulæ imbecillæ, aut mediæ.

Minima
fortissima
rũ pilula-
rũ quanti-
tas.

De Syrupis.

Cap. 40.

Siruporum coctorum ad perfectionem non laxan-
tium,

De ponde. medic.

135

tium, exalfacientium, refrigerantium, humectantiũ,
 ficcantium, lenientium, incrassantium, vel incidentiũ
 dosiſ erit à drag. 6. ad vnc. 2. cum dupla proportione
 aquarum, vel decocti. Tales ſunt ſirupi endiuix, Vio-
 laceus, Capillorum Veneris, de Bizantiis, & de Stœ-
 chade. Laxantes autem, vt ſirupus roſatus laxatiuus **Laxantes.**
 Violaceus ex multis infuſionibus, de fumo terræ, de
 Cichorio compoſitus cum rhabarbaro, de Epitimo,
 & de Thymo, hi omnes dantur ab vnc. 1. ſem. ad vnc.
 4. ſi per ſe ſumantur, cum aliqua quantitate aquæ affe-
 ctui accommodatæ, vel cum decoctione aliqua. Quod **Decoctione**
 ſi decocto laxatiua ſit, ſirupus poni poteſt minori pon **laxatiua.**
 dere, ſi minus quantitas aquæ minuenda, & ea uſur-
 panda quæ ſufficiet ad ſirupum ſpiſſum diluendum, vt
 commodius bibi poſſit. Si decoctione, vel aqua inuet ali **Decoctione**
 qua ex parte actione medicamenti, vel incidendo, vel **iuuans ſi-**
 attenuendo humores, vel aperiendo obſtructiones, vel **rupum.**
 ad caſtigatione alicuius vitii, ſemper pro qualibet vn.
 ſiruporu, addatur aquaru vnc. ſem. Timenda enim eſt
 maior quantitas in medicamentis laxantibus, quia vo
 mitione excitant. Sirupo roſato laxatiuo, in principio **Sirupus ro-**
 febriliũ, & in affectionibus in quibus obſtructiones ad **ſatus laxa-**
 ſunt, aqua graminis, & capillorum veneris. In affecti **tiuus.**
 bus verò pituitosis, aqua apii, vel petroſelini. Si ob affe-
 ctũ ventriculi, additur æquali cũ ſirupo quãtitate, deco-
 ctũ vel aqua abſinthii, ſed tutius datur aqua quã deco-
 ctũ, quod illa diſtillatione partes terreas, & craſſas di-
 mittat. In affectibus capitis, & neruoru cũ aqua beto-
 nicæ, vt in affectibus thoracis, cum aqua decoctionis
 glycyrrhiæ, vel hyſſopi, cõmodè exhibetur. In deco-
 ctõ autẽ mercurialis, vel ſennæ in melancholicis affecti-
 bus, & cũ magis laxare volumus, æquali mẽſura poni-
 tur, vt cum pituitã magis purgare deſideramus, cũ de-
 cocto

T

cocto

Gulielmi Rondo.

Sirupus papaueris cocto carthami syrupus papaueris ab vnc. sem. ad vn. i. cum aquis lactucæ, & violarum, aut nenupharis, æquali pondere datur, sine aliquo puluere cordiali, aut exsiccante, potestque dari talis quantitas, etiam quando apponitur Oxyrrhodium capiti, aut cum naribus iniicitur narcoticum aliquod, aut cum abluuntur pedes decocto refrigerante, ea enim quantitas sufficit, eiusmodi remediis refrigerantibus, capiti appositis, si ne medicamentis autem somnum conciliantibus extrinsecus appositis, dari potest ab vnc. 1. ad vnc. 2. in magna difficultate, & in ea dosi apponuntur pulueres cordiales à scrup. 1. ad drag. 1. vt confectio alkermes in melancholicis affectibus, aut in iis morbis, in quibus calor natiuus languidus est, ipsiusque extinctione pertimescimus. Diarrhodon abbatis, cum nimia ventriculi refrigerationem timemus: Diarisis simplex, cum retentionem materię expectorandę, aquam graminis, cum nimiam obstructionem, aut aquam capillorum veneris, vel tertiam partem sirupi eiusdem, cum retentionem, vel nimiam incrasationem materię veremur. Aquę violarum, & buglossę, in omnibus affectibus addi possunt. Sirupus hic tanta quantitate cum magna præcautione, & præmeditatione dandus est, quia pharmacopolę hunc sirupum parant cum semine papaueris albi, & nigri, unde in valde debilibus vel ætate, vel morbo, somnus profundus inducitur, natiuusque calor, hoc est vita extinguitur. Sirupus in opiatīs, & ad pulueres excipiendos, & ad dulcorandum, & vt efficaciores reddantur, ponitur, sicut in electuariis, & potionibus cordialibus. Quare illis scopis accommodatiores vsurpantur, vt in opiatīs, vel remediis ad melancholiam. Sirupus de pomis, in remediis ad pectus, sirupus capillorum veneris, in remediis ventriculi, sirupus

Prudenter esse exhibendum.

Sirupi aliis cõpositionibus miscetur.

De ponde. medic. 136

pus conseruationis corticum citri, si iuuanda sit conco-
ctio, & non ad constringendum. Si ad constringen-
dum, sirupus conseruationis myrobalanorum, vt in
læuitate, & laxitate ventriculi, & intestinorum accō-
modatior erit, vel si fortius id præstandum, sirupus de
cydonis, & in capitalibus, sirupus de stoechade, si ad
venerem, sirupus conseruæ radicum Iringiorum, vel
Zingiberis, vel Satyrionis, vel Nucum conditarum,
quantitas horum est, quod sufficit ad excipiendum in
opiatīs. In potionibus verò cordialibus, aut aliis, do-
sis est, vnc. sem. vel vnc. i. Siruporum expectorantiū,
& inspissantiū, si eclegmatis modo assumantur, quan-
titas erit cochlear vnum, si verò bibantur, dosis erit
vnc. i. vel vnc. 2. vt superius de sirupo de papauere di-
ctū est, nisi quod liberalius expectorantes dare possu-
mus quā inspissantes: minus. n. sūt periculosi. Expecto-
rantes sunt sirupus de hisso, de Glycyrrhiza, de Mar-
rubio. Inspissantes aut, sirupus de papauere de iuiubis,
violatus. Sirupus de papauere summè id facit, de iuiu-
bis mediocriter: de violis, debilitate quare augēda erit
dosis, secūdū quod minus efficaces sunt, & opus erit.

De Oxymelite. Cap. 41.

Oxymel aliud simplex est, aliud compositum, cō-
positum autē aliud aperiens, aliud laxans, aliud
detergens. Oxymel omne sequitur dosim siruporum
similium. Oxymel simplex, eadem quantitate qua su-
mitur sirupus acerosus, ab vnc. i. ad vnc. 2. in præpa-
rantibus remediis. In potionibus verò ad vnc. i. vt in
prouocantibus vrinas, & comminuentibus calculum,
si eclegmatis modo sumatur, mensura cochlearis. Itē
oxymel detergens, quale est scilliticum, eadem men-
sura

Cōpositū

Simplex

Detergē

T 2 sira

Gulielmi Rondo.

S Diureticū
p Laxans.

sura accipitur, præterea Oxy mel diureticum. Oxy mel verò laxans, vt Iuliani, aliorum more laxantium siruporum sumitur, addendo aquas, vel decocta, vt de sirupis dictum fuit, si crassius sit, si dilutius, sine aquis, & sine decoctione.

De Pulueribus. Cap. 42.

Suauiores

Efficacio
res.

Cordiales

Pulueres cordiales, stomachici, cerebrales, pectorales mensurantur secundum suam efficaciam, vel secundum formam remediorum, aut secundum ea quibus admiscuntur vel secundum scopum, vel secundum diuersam præparationem. Pulueres omnes qui suauiores sunt, si in brodio, vel aqua aliqua excipiantur, à scrup. 1. ad drag. 1. sumi debent, vt puluis diamargaritonis frigidi, Diasantali, Diarrhodon abbatris, Aromatici rosati. Efficaciores autè à scrup. se. ad scrup. 2. vt puluis diacameron, de Gemmis puluis confectionis al kermes in forma opiatæ, plusquam in tabellis, & conditis. Si vino admiscetur, vel aquis efficacioribus, vt aquæ vitæ, tunc minuitur dosis, quia citius ad cor perueniunt, & multum afficiunt. Pulueres cordiales suauiores in potionibus cordialibus à drag. se. ad dra. 1. cum vnc. 4. aquarum, & vnc. 1. sirupi sumuntur. Si verò potionibus ad humectandum, vel refrigerandum, vel conciliandum somnum parentur drag. se. sufficit, si modo absque sirupo de papauere dentur, tunc enim ad drag. 1. imponi possunt, ad obtundendam sirupi nimiam vim. Verum cum aliis sirupis, & aquis, adeo magna quantitas, humectationis, vel refrigerationis actionem impediret. In eclegmatis, & pectoralibus remediis ponuntur pulueres, Diatragacanthi, incrassantibus à drag. 1. ad drag. 3. In expectorantibus leuiter, Diaridis simplicis à drag. se. ad drag. 1. vel drag.

De ponde. medic.

137

drag. 2. Diaridis salomonis, à scrup. se. ad vnc. se. augēdo vel minnendo pro forma remedii. Pulveres in instauratiuis addūtur ea proportione, qua in opiatis, vel pro vnc. 1. decoctionis capi, puluerum cordialium drag. 1. imponimus.

De Confectionibus.

Cap. 43.

Confectiones cordiales etiam mensura præscribūtur, qua & pulveres, nisi quòd paulo maiore, ob syrū additum, vel saccharū, vt cōfectio aromatici rosati, & cōfectio alkermes dosis erit à scrup. 1. ad drag. 1. vel à scrup. 2. ad drag. 1. se. Cōfectionis alkermes varia est dosis, pro intētionē diuersa, & varia præparatione, nā si ex lapide lazuli affato paretur, ad viriū corroborationem, à drag. se. ad drag. 1. dabitur, si verò ex eodē lapide tantū abluto, & nō affato, à scrup. se. ad scrup. 1. ad viriū etiā corroborationē, cū nulla est fluxus ventris suspicio. Cū ventrem mouere volumus, & à corde atrabiliarios fumos arcere, vt in melancholicis affectibus, tunc à drag. 1. ad drag. 2. cum syrū violato, vel buglossæ, vel capillorum veneris, & eorum aquis damus: & hoc etiam in statu morborum acutorum, cum medicamenta laxantia dare formidamus, tuncque potius cum syrū violacei vnc. 1. vel vnc. 2. datur, quam cum alio quolibet, habet enim vim laxandi, & refrigerandi, & temperandi acrimoniam confectionis, ad eius autem iuuandam actionem, optimum est clysterem iniicere. Ea enim compositio, in ea quantitate assumpta ventrem mouet, nam lapis lazuli, ablutione non deponit prorsus suam acrimoniam & vim laxandi quam habet, imoretinet, vt apparet ex pilulis de lapide lazuli, & indis, & de quinque generi-

Cordiales

Cōfectio
alchermes.

T 3 neri-

Gulielmi Rondo.

I
L

Ioannes à
falco.

Archidia-
conus Va
lentiæ.

S

I
I

C

F

T
E
L

neribus myrobalanorum, in quibus etiam ablutus po-
nitur, & pulueribus paratis eo lapide ad purgandū, ob
tantumque vim laxandi, quam habet hæc compositio,
Ioannes à falco, huius Academiae Decanus eruditissi-
mus, & prudentissimus, in fluxibus ventris nunquam
dare voluit, & iusta ratione reprehendebat suos coæ-
taneos, quod in talibus dispositionibus confectio
alkermes vterentur. Ego autem superioribus annis,
vidi Archidiaconum Valentia, canonicum huiusce vr-
bis, in dysenteriam incidisse ob nimium, & frequentē
vsum huiusce compositionis. Quod autem maius pon-
tus detur assati, & abluti, quam abluti tantum, id ea
ratione fit, quia sola ablutio, in insitam, & ingenitam
acrimoniā parum vel nihil potest agere, imo ea, vstio-
ne tantum tolli potest, ex qua id empyrematis, quod
secundo contrahitur, abluione, sæpius iterata, sine du-
bio tolli poterit. In Hispania necnon apud nos in qui-
busdam officinis adhuc paratur sine vstione, quia ad-
huc antiquorum erroribus fuerunt addicti. Sed si quis
velit parare, duplicem habere debet, vnam ex vsto, al-
teram ex non vsto lapide compositionem. Confectio
de hyacintho in quibusdam locis paratur, æqualique
pondere datur quo confectio alkermes, vel etiam ma-
iori, quod eius vstus tutior sit & minus periculosus in
quibus conuenit.

De Trociscis.

Cap. 44.

TRociscorum alii palato gratiores, alii prorsus
molesti sunt, alii caustici & vrentes, alii nō vren-
tes, alii efficaces, alii invalidi, alii cum opio, alii citra
opium compositi. Sunt & qui foris tantum adhiben-
tur, & qui intro recipiuntur, qui aluum subducunt, &
eandem

eandem qui sistunt, qui sunt *ἀνασφραγιστικοί*: hoc est vena-
rum ora recludentes & reserantes, qui alii item obse-
rare & occludere deprehenduntur. Si grati sunt & mi-
nus efficaces & sine opio, & intus assumendi eorum
drag. sem. aut drag. i. pro vna dosi tantum sufficiet, vt
Trociscorum de bolo, & de Terra sigillata. Quod si
nulla omnino saporis gratia, gustui sint commendabi-
les vel magis efficaces, aut opium recipiunt à scrup.
sem. ad scrup. i. mensuram eorum præscribere tantum
licebit, eiusmodi sunt Troc. de rhabarbaro, de Eupa-
torio, omnesque etiam illi quos veteres ad effectus re-
num & vesicæ, cum opio descripserunt, ex quorum nu-
mero sunt Trocisci alkekengi. Quod autem ad Tro-
ciscorum foris ad mouendorum mensuram attinet eā
à drag. sem. ad drag. i. vel ad 2. circumscribi posse dici-
mus modo caustici non sint. Talium enim si exulcera-
te parti sint adhibendi maior quantitas est vitanda. Ea
tamen audacius admittenda cum ab iis tantum cutis
attingi debet. In qua etiam cum magna sit pro ratio-
ne partium personarūq; diuersitas, ab ea rursus augen-
dæ minuendæ ue acrium & causticorum trociscorum
quantitatis indicatio alia sumitur. Cutis enim capitis
quàm colli, partiumque aliarum, delicatiori molliori-
que cute conuestita, tum maiorem, atque etiam sana-
quàm quæ abscessu obsessa pars est, parteretur mensu-
ram. Sic etiam hominum qui in regionibus frigidio-
ribus degunt vel eorum qui vitæ institutum laborio-
sum persequuntur cutis, maiorem perferre posse vide-
tur. Accidit verò interdum vt partem aliquam tro-
ciscis istis aperire oporteat, in qua si magna sit apertu-
ra facienda maior quantitas, si verò parua, minor sa-
nè requiritur. Trocisci porro, in vniuersum exceptis
causticis rarò per se & trociscorum formam seruantes

Grati &
minus effi-
caces & si-
ne opio.

Ingrati
magis effi-
caces cum
opio.

Caustici.

Paucos
suā figurā

T 4 vsur-

Guielmi Rondo.

seruare cū
vsum ve-
niunt.

vſurpantur. Dissoluuntur enim, aut in puluerem redi-
guntur, vt potionibus, & opiatīs, colliriis, vel vnguē-
tis conficiendis accommodentur. Tantumq; de iis ad-
dendum, vel detrahendum, quantum natura eorū qui-
bus admiscetur postulare videbitur. Sic enim cū sac-
charo vel cum sirupo grato, grati assumantur, multum
illorum addere, non erit pertimescendum. Soli cæte-
rum trocisci, ad fumigia, & cauteria instituti, suam fi-
guram seruant & retinent, in eaq; quantitate quā volu-
mus, vſurpantur. Cuius generis sunt trocisci Galliæ &
Aleptæ muscatæ. Non vrentes autē Trocisci extrin-
secus apponendi & absque opio à drag. se. ad drag. i.
rectè præscribi poterunt.

De Eclegmatis.

Cap. 45.

Eclegma-
ta sine cer-
ta quā tita-
te assumi.
Modus as-
sumendi.

EClegmata parata vſurpantur sine certa quantita-
te, imperantur tamen ad vnc. 4. vel 6. præscriben-
do, vt sensim transglutiantur, accipientes quantum ba-
culo glycyrrhizæ assumi potest. Si autem ex diuersis
paretur eclegma, quæ non ex æquo conueniant, tunc
non æquali portione permiscantur, sed illius semper
maiorē quantitatem vſurpamus, quod scopo fuerit
magis accommodatum. Idem sentiendum de electua-
riis, de pulueribus, emplastris, vnguentis, opiatīs, &
ceratis, omnibus denique cōpositionibus. Quarū quan-
tatem, tantam deinde imperamus, quæ sufficiat ne-
cessario vsui, pro tempore quo opus erit. Verum, cū
minus certi erimus de ægrotantis facilitate in assumē-
dis remediis, vel quando morbi mutationes celeres
habebunt, melius erit minorem quantitatem impe-
rare, ne dum eorum iactura fiet, incassum nimix im-
pensæ sequantur.

Quātitas
medicamē-
torū quæ
ad plures
doses præ-
scribuntur.

De

Clysteres, non vna & eadem quantitate imperantur, aliquando maiore, interdum minore. Quātitatis autem modum colligimus ex corporis magnitudine, & ventris plenitudine, & à morbo, & à scopo. In proceris corporibus, & inanitionibus magnis intestinorum, imperamus lib. 2. iniectionis, vt lib. 1. se. decoctionis sit, olei verò, vel succorum lib. se. sic vt omnia adimpleant quantitatem lib. 2. In maximis & gigantæis hominibus, exceditur etiam illa quantitas. At in affectibus qui cum fluore iuncti sunt, cum volumus intestina eluere, & iniectionem citò reddi, videlicet cum detergere tantum opus est, eam maximam quantitatem imperamus, quo melius omni ex parte, intestina illa iniectione detergantur & eluantur, quæ est ad lib. 1. sem. vel lib. 2. Id etiam obseruatur in vlcere detergendo, quod præsertim altiora intestina obsedit. In aliis autem affectibus, quibus diutius clysteres retineri oportet, minorem quantitatem imperamus. Maior enim facultatem expultricem statim proritaret, nec proinde se satis diu retineri pateretur. Quo fit vt lib. sem. decoctionis iniicienda sit, aut lib. 1. tantum, in doloribus colicis, & nephriticis, & in magna excrementorum plenitudine, & inflammationibus ventris inferioris, & tumoribus, & in grauidis, & difficulter respirantibus, & quando affectus in vltima parte rectori intestini est. At in enterocèle multo minor, ne iniectione ad scrotum descendat, quod valde periculosum est, quare si cogamur clysterem præscribere, paruum iniectionis quantitatem imperamus. In aliis herniæ speciebus nihil est periculi. Idem intellige faciendum, cum ius aliquod, vel brodium nutritionis gratia ini-

Vnde eorū quantitas sic colligenda.

Affectu cū fluore

Vbi diu retinendi.

Erodium

cien-

Gulielmi Rondo.

iniec-
tū ad
nutricatio-
nem .

ciendum erit . Tunc enim iniectum omnino retineri
neceſſe eſt . Similis eſt puerorum ratio , quorum cli-
ſteres eadē , vel minore quantitate contenti ſunt . Olei
porrò & medicamentorum laxantium quæ in cliſteri-
bus recipiuntur quantitatem , cū ſuperius edocu-
erimus , nihil eſt quod huic de cliſteribus doctrinæ adden-
dū iam reſtet .

De Antidotis Collicis & Arteriatis.

Cap . 47.

Recentia
Antidota .
In vene-
ris .

Præceptor
Galenī .

Morſi à ca-
ne rabido .

Pilulæ ad
Catarrhos
ex opio .

Medica-
menta mo-
le ſuperius
meſurari .

Antidota , & colica remedia , & Arteriata ferē
omnia opium recipiunt , quare doſis alia erit re-
centium , alia antiquorum . Recentia autem antidota
dari poſſunt à ſcrup . ſem . ad ſcrup . 2 . antiqua verò à
drag . ſem . ad drag . 1 . vel duas , idque in morbis in qui-
bus conveniunt . In venenis autem , ſi ad præcautionē
dentur , ad fabæ ægyptiæ magnitudinem , ſi Galeno cre-
damus , ſunt aſſumenda , ſi poſt venenū , quantitas dan-
da erit quadruplo , vel quintuplo maior , & bis in die ,
vt euincatur veneni vis . Præceptor Galenī morſis à
cane rabido recenter , cochleare magnum dabit , iam
diu vero ante morſis , duplabat doſim , duo cochlearia
dando . Maior enim quantitas medicamenti , ad mor-
bum antiquum quàm ad recentem eſt neceſſaria , & ad
curationem morbi , quàm ad præcautionem . Pilulæ
ad catharros ex opio , quia ſolidiore forma ſunt , & diu
tius in ventriculo remorantur , dabuntur à G . 6 . ad G .
15 . & hoc ſi ſex mentium ſint , & in corpore robuſto ,
& forti . Hic notare oportet antiquos , & recentiores ,
etiam metitos eſſe medicamenta , vt plurimum , mole ,
vt magnitudine fabæ ægyptiæ , & nucis ponticæ . Id au-
tem ſimiliter facimus , cum ruſticis uſum medicamen-
torum

De ponde. medic. 140

torum imperamus : dicimus enim opiatas ex Cassia,
& Catholico ad nucis quantitatem accipiendas esse
cordialium opiatarum ad fabæ, vel castaneæ magnitu-
dinem, puluerum cochlear vnum, vel 2. vel 3. Hoc
autem fit cum non possumus habere pondus paratum,
proinde eam molem medicamento imperamus, quæ
pondere iusto respondeat. Hæc sufficiant de quantita-
te simplicium, & compositorum medicamentorum: su-
per est vt de collocatione eorum, in remediis compo-
nendis, aliquid dicamus, ad eiusq; theorematum pro-
bationem, aliquas antiquorum præscriptiones subiun-
gamus ne à nobis præcepta hæc prorsus conficta exi-
stimentur.

De simplicium medicamentorum collocatione. Cap. 48.

EXplicatis, & indicatis hæctenus dosibus tam sim-
plicium, quam compositorum medicamentorū,
de eorum in præscriptis faciendis ordine seruando, ali-
quid dicere, facturus operæpretium mihi sum visus, vt
quod aliqui longo vsu & trito, olfecerunt forsân, si id
facere non didicerunt, à quibus autem rationibus exor-
dium haberet, non viderunt, vt neque sibi certi esse de
re tam vtili, neque alios aliquid artis in ea docere po-
tuerint vnquam, alii autem omnes, vt maxima pars,
etiam alioqui docti, maximo cum ægrorum incommo-
do ignorarint prorsus, ego & theorematibus in vni-
uersum fulsirem, & peculiariter demonstrarem. Theo-
remata autem duo, mihi sunt hæc in respectanda. quo-
rum vnum, & magis necessarium, vt imperitiæ iunio-
rum pharmacopolarum subueniatur, à bene præparā-
di ratione desumetur, alterum à quantitate, vel digni-
tate

Theore-
mata duo

Gulielmi Rondo.

Primum
heorema

rate medicamentorum tam simplicium, quàm compo-
sitorum, quæ, ratione compositionis faciendæ, simpli-
cium conditionem præ se ferunt. Ad primum venia-
mus, illudq; ita constituamus. Quæcunque accuratio-
ri, & longiori præparatione egent, ea priorem locū de-
bent obtinere, hoc est si quid difficilius tritureretur, in-
fundatur, coquatur, aut misceatur, prius triturationi, in-
fusioni, coctioni, mixtioni est mandandum, quod ut in-
dicetur inter trituranda, infundenda, coquenda, miscen-
da, prius scribatur. Si autē infundendorū, vel coquen-
dorum, vel miscendorum vnum aliquod, breuiori infu-
sione, vel coctione, vel mixtione egeat, & præterea tri-
turatione, hoc postponatur duplici de causa, vna quæ
iam dicta est, altera, ut dum alia infunduntur, vel co-
quuntur, vel miscentur, hoc trituri possit, sicque nul-
la fiat temporis iactura, cuius metu sæpenumero phar-
macopolæ, tato cum scelere, omnia perturbant, ut eo-
rum quæ minus coquenda sunt, sæpe vis prorsus deper-
datur nimia coctione, cōtra ea quæ longissima coctio-
ne egent, cum eorum vis, à mediocri etiam erui non
possit, quanta necessaria est non extrahatur. Quod idē
in aliis præparandi formis euenit. Quam rationem ho-
die à quamplurimis, dicam, Empiricis negligi appa-
ret, qui infundunt simul, & decoquunt gaiaci rasuram,
santalos, cinamomum, sennam, & alia multa, quorum
vel ea quæ sunt odorata, & laxantia vim suam amit-
tunt, vel alia non satis decoquuntur, vel vtrunque con-
tingit. Secundum Theorema est, ut ea, quæ maiorem
sui quantitatem toti compositioni tribuunt, & nobilio-
ra sunt, priorē sedem occupent, quod est erutū ex præ-
scriptis antiquorum, qui in componendis medicamen-
tis hoc solum spectarunt, tantum excipientes ea quæ
materiæ vice, aliquando in fine colloquantur. Ut vi-
dere

Coctionis
ratio quid
possit.

Empirici.

Secundū
heorema

Mos anti-
quorum.

De ponde. medic.

141

dere est in descriptione pilularum de hermodactylis apud Mesuem: recipiunt enim primo ordine hermodactylorum drag. 5. deinceps alia in mediis sedibus sequuntur, pro maiori, & minori quantitate, tandem aloë, quia materiæ vices gerit, ad drag. 10. ponitur. Idem factum est in pilulis sebellinis, in quibus spicardi ponitur in prima sede, ob quantitatem, & nobilitatem. In Aromatico rosato maiore ex descriptione Gabrielis, rosæ in prima sede positæ, reliqua copia superant. Idem in Antidoto Philonis, apud Mesuem, piper album, & hyoscyamus, obtinet, in qua compositione manifestè apparet ordo medicamentorum seruandus secundum maiorem & minorem quantitatem, ita vt maxima quantitas primo loco ponatur, minima vero vltimo, cum piperis albi, & hyoscyami hic recipiantur ana drag. 20. opii drag. 10. croci drag. 5. spicæ, pyrethri, castorei ana drag. 1. In Theriaces descriptione, hoc palam fit, sed quia ea est longior, vt quæ mos antiquorum melius innotescat, non metædebet separatim, finito hoc capite, eam transcribere, & crassa minerua excutere doses, cum albi exactè eius castigationem, & rectum componendi modum, proprio opusculo, tradam, & daturus sum Deo præstante aliquando. Verum, vt ad rem præsentem redeamus, animaduertendum est antiquos, posteaquam se ita collocationi petendæ à sola quantitate addixissent, vidisse demum, rationem præparandi, & in hac re ordinem esse apprimè necessarium, coactosque fuisse multa verborum congerit explicare, quod ipse in scribendo ordo indicare potuisset, & is mos eos excusauit in magnis compositionibus faciendis, cum neque forsan solus ordo satis id indicasset. Sed cum in illis, quæ ad horas præscribuntur, hoc fieri non liceat, neque etiam ipsi

Theriaces
descriptio

Antiquorum
mos.

Gulielmi Rondo.

Ineptus
nos.

Rectus or
do.

Materia
locus.

ipsi fecerunt in iis, quæ nobis scripta reliquerunt, nisi admodum paucis, in eo, quod mox dicturus sum, totus collocationis cardo vertetur, vbi annotauero, antiquos minus benè, & competè fecisse, qui aliquando dosim medicamentorum, quorum idem ordo erat, diuiserunt, vt in Theriaca videre est, rosarum siccarum drag. 12. iridis illiricæ drag. 12. cum per anna, quod sic notatur âna vno numeratore designare potuissent. Nec mihi minus ridendi, qui idem hodie faciunt, nisi id præparationis ratione fiat, videntur. Igitur, secundum theorema priori adiungentes hunc ordinem in præscribendo constantissimè obseruemus, vt primo ordine collocemus ea, quæ longiori egent præparatione, in hoc autem rursus id cōsideremus, vt eandem præparationem postulantium ea primum ponantur, quæ maiorem copiam requirunt. Eandem præparationem, & quantitatem requirentium, & mensurandi modum vt lib. vel vnc. vel M. vel P. ea prima collocetur, quæ commoditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet vt manum præscriptionibus admouentes, nullo pacto hæreamus mente, ab hōcne, vel illo ordiendum sit, sed, cognito scopo, medicamenti que proprietate, & nobilitate, statim ab eo quod opus est, iniitiū faciemus, id quod erit vice materiæ, siue vnum, siue plura id faciant, si in eo vel coctio, vel infusio, vel mixtio sit facienda totius compositionis. Primum omnium: si autem infusum, vel decoctum, vel tota mixtio iam facta, ei sit adiungenda, vltimum, quantecunque sit copiæ, & quantitatis collocemus. Quod vt exemplo aliquantulum illustremus, id petamus à re quæ est frequentior, videlicet plantarum partibus, vt cum earū radices duriori sint substantia, & magis cruda, longiori que decoctione, & trituratione egeant, proinde in

De ponde. medic.

142

in prima sede ponantur, præcipuè quæ aperiunt, & incidunt, tum ligna non odorata, & cortices, deinde folia herbarum: tertio loco fructus: quarto semina: ultimo flores, & quæcunque sunt odorata, vel laxantia, quod facit vt radices inde patiantur exceptionem, laxantes enim primo loco non ponuntur. Denique ratio præparationis tantum potest, vt nihil tam generale adferri possit, quod frequenter non patiatur aliquid peculiaris, & singularis doctrinæ, vt si quid ad alicuius medicamenti meliorem, vel faciliorem actionem faciendam, vel castigandam adhibeatur, cuiuscunque sit quantitatis, id quod habet castigandum illico sequatur necesse est, vt eius vis non nisi castigata, & melior facta, ne tantillum quidem extrahatur, vt zingiber, & sal gemmæ mox post agaricum, spica, & cinamomum post rhabarbarum, castoreum crocus, & myrrha post opium, & sic de similibus.

Quid pos-
sit præpa-
randi ra-
tio.

Theriaces Descriptio.

Recipe.

Pastillorum scilliticorum

Pastillorum theriaco-
rum

Magmatis hedychroi

Piperis longi

Opii

drag. 48.

} ana drag. 24.

Rosarum siccarum

Scordii Cretensis

Seminis Napi

Iridis Illiricæ

Agarici pōtici

Cinamomi

Dulcis Radiculæ succi

Opobalsami

} añ dra. 12

Myrrhæ

Gulielmi Rondo.

Myrrhæ
Crocī
Zingiberis
Rhapontici
Rad. quinquefol.
Neperæ
Marrubii
Petroselini
Stœchados

{ añ drag.
6.

Polii Cretensis
Seseli
Styracis
Seminis Apii
Thlaspi.

Ameos
Ahamædrios
Chamepitheos
Succi hippocistidos
Malabattri
Nardi Gallicæ
Rad. Gentianæ
Seminis Anisi

{ añ drag.
4.

Seminis dauci
Galbani
Sagapeni
Opopanacis
Mellis attici

{ añ drag. 2.

lib. 10.

Vini falerni, quantum sufficit

Costi
Piperis albi
Piperis nigri
Dictamni Cretensis
Floris iunci odorati
Thuris
Terebinthinæ
Casia fistulæ
Nardi Indicæ

Mei Athamantini
Seminis fœniculi
Terræ Lemniæ
Chalcitidis tostæ
Amomi
Acori Rad.
Phu Pontici
Fructus Balsami
Hyperici
Acaciæ succi
Gummi Arab.
Cardamomi

Bituminis Iudaici
Castorei
Centaurii tenuis
Aristolochiæ tenuis

Quare pri-
mi ordi-
nis tanta
quãtitas .
Primum, id animaduertendum est quod in prima acie
est positum, esse in maxima quantitate: id autem factũ
fuit forte, quod medicamentum ex scilla, scopis magis
conuenit, facta enim est hæc compositio primum ad
venena,

venena, & morbos contumaces, & diuturnos, sed Trochisci de scilla venenis frigidis manifesta qualitate aduersantur, item puncturis, & moribus venenatorum animalium. Nec minus valet ad humorum contumaciam: tales enim morbi sunt à crassis, frigidis, & viscidis humoribus, vel in remotis, & profundis partibus sitis, ad quas causas valet potissimum scilla incidendo, attenuando, & ad altas partes penetrando, digerendoque humores crassos. In secundo ordine, Trochisci theriacales, & Magma hedychois cinamomum, piper nigrum, vel longum, sed longum magis conuenit, & descriptio quæ legitur apud Galenum ad Pisonem, & apud Auicennam longum habet, tum descriptio carmine scripta, conuenit enim magis antidotis longum, si Dioscoridi credimus. Hæc omnia cum Trochiscis de scilla, & ad venena, & ad morbos contumaces, conueniunt. Opium autem in hac descriptione, ut præcedentia ad drag. 24. ponitur, quia hæc compositio ad dolores sedandos parata est, vnde nomen sibi γαλήνη *γαλήνη.* quod transcribunt Latini galene, comparauit, quia tranquillitatem adferat, & propter vim opii, & ad veneni præcautionem, & ad curationem facit, ut ex Galeno colligimus. Velet enim Theriaca, eodem teste, cum recens est ad venena, cum vero antiqua ad morbos diuturnos. Quod si recens valeat ad venena, id fit propter vim opii, quæ maior est in recenti quam in antiqua. Et mihi placet Iohannis Schironii ratio nostræ Academiae Cancellarii eruditissimi, qui dicebat opiū additum istis magnis compositionibus, magis esse ad vires calidorum medicamentorum conseruandas. Calida enim, & quæ tenuium partium sunt, continuo exoluuntur ab aere ambiente, quæ semper agit in medicamenta. Quare cum tot sint in hac compositione

V calida,

Secundus
ordo.

γαλήνη.
galene.

Theriaca
recens.

Antiqua

Ioannes
Schironius
opiū


De ponde. medic.

calida, & anodyna fortissima esse debeant, nemini mirum esse debet, quod ad drag. 24. opium posuerint. Hanc rationem non norunt, qui ex Tryphera magna opium expungunt, etiam si ad effectus vteri præscribatur. Nam si tantopere narcotica verentur, cur mandragoræ corticem non expunxerunt? non enim minus vtero sua frigiditate aduersatur, quàm opium. Sed hos missos faciamus, & ad reliqua veniamus. Iris illirica, & glycyrrhiza, opobalsamum, rosæ aridæ, scordium, semen napi, vel rapæ agrestis quod magis conuenit, vel quia minus aduersantur venenis, vel minus cōueniunt quàm supradicta, vel ad meliorem actionem tantum, adhibentur, dosim habent dimidiam secundæ doseos, vt secunda primæ item est dimidia, scilicet drag. 12. Quæ sequuntur drag. 6. recipiunt, hoc est dimidium præcedentis dosis. Quæ sequuntur hanc, eadem quantitate ponuntur, sed censeo omnia iungenda, quæ eiusdem sunt quantitatis, alioqui sunt duæ classes eiusdem ponderis in eodem medicamento, quod ridiculum, vt iam dixi. Quinti verò ordinis pondus est drag. 4. quia quæ ponuntur in hac classe, partim ingrata, partim cara, partim efficacissima sunt, quare si præcedentium copiam essent secuta, maior eorum quantitas fuisset quàm par erat. Chalcitis enim suo odore, sapore, adstrictione periculosa est: alia autem sunt efficacia valde calfaciendo, vel adstringendo, quare minori quantitate posita fuere. Quod si præcedentem progrediendi modum secutus fuisset, prioris dosis dimidium sumendo, minor iusto quantitas fuisset assumpta, ob id non drag. 3. sed drag. 4. posuit. Quæ sequuntur, vel quia foetida, vel suo sapore, vel consistentia ingrata ad drag. 2. ponuntur, dimidium scilicet proximè præcedentium: sunt autem semen dauci, bitumen, opopa-

opopanax, castoreum, centaureum minus, & aristolochia, hæc efficacissima sunt, & ingrata, quare minima quantitate, & vltima sede ponuntur. Vnde apparet illius theorematis veritas, quo docebamus efficacissima, & ingrata, & cara, & scopo minus conuenientia, in parua quantitate esse imponenda. Quod autem mellis lib. 10. ponat, ostēdit illud theorema verum esse, quod de materia remediorum diximus, nempe materiam vel quæ materiæ vices gerunt, quantitate reliqua medicamenta superare debere. Quod vinum addiderint sine quantitate, id factum fuit, quia quantitas indicari non potest, ponenda proinde ea erit quæ necessaria est ad diluendam medicamenti spissitudinem. Mel enim inspissat, conseruat, & dulcorat tantum, & quia aliquando crassius, aliquando liquidius, aliquando etiam plus vini, aliquando minus imponimus. Quare nemini mirum esse debet, si semper vini, mellis, sirupi, sacchari, olei, & ceræ, quantitatem non annotemus, sed quod sufficit dicamus. Hic præterea notare oportet, herbas pondere mensurari, quia siccæ vsurpantur: item radices, fructus, flores, semina, & lacrymas etiam pondere. Chalcitis semi vsta in hoc re medio ponitur, quanquam inter venenosa annumeretur, valet enim ad fungos. Multa etiam alia hic annotare possem, quæ in castigatione huius nobilis compositionis docuimus. Sed quia hæc præter institutū sunt, silentio prætereo: poterunt enim commodius in officina pharmacopolarum, quam paramus, doceri. Itaque huic libro finem imponemus, qui erit vice proœmii illis, quos de formis remediorum tam internorū, quàm externorum post hunc mox, Deo propitio, sumus daturi.

Finis.

V 2



145

L A V R. I O V B E R T V S,
Medicinę Doctor, Medicinę
studiosis S.



T Benignum & plenum
ingenui pudoris est, fa-
teri per quos profece-
ris : sic per humanum
& decens esse arbitror,
quam methodum in cu-
iusvis artis exercitio cer-
tam & foelicem proba-
ueris, ad eam reliquos
adhortari, qui sibi pro-
positæ finis consequen-
dæ modos anxii medi-

tantur. Id vero in Medicina, si quis alius, ego facile
possum, qui multos annos sub variis præceptoribus ei
operam satis diligentem nauavi, Lutetiæ, Monspellii,
Patauii, Ferrariæ, & Bononiæ, Italicæ, nominatissi-
mis Europæ Academiis : in quibus Medicæ artis peri-
tissimorum & exercitatisimorum ducum beneuolen-
tiam ac consuetudinem pro animi voto abundè exper-
tus sum. Verû me nullius magis, quàm R O N D E-
L E T I I nostri doctrina, omnibus ritè examinatis
(absit inuidia dicto) retinere potuit. Non præter in-
genii acumen & dexteritatem, præter iudicii acrimo-
niam & experimentorum propè infinitorum memo-
riam, præter remediorum diuersitatem & excellentiâ,
quibus nobis admirandus venit : ea est R O N D E-
L E T I I facilitas, & in instituenda iuuentute since-
ritas ac vigilantia, ut meritò ab omnibus Medicinę pa-

V 3 rens

rēs habeatur, à quo hereditatis legitimam portionem
longè locupletissimam referant, quos ille adoptarit.
Equidem inter eos postremus esse non videor, qui tan-
ti viri liberalitate amplissima, conuictuque & collo-
quio familiarissimo, quādiu placuit, frui potuere, quiq;
inde vberimum fructum reportarunt, ex eius discipli-
na in Medicis officiis gloriæ plurimum adsequuti. Nā,
quam me olim RONDELETIVS docuit, scriptoq;
tradidit morborum dignoscendorum & curandorum
regulam, religiosissime obseruans, iam ferè scepten-
nium Medicinam exerceo. Vnde præter haud vulga-
rem famam faustis & sæpe inopinatis successibus par-
tam, amicorum in multis regionibus iustum numerum
(vt iuterim de lucro, quod Medicum non decet, nihil
dicam) mihi comparauit. Nostri ergo æmulatione ac-
censi, ò iuuenes, RONDELETII certissimam
facillimamque methodum amplectimini: ab ea ne la-
tum quidem vnguem (quod aiunt) discedite: RON-
DELETII non libros, sed thesauros auidius expe-
tite, concessos memoriæ scriniolis secretioribus inclu-
dite, vt cū erit opus, reclusos in humani generis sa-
lutem foeliciter dispenseris. Hunc, quem in lucē pro-
dire finit, alii multi (vt speramus) breui comitabun-
tur, quorum nobis iamdudum copiā fecit, & per quos
plurimum ἐν ἰατρικῇ profecisse fatemur. Non equidē
inuideo, nec de præceptore conqueror: vt ferunt Alc-
xandru regem ægrè tulisse: quòd disciplinas ἀποαμα-
τικὰς libris foras editi inuulgasset Aristoteles, quibus
ab eo ipse eruditus foret. Quin RONDELE-
TIVM hortor, vt quod se, id est Magnificum in re
Medica imperatorem decet, omnibus Medicinæ stu-
diosius vel amplius quàm nobis, si fieri possit, bene fa-
ciat, & futuro quoque æuo prospiciat, neque id tam
immor-

immortalitatis studio (et si dignissimo virtutis aculeo) quàm liberalitatis & cādoris nōmine, quibus hic torus effulget. Nam sibi satis glorię iam quæ fuit, posset quę desinere, ni animus inquires pasceretur iis operibus quæ humano generi profutura videt, quæ quę suis laudem maximam adferre posse nouit. Hunc ergo numinis instar colite, *φιλᾱτροι*, qui Medicinā facturi ducem quæritis: huius Theoremata præceptiones quę, velut ab oraculo petitas sententias excipite, ut quę de vobis & nobis omnibus in dies magis ac magis bene mereatur, R O N D E L E T I O nostro firmam sanitatem & animi tranquillitatem iucundissimam, ad Nestoreos annos precamini. Valete.

F I N I S.

Handwritten text in a medieval script, likely Latin, covering the upper portion of the page. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a larger or bolder script, possibly indicating a heading or a significant section. The ink is dark and the paper shows signs of age and wear.

3211

147
THOMAE DE GARBO

TRACTATVS


II.

I. DE REDVCTIONE

Medicinarum ad actum.

II. DE GRADIBVS

earundem.



P A T A V I I,
Apud Gratosum Perchacinum
M D LXIII.

THOMAS DE GARDIO

TRACTATVS

II

DE REBVS

IN REBVS

DE REBVS

IN REBVS


IN REBVS

IN REBVS

IN REBVS

IN REBVS

IN REBVS

Tractatus de reductione Medici-
narum ad actum.

QUONIAM nihil cha-
rius, ac vtilius existit,
quam breuissime loqui,
dicit Galenus 4. de inge-
nio sanitatis: ideo ad v-
tilitatem studentium vo-
lentes aliqua iuxta ma-
teriam minimam facul-
tatem in materia medi-
cinę excutere, Tractatū
quendam breuem quan-
to plus poterimus, cōsti-
tuemus, præcipuè duę materię pertractantes. Inqui-
bus modica difficultas non existit apud nostrum debi-
lem intellectum. Et primo inuestigatio erit de re-
ductiune medicinarum ad actum. Secundo, qualiter
& in comparatione ad quid medicinę in diuersis gradi-
bus reponantur. In primo inuestigabili tot fuerunt
iam opiniones, quot capita; & ideo recitabimus so-
lemniores eas pertractando. Gentilis N. de fulgi-
neo in quæstione, quam de hoc disputat, longiorem fa-
cit quam plurimum tediōsam. Conciliator enim dif-
ferentia 44. in medicinis calidis cum Galeno concor-
dat, quod ponetur. De frigidis autem dixit, quod re-

Thomæ de Garbo

ducuntur ad actum per quandam antiparastasim. Nā ipsa circundata à calore nostro innato, quasi per modum antiparastasis vnitur, & congregatur in sui virtute concitata à suo contrario: Vnde vigorata, & augmentata in operationem prodit, in quam prius non poterat, quemadmodum accidit de calce, cum aspergis eā aqua frigida. Post hanc opinionem non procedamus quia satis in propatulo est renuēda. Et licet forte proteruē posset sustentari. Galenus autem pro certo est opinatus, si quis attentē attendit eius dicta, primo & tertio de simplici, & tertio de compositionibus, quem Dynus tanquam euangelium sequitur, & eius mentem perfectē elucidat 2. can. & nimis prolixē, quod medicine tam calide, quā frigide possunt dici respectu corporis nostri tales in potentia, cum non agant primo occurſu. In hoc tamen diuersificantur, quia medicine calide dicuntur tales in potentia essentiali, quia verē à corpore nostro acquirunt effectiuū principium, scilicet calorem actualē, per quem alterant corpus nostrum. Hęc autem caliditas in diuersis medicinis à nostro calore generatur diuersa, & diuersorū graduum, non ex diuersitate agentis, cum in vnico corpore non sit nisi vnus calor, sed hoc est ex diuersitate patientis, ex sua diuersa mixtione elementorum apti nati diuersimode ab agente vnico aliter & aliter transmutari. Vnde non est inconueniens ex dispositione passi qualitatem in eo intensiorem induci, quā actualiter sit in agente. Et talis est aptitudo receptionis huius caloris in medicinis à corpore nostro, quod vna medicina in quolibet corpore quantum est de per se, est apta nata simpliciter ad eundem gradum caloris, quę quidem sic reducta diuersimodē diuersa corpora propter eorum diuersitatem transmutat, vt post apparebit, cum
de

de gradibus loquemur. Per accidens autem, & ex ali-
quibus conditionibus annexis, potest vna medicina in
diuersis ad maiorem caliditatem transmutari, sicut pa-
ter de melle dato seni, & iuueni. Quod autem medi-
cinę calidę non sint tales actualiter, sed à corpore re-
cipiant, patet; quia tunc ipsę agerent primo occurso,
etiam aliqua medicina, in qua abundat plus actualis ca-
lidas, quàm alia, est minus calida respectu nostri, vt
patet de musto & vino antiquo, sicut etiam in multis
mineralibus, videtur exuberare actualis frigiditas, &
tamen respectu nostri sunt medicinę multum calidę.
Medicinę autem frigidę solum dicuntur tales in po-
tentia accidentali, quia frigiditatem per quam nos al-
terant habent à se, nec à nobis acquirunt. Cùm corpus
nostrum eas calefaciat, non infrigidet. Calor autem
non generat frigus de per se. Indigent tamen ad hoc
vt possint nos alterare ad minima diuidi, & rarefieri,
& euaporari, vt possint ad intrinseca corporis pene-
trare, & in ipsum agere. Cùm melius fiat actio per
contactum: vnde calor noster solum eis comparatur,
vt extrinsecū dās ei motū, & penetrationē cōmunem.
Quod Gale 3. de simplici vocat motum de foris. Et
propter hoc, tertio de complexionibus dicit, quòd ea
quę infrigidant non mutantur à corpore, nec parum,
nec multum: & intendit quantum ad principium effe-
ctuum, per quod nos habet infrigidare. Vnde si possi-
bile esset, quòd in eis fieret prædicta diuisio, & euapo-
ratio absque hoc, quòd calefierent adhuc plus infrigi-
darent: ex calefactione tamen illa est iuuamentum
maius in infrigidatione, quàm prohibitio infrigidatio-
nis ex calefactione. Ex iis apparet quomodo frigidę
medicinę possunt dici respectu corporis nostri, tales in
actu, & quomodo tales in potentia. Contra istam
opi-

Thomas de Garbo

opinionem arguit Gentilis, & dicit argumētum suum firmiter demonstrare, vel insolubiliter concludere. Arguit, In entibus naturalibus non est minoris essentiae forma caloris, quàm forma frigoris; sed reperiuntur res, de quibus loquitur, quæ de se habēt principium in frigidandi, nec id acquirunt à calore nostro: igitur & res debent similiter reperiri, quæ in se habent principium calefaciendi, siue formam caloris: nec oportet ut id à calore nostro acquirant. maior est ubique Galeni, qui vult, quòd caliditas inter omnes qualitates sit efficacissima, & minor est sua, ut iam prædictum est. Mirādum est de tanto viro, quomodo ceciderit in tam vili medio, dicens illud demonstrationem esse. Primo enim si sua forma sit syllogistica, ut eam construit, minor non sumitur à maiori, ut patet cuilibet Logicam intuenti. Et ideo sua ratio equiualeat huic consequentiæ, quæ satis est debilis: forma caliditatis non est minoris perfectionis forma frigoris. Igitur si res frigide sunt actualiter frigide, res calide etiam debent esse actualiter calide. Nunc autem nulli dubium est, quòd hoc consequens nullatenus sequitur ex antecedente illo: Nam licet actualiter calor concedatur esse perfectior forma frigore actuali: nullius consequentiæ robore sequitur. Igitur cum ista est actu, & illa debet esse. Amplius ratio hæc, quam sic arduam appellat, non aliud concludit, nisi quòd quærit reductionem causæ cuiusdam potentiæ per illam opinionem. Quare si medicine frigide sunt actualiter frigide. Calide autem solum in potentia: Ad quod respondemus, si prædictam sequamur opinionem, quòd caliditas cum est multum consumptiua rationabiliter non poterit naturaliter in aliquo subiecto reperiri actualiter, nisi vel in elemento simplici, in quo non est cum aliquali contrarietate

rietate ad suum subiectum. Cum non sit elementum
corrumpi ab intrinseco, vel in mixto, in quo est anima.
In quo quidem est regeneratio naturalis caloris. Et
propter illud animata possunt cum decenti tempore
perdurare. In aliis autem si fuisset actualis caliditas,
breuissimo tempore perdurasset propter eius velocē
consumptionem. Cum igitur natura intendat ad con-
seruationem rerum, quas producit, quanto plus potest
prædictas res non facere actualiter calidas, sed poten-
tialiter tantum. Res autem frigidas potuit conserua-
tione earum tempore concedenti, vel actualiter face-
re: cum non sit qualitas consumptiua subiecti in quo,
vt per se notet. Ipse autem huic rationi dat tres solu-
tiones, & eas impugnat, quæ mihi non placent. Opi-
nio autem ista, scilicet nobis non placet, & vnum pre-
mittimus, quod in hac materia non possibile est bene
secundum aliquam opinionem demonstrare, nec forte
aliquem demonstrantem mediis impugnare. Sed illi
potius intendemus, quàm probabilius & magis verifi-
mile potest induci. Primo enim opinio Galeni est re-
nuenda quantum ad medicinas calidas, in quo dicit,
quod non agunt primo occurso, nisi prius corpus agat
in eas. Nam experientia manifestè apparet, quod si
accipiat piper tritum, vel euforbium, & approxime-
tur linguæ, statim ipso primo occurso mordicat lin-
guam, & calefacit: sed quod sic subito lingua in illis
tantam generet caliditatem apparet multum extra-
neum. Et confirmatur. Nam non citius manus si ap-
proximetur vni calido actuali, vel etiam lingua ab il-
lo calefieret, & percipiet eius caliditatē, quàm faciat,
cum si approximatur euforbium tritum, vel piper, & si
milia; & hoc potest quilibet experiri. Igitur ista
ta agunt primo occurso, sicut illa quæ sunt talia actua-
liter,

Thomas de Garbo

liter, & per consequens ita habent formam, per quam agunt in actu, sicut & illa, & istud similiter experitur, cum prædicta approximantur alicui parti vlcerate, & munde, seu nude à sordē. Amplius satis forte signum est, quòd illa non ad talem actualem gradum calefiant à corpore, quia medicina calida in quarto postquam operatur in corpus, & reducta est ad actum, si euomatur inuenitur sub caliditate tepida & non intensa. Et licet hoc posset dici de vaporibus, & subtilioribus partibus eleuatis ab illa &c. Amplius simile videtur his quæ calefiunt à corpore nostro in eo, quod dicitur. Et de rebus, quæ exterius calefiunt. Et est hoc, quòd agens cæteris aliis partibus fortius in eodem passo, videtur intensiorem effectum inducere. Nam licet vna res ex sui dispositione intrinseca sit apta ab vno agente plus calefieri, quàm alia. Ista tamen mer à fortiori agente calido prius debet calefieri, quàm à minori: ergo si forma qua medicina agit, exhibetur à calore nostro, sequitur quòd caliditas vni medicinæ exhibet à corpore calido sit valde intensioris gradus, quàm à corpore temperato, vel frigido. Et sic destruerentur multa principia Galeni. Primo, quòd medicina calida in primo non conseruabit corpus calidum in primo. Secundo, quòd plus alterabit illud corpus, quàm corpus frigidum, & multa similia principia, quæ apud eū sunt falsa, vt patebit in secunda parte huius Tractatui cum loquemur de gradibus, & ibi referuetur. Et confirmatur illud principium assumptum, non enim videtur magis inconueniens, quòd sicut medicina aliqua propter sui præparationem paruam recipit de calore ultra gradum caloris nostri corporis, sicut ex formatione caloris in vno corpore plusquam in alio ad intensiorem caliditatem habeat in illo reduci. Et vult cum illud, in quo

quo causa appareat, quod idem passum à vehementiori agente vehementius patiatur cæteris aliis partibus. Negare istud principium, esset quoddam dictum ad placitum irrationale multum. Prædicto autem principio firmo, tota opinio Galeni destruitur, ut intuenti patebit dicta eius de gradibus. Dicta autem opinio quantum ad medicinas frigidas pertractabitur in sequenti opinione, quæ illud idem affirmat. Gentilis autem in solutione huius dubii tres ponit modos, quorum quilibet sibi placet. Et primus est, quod omnis medicina tam calida quam frigida non alterat nos, nisi per principium, quod in se habet in actu. Frigida quidem quia naturaliter actualiter est frigida: & calida, quia verè actualiter calida. Et ideo prædictæ medicinæ solum dicuntur tales in potentia ad actum secundum, non autem ad primum. Ad hoc autem respondet ipse adducens multas rationes satis leues. Prima, complexio medicinarum est ex principiis alteris constituta se ipsa, ergo se ipsa est actiua. Secunda, medicinæ habent actu formas substantiales perficientes materiam: ergo actu habent complexionem. Tertia, non sunt minoris existentiae qualitates tangibiles, quam visibiles, odorabiles, gustabiles, sed istæ sunt actu, ergo & illæ. Adducit enim rationem supra factam ab eo, contra Galenum, quam dicit fortem valde. Alia ratio. Illa qualitas est principium actiuum in medicina, per quam inuestigamus signum sumptum à facili, vel difficili congelatione, vel inflatione, vel dolore, vel odore, & similibus prius illa res nobis occurrit, sed per ista inuestigatur nobis actualis caliditas, vel frigiditas in illis existens, ergo. Alia ratio, medicinæ extra se transmutant se ipsas per accidentale principium, quod habent, sicut patet in fermentatione tyriacæ, ergo cõsimiliter transmutant

Thomæ de Garbo

mutant nos. Iste modus dicēdi, salua sua reuerentia, sustentari non potest, & assumo vnicam solam rationem, quam ipse contra se facit, quæ concludit absq; dubio, & eius solutio ad eam prorsus est nulla: Et licet ipse multipliciter contra se instet, alias dimitto, & ratio est ista. Si medicinæ tam frigida, quàm calida sunt actu calida & frigida, tunc agerent in nos primo occurso. Vnde tangendo eas manu, nos calida calefacerent, & frigida infrigidarent. Cuius contrarium expresse experimur. Et apparet consequentia, quia si medicina multum calidior manu mea in sui natura nō est alterata ipsa manu appoximata vehementer eam calefaceret. Ita vult de quacunque re actu calida, apparet: & sic etiam de actu frigida. Immò tunc actiui sufficienti approximato passiuo disposito non fieret actio, quod est absurdum. Ad istam rationem primo ipse respondet, quòd ideo nō agit primo occurso, quia indigent tempore antequā agant. Sed pro certo istud nihil est dicere, quia si piper tota die teneretur in manibus, non calefaceret manum caliditate de qua loquimur. Secundo soluit, quòd medicinæ prædictæ indigent subtiliori, si debent agere, vt attingant corpus: sed istud non valet, vt ipse instat, quia saltem debent illud, quod immediate attingunt alterare, sicut patet de quolibet alio actuali calido. Ad istud soluit, quòd qualitates elementorum nos possunt transmutare statim cum occurrunt, non indigentes alia dispositione. Sed complexionibus mixtorum non possunt hoc agere, nisi acquirant quandam subtiliationem. Et hoc, quia illæ sunt tales sub actu proprio, sed complexionibus illas continent in virtute. Ista solutio est aliquantulum rudis. Primo, quia ista opinio ponit, quòd licet complexio non sit qualitas simplex, tamen complexio calida est actua-

actualiter apud me calida, aliter non possent dici tales in actu, ut asserit. Etiam hæc dicta irrefragabiliter re-fragantur, quia ad sensum videmus, quod absque omni subtiliatione corpus flegmaticum calefit à colerico. Et tamen utrunque habet qualitatem non simplicem, sed commixtam. Igitur oportet, quod aliter sit calefactio corporis à medicina calida, quam corporis vnius à corpore alio calidiore illo, quod nullatenus præfacta opinio explicare non poterit secundum modum prædictum, nihil aliud ponendo. Aliter etiam prædictam rationem soluit, & dicit hanc esse solutionem meliorem, quod forma complexionalis approximata cuiunque speciei mixtorum de sui natura habet quod nõ agat, nisi associata tali forma, scilicet subtilior subiecto, nec hoc est magnum mirum, cum videamus multas formas non agere, nisi multis aliis associatis, sicut calor requirit lucem, sicut dicitur de stercore lupi, si suspendatur cum pelle lupi, vel cum lana ovis euadentis lupum, quod cõfert in colica, & multa alia similia. Sed in veritate ista, quam affirmat veriore est multum rudior. Nam reliquum est valde deformis specificis, quæ agunt in determinatum subiectum, & de istis primis qualitatibus, & hoc siue sint simplices, siue commixtæ, quod manifestè apparet, si vnum corpus, ut colericum contingat flegmaticum, ut prædictum est. Et sic de quocunque actualiter calido, ut sensibiliter est videre. Singulariter autem absurdum videtur, & irrationale de medicinis frigidis, quod sint actu tales, quia ut alii dicunt etiam sicut opium assumptum si postquàm suam operationem facit, euomatur, non inuenitur actu frigidum, sed tepidum. Sed quod res existens actualiter tepidi caloris infrigidet, tunc per frigiditatem actualem est absurdum, nec potest dici bene, quod in-

Thomæ de Garbo

frigidet, per vapores trāsmissos, quia illi vapores sunt etiam actuali tepiditate, sicut patet de vapore aquæ, quousque est sub forma vaporis. Et fortè ad hoc diceret Galenus, quòd prædicti vapores tunc cùm sunt sub tepida caliditate non infrigidant, sed postmodum cùm ad membra peruenerint reuertantur ad frigiditatem actualem, quemadmodum etiam balneum dulcis aquæ infrigidat, quia aqua intra corpus ad suā frigiditatem reuertitur. Et quomodo hoc sit, sic esset materia extrinseca, ad quam modo non intendimus. Rationes autem supra positæ non soluuntur, quia intelligentibus loquitur. Alia est etiam in hoc quæsito opinio, quam etiam Gentil. affirmat. Et est Auer. collig. s. ad literam: & est quòd tam medicinæ calidæ, quàm frigide sunt tales in potentia essentialiter respectu corporis nostri, quia in se non habent nisi in potentia receptam illud, quo calefiunt, vel infrigidant. Fiunt autem actu tales à corpore nostro per hūc modum, quia sicut cibus calidus calefacit, quia cōuertitur in chylum calidum, sic frigidus infrigidat, quia cōuertitur in chylum frigidum, & sanguinem &c. idest diminutè calidum: & in hoc est differentia cibi ad medicinam, & conuenientia quædam cibi, & medicinarū ex vna parte ad ea, quæ sunt venena ex alia parte, cùm ista solum transmutent, & non transmutentur. Differentia autē cibi, & medicinarum est, quia cibus sic in chylum & sanguinem & humiditates conuertitur, quòd vltimo vnitur substantiæ membri, & corpori nostro. Medicina autem quæ non est cibus, sic cōuertitur in chylum & sanguinem, quòd vltimo non vnitur membro, & ideo æquiuocè dicitur sanguis, & chylus, & humiditas secunda de illis, in qua conuertitur cibus, & de illis, in quam conuertitur medicina: Et ideo inter est differen-

differentia, quia cibus nunquam potest fieri sanguis, nisi prius fiat chylus, nec potest fieri humiditas secunda, nisi prius fiat sanguis. Medicina autem posset conuer-
ti in sanguinem, & licet non fiat chylus, & in humidi-
tatem secundam, & licet non fieret sanguis. Et ex hoc
ipse soluat reductionem medicinarum frigidarum ad
actum extrinsecus approximatarum, quas non oportet
ire ad epar, vel stomachum, vel aliquid eorum, ut fiat
chylus, & sanguis. Possunt enim in humiditatem secu-
dam conuer-
ti extrinsecus in poris, & licet non prius
fiat chylus, vel sanguis ex ipsis, & sic ad actum reduci.
Sed licet pro certo hæc opinio sit tanti viri, Auer. non
acceptatur. Et primo, nam frustra fit per plura, quod
æquè bene potest fieri per pauciora, sed omni illo mo-
do potest medicina calida calefacere, & frigida infri-
gidare, quo ipse potest ponendo prædictas medicinas
non transmutari, secundum formas substantiales ad
chylum, vel ad sanguinem, &c. Sed solum qualitates,
ut bene patet intelligenti. Igitur frustra ponitur ista
transformatio, & confirmatur. Nam est supra-
dictum. Videmus piper, & similes medicinas ipso pri-
mo occur-
su ad linguam agere, calefacere, & pungere.
Et satis videtur inopinabile, quod sic subiecto primo
occur-
su sit facta transformatio in humiditatem secun-
dam, cum valde magna sit distantia inter piper, & præ-
dictam secundam humiditatem. Et licet ista dicatur
æqui-
uocè ad illa quæ sit ex cibo, quæ sit inter sanguine
& humiditatem secundam. Cum transmutatio ad san-
guinem sit præparatio magna ad prædictam humidi-
tatem, sed in conuersione sanguinis ad humiditatem
prædictam requiritur tempus satis magnum, igitur &c.
Et si quis affirmaret illud est ponere ad placitum, quæ
admodum similimodo posset poni, quod in omni actio

Thomæ de Garbo

ne cuiuscunque agentis per contactum non fit actio, nisi cuius agens, vel pars eius in aliud transformetur, nec contrarium posset probari, quod est satis absurdum. Et confirmatur. Et sumo propositionem Auer. met. Et hanc instantiam Gentil. facit contra eum. Calor naturalis non habet aliquam viam generandi frigiditatem, igitur non habet viam dandi medicinis frigidis illud quo nos infrigident. Cum aliquæ medicinæ nos infrigident, sicut aqua: & est contra ipsum. Respondetur, sicut respondet Gentilis, quod medicina frigida non verè frigida, sed est diminute calida in comparatione ad nos. Calidum autem diminutum approximatum calori habet illud infrigidare, & secundum diuersam diminutionem illud plus & minus infrigidare: Quæadmodum potest reperiri fluxio suo diminuto calore occidens, vt in syncopali humerosa. Sed pro firmo secundum hoc nõ oportet ponere medicinam conueri in chylum, & sanguinem, &c. Cum per illum diminutum absque tali conuersione possit nos infrigidare, sicut facta conuersione. Secundo secundum hoc oportet tenere, quod in opio, & in quolibet mixto nos quãtũcunq; infrigidante, licet in comparatione ad nos sint frigida absolute. Tamen ipsa erunt plus calida, quàm frigida, quod esset satis graue sustinere. Sed hoc esset extra propositum principale. Et sicut vides dicta Auer. sunt satis dicta ad placitum absque fundamento alicuius medii. Et si dicatur, quod isto modo, nos infrigidat cibi frigidi, & cibi calidi. Certe dicendum quod non, immo prædicta nos alterant, quia conuertuntur in chylum, & sanguinẽ, &c. Illud enim inest eis pro quanto participant rationem cibi, & à materia agunt: sed nos alterant pro quanto participant ratione medicinali, quam quid alterationem facerent, sicut aliæ medicinæ

dicinæ. Et quantūcunque non fieret in eis conuersio in chylum, vel sanguinem, vel humiditatem. In quantum enim sunt medicinæ hoc accidentaliter eis inest. Tertius modus dicendi est etiam Gentilis, quem d. fuisse opinionem Auic. Et est, quod medicinæ quæ dicuntur tales in potentia, habent suos modos complexionis diuersos, secundum diuersitatem earum. Et quod tales complexionones sunt in eis in actu, sed tamen ipsæ non possunt cum eis venire ad operationem calefaciendi nos, vel nos infrigidandi. Et ideo dicuntur tales in potentia respectu nostri, sed cum calor calefecerit illas, tunc calor datus eis stat sicut forma, & perfectio. Et tunc ex complexione prima, & calor dato integratur vnum principium actiuum, & tunc agunt frigida infrigidando, & calida calefaciendo. Et est simile, sicut de membris corporis nostri, quorum quædam sunt calida & quædam frigida, quæ in operationem exire nō possunt, nisi actuata à calore eis trāsmisso à corde, ex quo cum ipsa complexione innata sit vnicum principium actiuum in eis. Iste modus ponendi habet difficultates iam supradictas. Quantum enim ad medicinas calidas concurrit cum modo Galeni, & non ex toto: quantum ad medicinas frigidas quasi cōcurrit cum modo Auer. Et licet ille non ponat transmutationem in substantia ad chyli formam &c. vt ille. Vnde secundum istum modum, sicut secundum illum oportet tenere quod forma caloris à nostro calido, medicina exhibita est illa, per quā medicina nos infrigidat. Et quod quælibet medicina quātūcūq; frigida absolute sit plus calida, quā frigida, licet nos vehementer possit infrigidare. Et in summa ad hanc opinionē sequitur, qd aliqua res per caliditatē sibi additā possit multo plus infrigidare, quā sine illo calore poterat, quod videtur

Thomæ de Garbo

absurdum, cum calor contrarietur frigori. Et quare
à sic opinante Auer. In medicina antequam in eam ope-
retur calor innatus, absolute loquendo, abundet plus
calor quam frigus. Et semper loquor de calore & fri-
gore actuali, ut ipsemet loquitur: ergo per additionem
caloris calor suus debet plus augeri, & frigus remitti.
Et per consequens postmodum minus infrigidare, si dica-
tur quod in ea abundet plus frigus quam calor. Igitur per
eam minus abundat frigus exhibito sibi illo calore: ergo
tunc debet posse minus infrigidare, quam prius, quo-
rum nullum sequitur ad illud, quod post ponetur à no-
bis. Alia est opinio Plusquamcommentatoris integ. & est
opinio, quæ magis adheret illi, quod credimus esse ve-
rum, quam aliqua aliarum. Et opinio ista est, quod me-
dicina tam calida quam frigida, quæ dicitur esse talis
in potentia, non reducitur in corpore nostro ad actum
caliditatis vel frigiditatis, quia tam medicina calida,
quam frigida si euomatur cum suam facit operationem,
non inuenitur sub illa caliditate, vel frigiditate, vel si-
mili illi, quam inducit in nos, sed inuenitur sub tepidi-
tate. sed medicina calida in corpore nostro reducitur
ad actum calefaciendi, & frigida ad actum infrigidan-
di. Et ideo medicina quælibet cum à corpore reci-
piat tepidum calorem, per illum non agit, quia tunc non
calefaceret corpus, sed reuerberaret similem calidita-
tem ei, quam habet, nec etiam ipsum infrigidaret. Et
mouet dubium, quomodo potest esse, quod corpus no-
strum exhibeat medicinis calidis & frigidis actum ca-
lefaciendi & infrigidandi, cum sit vnicum agens, &
non sit frigidum, nec habeat principium infrigidandi.
Solut, quod agens æquiucum patienti potest induce-
re multas formas, vel actus, quos vel quas in se non ha-
bet: & hoc secundum diuersitatem recipientum, sicut
pa-

patet, quòd Sol & ignis dealbat, & quædam denigrat. Et tale agens est corpus nostrum respectu medicinarum: & ideo potest inducere in vna actum calefaciendi ultra eum, quem ipsum habet: in alia actum infrigidandi, quem non habet. Et ex hoc vna potest calefacere ultra quàm ipsa sit calida, & infrigidare cum non sit in se frigida, immo vna & eadem medicina à diuersis agentibus poterit diuersos actus recipere, vnde in diuersis faciet diuersos effectus. Et totum hoc accidit propter diuersas proportionales vnius rei ad diuersa & diuersarum rerum ad vnam, quæ proportionales soli nature sunt cognite. Nos autem discimus eas experimento. Ista opinio remouetur à Gentile, quia calor noster in medicinis nō agit, nisi vel subtiliationem vel rarefactionem, vel tepidum calorem: sed per primum non essent tales in potetia, sed in actu, vt supra patuit, nec per illum calorem agunt, vt ipse dicit: ergo calor noster nihil in eis agit, per quod ipsæ in nos agant. Et confirmatur, dicit ipse. Quid intelligis per actum istum calefaciendi, vel infrigidandi, vel secundum. vel aliquam formam in medicina, quo istum actum facit, non primum, quia non est principium actionis, non secundo modo, quia natura res in medicina inducitur à corpore nostro, nisi vel subtiliatio, vel rarefactio. Et hoc non. Cum de hoc etiam ipse reprehendat Galenum, Vel calor. Et hoc non. Cum per illum tepidum calorem non agat, vt asserit. Istas rationes faciliter solueret Plusquā cōmentator, & per verba sua consequenter oporteret dicere: Ex quo dicit, quòd corpus nostrum est agens equiuocum dans ei actum calefaciendi, & infrigidandi. Et quòd per illum tepidum calorem datum eis non agunt, quòd à corpore nostro medicinæ calidæ, & medicinæ frigidæ ultra illum tepidum calorem

Thomæ de Garbo

rem datum eis exhibetur quædam qualitas, vel quædā forma, quæ non est actualis frigiditas, vel caliditas differens multum à medicina calida vel frigida, à qua qualitate, vel forma, à medicina calida procedit actus calefaciendi, vel habet actum calefaciendi, & frigida actum infrigidandi, & tunc cessant instantiæ factæ, cùm aliud addetur eis, quàm diuisio, vel calor tepidus. Si autem queratur, quæ qualitas est ista. Certe est de innominatis qualitatibus, quibus ita consequenter videtur respondendum, si quis vult huic inniti. Et tunc pro certo remanet difficultas, quia sicut calor non videtur habere viam infrigidandi, & faciendi frigus (per se loquor) cùm dictione illi sit contrarius. Ita inconueniens videtur, quòd à calore producat per se forma, quæ de per se sit inductiua veri, & multum intensi frigoris, quod secundum perfectam opinionem debet concedi, & maxime incōueniens videtur per calorem inductum in re, res de per se acquirat vim infrigidatiuam. Ponamus igitur nos, quod credimus esse verum in hoc quæsito satis antecedenti opinioni inherentes. Et licet diuerso modo in aliquibus. Et hæc opinio maxime roboratur per abnegationem antecedentium opinionum, & ideo breuiter aliqua dicam Resumentes autem aliquas circa hoc ponemus conclusiones. Prima conclusio, quòd forma, per quam operantur medicinæ in corpus nostrum non exhibetur eis à corpore, hoc iam patet. Et licet de calidis non sic bene posset probari, sicut de frigidis patuit. Tamen in opinione Galeni de frigidis autem habitum est. Nam quòd calor generet frigus, vel illud à quo per se prouenit frigus, satis videtur extraneum. Ex qua conclusione statim sequitur, quòd medicinæ agunt per formam actua-
lem, quam in se habent, quia ex quo illam à corpore no-
stro

Istro non recipiunt, nulli dubium est, quod ab alia cau-
 sa non recipiunt. Secunda conclusio, quod medicinæ
 non agunt in corpus nostrum per formam, quæ com-
 munitur appelletur actualis caliditas, vel actualis fri-
 gidity, quia tunc agerent primo occurſu in tactum sal-
 tem excellentis de eis, sicut faciunt alia calida & frigi-
 da excellentia. Istud patet, quia in iudicio de calido
 & frigido natura est melior regula, quam sensus ta-
 ctus. Et maxime, ut Galenus secundo de complexio-
 nibus. Tertia conclusio, quod medicinæ agunt in cor-
 pus nostrum per formam, quam in se habent actuali-
 ter, quæ quidem forma, vel qualitas in calidis medici-
 nis non est formaliter caliditas saltem similis ei, quam
 inducit. Sed est talis caliditas virtualis. Nam quæ-
 dam agentia dicuntur talia, qualis effectus est forma-
 liter, quædam solum virtualiter. Et talis est prædicta
 forma. Et similiter in frigidis medicinis prædicta qua-
 litas, seu forma non est actualis frigiditas, sed in vir-
 tute solum. Et ista conclusio quantum ad primam par-
 tem patet ex prima, & quantum ad secundam ex secun-
 da. Et ex hac conclusione solvuntur inconuenientia,
 quæ videntur sequi ad alias opiniones, quomodo sci-
 licet medicinæ possunt calefacere in primo, secundo,
 tertio, & quarto gradu. Et quomodo frigidis medi-
 cinis à calore non exhibetur frigiditas, nec forma, quæ
 de per se sit infrigidatiua, & multa, quæ inconuenien-
 tia apparebant. Quarta conclusio est, quod prædictæ
 qualitates, quæ tales sunt virtualiter, & non solum in
 medicinis, sed in quibuscunque aliis mixtis dicuntur
 qualitates tales absolute, sed cōparatiuè, quæ in com-
 paratione ad diuersa diuersos, & alios forte contra-
 rios effectus habent inducere. Et hoc maxime expe-
 rientia est notum. Hoc autem ideo propter diuersam
 pro-

Thomæ de Garbo

proportionem diuersorum mixtorum adinuicem, quæ quasi est variabilis in infinitum, vt pater ab Auer. 5. colli. quæ quidem diuersa proportio non est propter aliquam diuersitatem in materia complexionali vnica cadentem, cum ipsa sit vnica qualitas sicut qualitas simplicis elementi, quod quid quomodo sit, declaratum est à nobis in commento nostro de differentiis febrü. Sed illud accidit propter varietatem mixtorum in suis numeris diuersimode ad inuicem comparatorum. Et quantumcunque naturæ illæ simplices existant, quæ diuersa comparatio à solo Deo comprehensibilis est. Quinta conclusio est illa, quod ista talis virtualis qualitas potest dici forma specifica, & hoc cum ipsa iam posita sit non esse de primis absolutis qualitatibus, & cum ipsa agat sic determinate in vnum, quod non in aliud: prædictæ tamen medicinæ à Med cis dicuntur comparari à qualitate, quia agunt in corpus nostrum effectum similem qualitatibus primis, vnde nos infrigidant, calefaciunt, exsiccant, & humectant vt ea, quæ primis qualitatibus sunt affecta, & licet non similiter & omni modo. Sexta conclusio, quod illa talis virtualis qualitas calefactiua, vel infrigidatiua, & sic de aliis qualitatibus plus habet esse in quibusdam partibus medicinæ, quàm in quibusdam aliis. Et hoc est propter diuersitatem medicinæ, sicut & aliorum mixtorum. Mixta enim non sunt in suis partibus vniformia, sicut elementa. Et ex hoc soluantur aliqua, quæ apparent de operationibus medicinarum extra approximatarum. Septima conclusio, quod prædicta qualitas virtualis non quomodocunque nobis approximata operatur in corpus nostrum, sed cum corpus nostrum ingreditur a medicina, vel etiâ medicina extra posita secundum sui partes intrinsecas penetrat. Et hoc quia

De redu.med.ad actum


157

quia prædicta qualitas non est absolute in nos actiua
sicut agentia, quæ talia formaliter calidum vel frigi-
dum: & licet nos non tangat, nos tamen alterat alte-
rando medium multo amplius nobis immediate ap-
proximando. Octaua conclusio, quod quædam medi-
cinæ possunt dici ad actum à calore nostri corporis,
pro quanto actio caliditatis nostræ in eas vehemen-
ter iuuat, ad operationes earum inducendo eas, diui-
dendo, & rarefaciendo, & subtiliando. Ex quo vehe-
menter possunt intrinsecas partes corporis penetrare.
Et talis operatio vehementer iuuat medicinas exterius
approximatas subtiliores partes medicinæ attrahen-
do, & faciendo intrinsecas penetrare, vt q. ex hac tali
operatione possumus dicere calorem nostrum excita-
re virtutem medicinæ, & licet in eis prædictam virtu-
tem actiuam non generet, quod Auic. videtur intelle-
xisse in quodam verbulo in secunda fen illi primo cap.
Loquamur nunc de causis, vnde loquens de iis, quæ
operantur per qualitatem d. Quod autem hoc est,
quia talia sunt in effectū, aut actu, aut propter q. qua-
litas hoc est in potentia. Sed calor innatus qui est in
nobis commouet virtutem agentem in ea, & ipsam ad
effectum. Et notantur dixit commouet, & non gene-
rat, vel facit. Ex qua conclusione patet, quod licet illæ
medicinæ habeant in actu principium per quod agunt,
ipsæ tamen plus possunt appellari tales in potentia,
quàm ea quæ sunt talia formaliter, quia non quomodo
cunque agunt, sicut illa, sed oportet quod intus corpus
nostrum penetrent: quod in medicinis exterius appro-
ximatis est per operationem caliditatis in eis. Et simi-
liter illæ quæ interius assumuntur ad hoc vt bene pos-
sint corpus alterare, oportet quod in membrum pene-
trent, & quod secundum sui partes, in quibus maxime
est

Th. de G. de red. med. ad act.

est prædicta virtualis qualitas maxime mēbrum con-
tangat, & immisceatur, sicut patet de grano piperis
cūm integrum transglutitur, quod quid non multum
calefaciet, nisi colligitur, & conteratur, vt secundum
sui partes possit in membri poros penetrare, & super-
fici ei membri adherere. Et hoc volebat sexta conclu-
sio si eam perpendis. Et quia talis euaporatio, & diui-
sio fit ā calido nostro, hinc est quòd respectu nostri pos-
sunt tales in potentia appellari. Et licet etiam absque
omni tali operatione interius approximatae medicinæ
operentur, licet non tantum. Et hoc quia respectu no-
stri ipsæ interius penetrantes habent eorum virtutem
in actu, sicut patet de pipere & consimilibus agentibus
primo occurru ad linguam. Et hoc est quod nobis
apparet dicendum in hoc primo quæsito. Et licet
adhuc multa essent excutienda quæ aliter gratia breui-
tatis omittimus, dantes ex iis eis vias inuestigandi al-
terius.

De gradibus Medicinarum.



N Quæsitio de gradibus, quod erat secundum inuestigabile qualiter & in cōparatione ad quid medicinæ reponantur in gradibus fuit opinio Galeni, quam sequitur. Et voluit Gal. 3. de complexionibus, quòd talis sit medicinarum ad corpora, qualis corporum inter se. Et similiter cō-

parantur inter se, sicut corpora inter se comparantur. Sicut ergo omnia corpora distemperata dicuntur talia, calida, frigida, humida, & sicca in cōparatione ad temperatum. Et in tali vel tali gradu dicuntur in cōparatione ad temperatum, ita omnes medicinæ dicuntur calidæ, vel frigidæ, vel siccæ in tali vel tali gradu, in cōparatione ad temperatum corpus. Temperata enim medicina talis dicitur respectu temperati corporis: & ideo quemadmodum corpus aliquod respectu temperati aliquod corpus calidius habet remittere, & infrigidare, sic etiam medicina calida primi gradus supra

Thomæ de Garbo

pra temperatum corpus calidum in secundo in suo calore remittet, & in frigidabit. Nam minus calidum respectu corporis appellatur frigidum. Nam si medicina diceretur talis, ut calida, & talis gradus, ut primi vel secundi in comparatione ad totam latitudinem humanæ speciei, sequitur quod calida in primo calefaceret corpus calidum in secundo, & quod calida in secundo calefaceret corpus calidum in secundo. Et quod temperata, omni corpori esset temperata, & multum similia, quæ omnia sunt absurda: cum minus calidum remittat maius calidum, vel etiam intensius: cum etiam corpora suis similibus conferuntur. Corpora etiam cum sint valde diuersa in suis propriis temperamentis diuersis valde temperamentis medicinarum indigeant. Et confirmat Galenus hoc per exemplum valde manifestum de vrina approximata cum mingitur homini in frigidato, cui apparet calida, & approximata homini existenti in thermis calefacto, cui apparet frigida, & in frigidat. Cum igitur in comparatione ad diuersa corpora vnica medicina dicatur diuersarum complexionum contrariarum, & contrarios habeant effectus inducere, videlicet quod talis complexionis, & talis gradus dicatur in comparatione ad aliquod medium in comparatione ad aliquod dicatur vnus complexionis, & vnus gradus. Tale autem medium non est in corpus temperatum in comparatione ad quod etiam talia corpora distribuuntur. Et habent in se medicinæ similiter inter se, sicut & corpora. Et ideo medicina vnus gradus remittit eam, quæ alterius gradus existit, quemadmodum debent quod ea, quæ primi gradus ei, quæ tertii adiuncta reducit illam ad secundum gradum. Et vult Galenus, quod similis est compositio medicinarum ad corpora sana, & ad corpora ægra: cum
secundū

De gradibus medicinarum. 159

secundum diuersas ægitudines corpus diuersificetur in calore & frigore, & gradibus diuersis: & ideo vult quòd aliqua medicina frigida non multum, vt quæ primi gradus competeret in ægitudine frigida intensioris frigiditatis, sed non sufficienter illam curaret, cum non tantum distet à temperato ad contrariam qualitatem, quales debent esse causæ curatiuæ. Et ex iis habet ponere hæc opinio, vt supra dicebatur, quòd medicinæ quæ reducuntur ad actum propter suam aptitudinem potentialem quantumcunque vnica earum diuersis administretur corporibus, ipsam ad gradum eundem in quolibet corpore reduci, & quantum est de per se. Nam si medicina calida primi gradus supra temperatum, & in temperato corpore ad primum gradum reducta, in corpore calido in primo nō reducetur etiam ad primum gradum solum respectu temperati, sed ad intensiorem gradum propter caliditatem corporis, sequitur, quòd corpus calidum in primo non cōseruetur per medicinam calidam in primo, immo ab illa alteretur ad vltiorem caliditatem, quod est contra præfatam opinionem: Immo sequitur, quòd medicina calida in primo minus alteraret corpus frigidum, quàm corpus calidum in primo, hoc est fundamentum, cum hoc corpus frigidum in primo reduceretur ad temperatum, vt patet in tegni, corpus autem calidum in primo habeat cōseruare, & cōseruatio non est alteratio, & patet consequentia, quia in corpore frigido reducetur ad caliditatem valde minorem supradictū corpus, quàm in calido corpore. Prædicti autem gradus ab auctoribus ponuntur esse quatuor, & quilibet ipsorum ponitur habere tres mansiones, & ponunt vltius, quòd medicina vnius gradus potest ad vltiorem gradum agere per multam reiteratam exhibitionem

Y

ne n

Thomæ de Garbo

nem, vel per multam quantitatem eius. Hæc omnia quasi dicta extrahuntur ex dictis Galeni 3. de complexionibus si perpendis bene eius dicta: Sed illa opinio multis ex viis est renuenda. Primo per rationem superius contra opinionem Gale. de reductione medicinarum calidarum ad actum, quod medicina vna in diuersis corporibus ad diuersum actum debet reduci, quæ ratio multum est apparens in quibuscunque rebus deducatur, nisi solum in proposito daretur instantia, quod videtur dictum ad placitum solum, respice eam supra: & confirmatur. Nam si aliqua medicina calida infrigidaret aliquod corpus, sequitur quod quanto pluries prædicta medicina sibi exhiberetur in quantitate materiali, tanto plus infrigidaret illud, quod videtur absurdum. Et tenet consequentia, quia sic per iterationem, & quantitatem maiorem frigida medicina exhibita corpori temperato, illud ultra gradum sibi debitum infrigidat, sic ex quacunque alia medicina respectu illius corporis, respectu cuius ponitur esse frigida: illud continuè magis infrigidabit. Et confirmatur experientia manifesta, quæ negari nõ potest. Nam nulli dubium, quod corpus aliquod cuiuscunque complexionis sit, siue calidæ, siue frigidæ, cum febricitat ex multis rebus calidis inflamabitur valde, ex quibus cum erat sanum non inflamabatur, immo etiam corpus calidum, quæ sibi erant temperatæ: Cum tamen prædicta opinio tenere habeat, quod ex illis non inflamabitur, sed potius ex illis in caliditate remittetur, & infrigidabitur: Et confirmatur, quia ex aliquibus febricitat colericus, ex quibus non febricitabit flegmaticus; ergo medicina, quæ calida erit in tertio gradu respectu colerici, non erit calida in tanto gradu respectu flegmatici, cum in eo effectû tertii gradus non faciat

De gradibus medicinarum 160

faciat, sed primi, vel secundi. Cuius tamen cōtrarium prædicta opinio habet tenere. Et licet hic posset dici quòd in flegmatico faceret maiorem permutationem, si longior tempore administraretur, & in quantitate sufficienti, quæ duo in flegmatico plurimū requirūtur, propter ipsum illi medicinæ plus resistere. Istud tamē potest remoueri, quia auctores nunquam posuerūt sci re & reponere medicinas in gradu, nisi per effectum procedentem ab eis. Cui ergo ab omnibus quomodo-
docunque administratis, à quibus inflammatur flegma-
ticus in aliquo gradu per experientiam valde plus in-
flammetur colericus: Iam videtur argumentum præ-
fatum permanere. Et confirmatur, quia tunc sequitur
quòd medicina calida in tertio gradu inducens febrem
in homine temperato: si postmodum cūm febre sibi
approximetur, non amplius calefaciet ipsum, quod vi-
detur absurdum. Tenet consequentia, quia cūm cor-
pus factum sit sibi in caliditate simile ab ea nō amplius
alteratur. Et hoc dico quantum est de per se. Et con-
firmatur, quia per prædictam opinionem ponitur, q̃
medicina in primo, & sic de aliis multotiens data, vel
in quantitate multa potest ad alium gradum alterare.
Sed sumo medicinam calidam in primo, quæ per quan-
tatem multam, vel multoties datam calefaceret cor-
pus temperatum vltra primum gradum vsque ad me-
dium secundi: tunc si iterato detur sibi non debet ip-
sum calefacere, immo remittere calorem illum, cūm
ipsa sit minus calida: immo etiam sequitur, quòd post
quam calefecit illud vsque ad primum gradum nō am-
plius per iterationem, vel quātitatem multam debeat
illud calefacere; cūm iam in calore sint similia, & æ-
qualia. Et à simili in forma, & gradu res non patitur.
Est & alia opinio, quam in breui tangit Plusquamcō-
mentator

Thomæ de Garbo

mentator in teg. quòd medicinæ reponuntur in gradu in comparatione ad totam latitudinem humanæ speciei, vt v. g. medicina calida in primo omne corpus calefacit in primo gradu, sed non qualitercunque, sed est secundum diuersam eius quantitatem. Nam maior quantitas eius requiritur ad hoc, vt calefaciat flegmaticum, quàm colericum. Sic ergo omnes medicinæ talis vel talis gradus dicuntur in comparatione ad omnem hominem. Et licet prædictum effectum in diuersis hominibus inducere habeant secundum earum doses diuersas, quod contingit propter diuersitatem complexionum in diuersis corporibus existentium, illam tamen opinionem ipse firmiter nō assentit, si bene perpendis. Ista opinio sic breuiter prolata, videtur multum confusa, & licet hanc credamus veram, quia primo quæritur de medicina temperata, An illa medicina, quæ temperata est, corpori temperato in illamet quantitate sit temperata corpori calido, vel distemperata, sed quòd in eadem quantitate sit sibi temperata, sicut, illi non videtur: Cum illa corpora sint multum diuersa, si est sibi temperata, vel erit calida, vel frigida; si frigida, tunc videtur reuerti ad opinionem Galeni. Et simili ratione medicina calida in primo respectu corporis calidioris, vt respectu corporis calidi in secundo, poterit frigida appellari, quod punctaliter reuertitur ad id, quod Galenus est opinatus. Quod autem respectu illius corporis calidi medicina temperata non est calida, notum est per se. Et confirmatur, quia sicut aliqua medicina est temperata, aliqua calida plus, & aliqua calida minus, ita etiam corpora diuersificantur, quia aliquod est temperatum, & aliquod calidius temperato in aliquo gradu, & aliquod plus. Igitur sicut aliqua medicina est temperata corpori temperato,

De gradibus medicinarum 161

rato, ita aliqua distemperata videtur alicui distemperato temperata, & per consequens non quolibet erit in gradu tali vel tali in cōparatione ad omne corpus. Et confirmatur, quia quantumcunque aliqua vna res comparatur pluribus rebus in qualitate sua multum diuersis, impossibile videtur, quòd illis æqualiter comparetur. Cum igitur vnica medicina comparetur omnibus corporibus humanæ speciei & calidis & frigidis, cum sint inter se multæ diuersitates, impossibile videtur, quòd respectu omnium illorum in vnico gradu reponatur qualitatatis. Et confirmatur, quia simile videtur de rebus, quæ sunt tales actualiter, & de iis, quæ sunt tales in potentia, vel quæ tales in potentia appellantur, sed nulla res actualiter calida in aliquo gradu potest respectu diuersarum rerū in aliquo gradu esse; ergo sic erit de illis. Veniamus ergo ad id, quod in hac inuestigatione credimus esse verum, in hoc aliquas determinando conclusiones. Prima conclusio est opinio supra posita, quòd medicinæ illæ, quæ tales in potentia cōiter appellantur, sunt tales virtualiter & actualiter, & hæc supra est declarata. Secunda cōclusio est, quòd si aliqua medicina verè est alicui corpori temperata, ita quòd purè per suam virtualement qualitatem habet illud corpus in sua complexione cōseruare, & nullo modo transmutare, ipsa sibi multoties reiterata, vel in quantitate quacunque adaucta, prædictum corpus solum habet cōseruare, & non transmutare, & non è conuerso; quia solum illa medicina alicui corpori verè esset temperata, qua ipsum non transmutat, sed cōseruat quantumcunque reciperetur, vel in quantitate augeatur, & iteretur. Prædicta ergo conclusio de transmutatione, quæ procederet à qualitate, vel forma virtuali, per quam medicina dicitur talis, quia aliis

Thomæ de Garbo

viis, vt ex sola quantitate potest à quacunque re minima fieri transmutatio in corpore, vt de se notum est. Et hæc conclusio habet euidentiā per vnam propositionem famosam, quæ negari non potest: quòd illa, quæ sunt similia in forma, & in gradu, & hoc siue prædicta similitudo sit formalis, vel virtualis, non se transmutant. Nam cum passum factum est simile agenti, siue similitudo sit formalis, siue virtualis, non vltius procedit actio, aliter nunquam cessaret actio, & agēs posset plus producere, quàm habeat in virtute, quod est absurdum. Ex qua propositione patet prædicta conclusio, scilicet, quòd si medicina, quæ alicui corpori verè est temperata in secunda vice exhibita, vel tertia, vel quarta, & punctaliter inuenit corpus eiusdem dispositionis, qualis fuit in prima approximatione, sicut tunc non transmutat eum, ita nec secundo, & si non secundo, nec tertio, & sic successiue, quia aliter medicina prædicta primo approximata non pure conseruasset, sed transmutationem fecisset, & sic non fuisset verè temperata. Quòd autē ipsa in quantitate similiaucta, nō transmutet ipsum, patet, quia tunc augeret vltra, quàm habeat in virtute, sicut verbi gratia, si sit aliquid formaliter calidum in duobus gradibus in quacunque quantitate ipsum sit, cum perfectè sibi assimila uerit aliquod passum non aget vltius, & hoc per propositionem assumptam. Et sic in proposito, nisi forte diceretur, quòd ex dispositione paucitatis inducetur plus de forma, quàm esset in agente: sed tunc hoc non esset vbique, & vniuersaliter, nec per se ex parte agentis, quod modo in proposito inuestigamus. Diximus autem in conclusione de medicina temperata, si alicui aliqua medicina est verè temperata, quia de hoc dubium est. Tertia conclusio, quæ sequitur ex illa est,

De gradibus medicinarum 162

est, quòd quantitas aucta in medicinis non augeret gradum in medicina ipsa. Et de hoc non dubitat, nec auget gradum in effectu, nisi intelligatur per hunc modum quòd gradus aliquis potest induci à quantitate medicinæ maiori, quia à quantitate minori non inducebatur, verbi gratia, vna parua quantitas ignis non poterit vnā certam quantitatem aquæ ad sic intensum gradum caliditatis perducere, ad quam poterit perducere vna quantitas ignis maior, quia plus potest vincere resistentiam aquæ magna quantitas, quàm parua ignis. Iste tamen effectus inductus non est intensior qualitate in paruo igne existente, & similiter & virtualiter taliter. Et per istum modum intelligitur etiam propositio illa, quòd in maiori quantitate est maior virtus & non aliter. Quantitas enim agentis adaucta facit ad velociorem introductionem effectus, quod est per se notum. Ex qua conclusione patet, quòd firmum est dictum eorum, qui dicunt, quòd quantitas adaucta in medicinis, auget gradum in effectu supra gradum, qui est in medicina agente, sicut à multis communiter ponitur, vt patebit per vnā conclusionem, quæ ponetur. Quarta conclusio sequens ex his duabus est, quòd si aliqua medicina, vel aliquod agens per quantitatem adauctam, potest inducere gradum intensum, sicut aliud in quantitate minori exhibitum, quàm illud quod est exhibitum in quantitate minori, est intensioris gradus. Et hoc vel formaliter, si est tale formaliter, vel virtualiter, si est tale virtualiter. Et quòd prædictum illi in æquali quantitate exhibeatur, intensiorem gradum induceret. Ista patet intelligenti ex dictis, & hoc maxime cæteris paribus existentibus. Quinta conclusio manifestè sequens ex his est, quòd apud opinionem Galeni, & sequentium eum de

Y 4 redu-

Thomæ de Garbo

reductione medicinarum ad actum, qui ponit, quod
medicinæ calidæ postquam reductæ sunt ad actum, sunt
verè tales formaliter, quales dicuntur, ut in primo, vel
tertio gradu, &c. & similiter medicinæ frigidæ sunt
tales actualiter formaliter: oportet ponere, quod si
aliqua medicina, quæ respectu alicuius corporis poni-
tur esse in aliquo gradu, ut respectu temperati in pri-
mo gradu calida, vel frigida, potest per iterationem,
vel quantitatem auctam inducere intensiorem gradum,
ut secundum vel tertium, quod ipsa in se reducta ad
actum, vel actualiter talis existens sit intensius talis
gradus, in comparatione ad prædictum corpus, qua-
lem inducere potest. Istud patet expresse intuenti se-
cundam conclusionem, verbi gratia, Stichados poni-
tur in medicina calida in primo, si per multam quan-
titem potest calefacere ultra primum gradum, ut po-
nunt auctores, ut verbi gratia, in secundo, sequitur,
quod cum ipsa erit reducta ad actum, ipsa in se habeat
secundum gradum caloris, & sic tertium si posset in
tertio calefacere. Et sic de medicina frigida, quæ actua-
liter ponitur esse frigida. Et similiter etiam oportet
secundum nostram opinionem positam, quod medici-
næ sint tales actualiter virtualiter ponere, & quamli-
bet medicinam talem, vel talem gradum causantem per
quantitatem auctam, vel iterationem talis vel talis gra-
dus virtualiter, quia quantum ad hoc non est diuersi-
tas: Ex quibus infero, quod auctores ponentes gradus in
medicinis, quod non potuerunt cognitionem huius habere,
nisi ex effectu secundum diuersas alterationes à di-
uersis medicinis in corpore factis, in determinatis quan-
titatibus exhibitis, in eis assignauerunt gradus. Et
licet in medicinis alteratiuis in propriis capitibus do-
ses determinatas non posuerunt, quia in transgressio-
ne

De gradibus medicinarum 163

ne in eis plus vel minus, non multus est error, de quo sit curandum. Et hoc tali determinationi non contradicit, si bene perpendis medicinam aliquam, ut primi gradus esse in se qualitatis, aut virtutis intensiue gradus secundi, quia tamen in tali dosi, qua experta fuit, non calefacit ultra primum gradum ab eis fuit reposita primi gradus & non secundi, & alia secundi & non tertii, & sic de aliis; Et hoc quia, ut iam dictum est, non fuerunt prædicti gradus in eis assignati, nisi à diuersis effectibus in nobis causatis ab eis in certis & determinatis dosibus. Nam de qualitate in eis subiectiue existente, aliter determinatam doctrinam non poterant ponere. Nam licet medicina aliqua, quæ posita est primi gradus, in se formaliter vel virtualiter habeat qualitatem intensiorem, non tamen sic eam habet intensam, sicut illa quæ ponitur secundi gradus, nec illa secundi, sicut illa quæ tertii. Et propter hoc tibi manifeste apparet causa, quia sæpe de vna medicina cadit diuersitas inter auctores, ut vnus dicat eam primi gradus, alter secundi. Ex quibus, si perpendis, potest saluari dictum Plusquamcommentatoris, scilicet, quod medicina vna potest dici in tali gradu, in comparatione ad omnem hominem in diuersa quantitate, & dosi administrata, quod ex dictis cuilibet est per se notum. Sexta conclusio est, quod medicina, quæ dicitur calida in comparatione ad corpus temperatum in primo gradu, quæ per additionem quantitatis, vel iterationem potest ipsum ultra primum gradum calefacere, non est medicina verè temperata, & conseruatiua in eodem corporis calidi in primo supra temperatum. Et hæc est statim ex dictis nota. Ex quo potest supra primum gradum calorem inducere. Ex qua conclusione patet, quod medicina temperata potest altero duorum modorum

rum

Thomæ de Garbo

rum intelligi. Vno modo de ea, quæ verè esset temperata, quæ ex sua complexione formali, vel virtuali habet corpus, cui est temperatum in eodem conseruare, & nullo modo ipsum transmutare. Alio modo de ea, quæ ex sui determinata dosi corpori exhibita, corpus non transmutat, quæ tamen in alia dosi, & aliter variata ipsum transmutaret. Et proprie inter tales illa temperata appellatur, quæ ipsum sic iterata potest parua transmutatione trāsmutare. Quæ autem manifestius temperata non dicitur, & similiter medicina primi gradus potest dici in gradu altero duorum, vel quia ex sui complexione formali, vel virtuali secundum diuersos modos opinandi habet talem vel talem gradum introducere, vel quia hoc solum habet in determinata quantitate, sicut dictum est de temperata medicina. Septima conclusio est, quòd diuersitas corporum inter se in calido vel frigido, & maxime sanorum non est similis diuersitati medicinarum inter se, immo prædicta diuersitas est multum paruæ latitudinis in cōparatione ad prædictam. Et patet hæc conclusio. Nam nulli dubium, quòd nullum est corpus, & maxime sanum, quantumcunq; distans à calore à corpore temperato, qui illud calefieret à gariofilo, signum est, quia quodlibet cuiuscunque cōditionis sit, ponat simul super linguam, sentit inflammationem, & mordicationem ex eo, & sic etiam in corpore toto. Et experientia plus hoc percipiet, qui calidioris est complexionis. Et tamen gariofilus ponitur in tertio, & ab aliquibus in secundo: ergo nullum corpus distat in calore à temperato in secundo vel tertio gradu, quia tunc ab illo non calefieret, sed conseruaretur. Similiter etiā medicina calida in secundo per quantitatem adauctam, & longam approximationem calefaceret omne corpus. Immo etiam de calido

De gradibus medicinarum 164

lido in primo sic approximata concedunt: Igitur nullum corpus sic est calidum, ut ipsa est formaliter apud tenentes opinionem, quod ipse sunt tales formaliter, vel non est sic calidum, ut ipsa est virtualiter apud opinionem nostram. Et patet istud expresse ex conclusionibus suprapositis, si bene perpendis. Ex ista conclusione sequitur conclusio octava, quæ est, quod nulla talis medicina, quæ per quantitatem auctam, vel multotiens approximata, potest calefacere quodlibet corpus in suo calore, aliquod corpus in suo calore remittit, vel infrigidat: immo quanto corpus est calidius, siue caliditate naturali, siue præter naturam, tãto in breviori tempore illud plus inflamat, quàm frigidum corpus. Hoc statim patet, quia prædicta in se calidior est, vel formaliter, vel virtualiter quolibet corpore. Igitur nullum infrigidat etiam in corpore illo, ubi minus habet de resistentia in breviori tempore plus de calore inducit, quàm est in corpore calido in comparatione ad frigidum. Et similiter per oppositum intelligitur hæc conclusio de medicinis frigidis. Nona conclusio ex dictis sequens est, quod licet aliquod corpus, etiam sanum sit tanti caloris, quanti est corpus temperatum, cum est calefactum à medicina in primo, immo etiam cum esset calefactum à medicina calida in secundo, ita quod tangendo utrunque apparent punctaliter ad tactum æqualiter calida. Ipsum tamen non est calidum, ut prædicta medicina est calida virtualiter secundum nostram opinionem, quod tamen oporteret concedere apud tenentes, quod medicina quæ calefacit corpus temperatum in primo, cum ipsa est reducta ad actum: ipsa est punctaliter calida, sicut corpus calefactum ab ea. Et per consequens prædicta non alteraret corpus quod punctaliter tantundem distaret à temperato, &
quan-

Thomæ de Garbo

quantumcunque in quantitate augeatur, siue etiam in longo tempore approximaretur. Et per prædictam opinionem oportet etiam concedere, quòd prædicta medicina exhibita corpori multum calefacto, vt caufonizanti, habet illud infrigidare, quod apud haberet plus inflammare: cum in eo sit valde parua dispositio ad inflammationem, & resistantiam ad inflādari, quanto est calidius factum sit continue plus abiecta, aut oportet eos concedere, quòd medicina calida, quæ per auctam quantitatem potest corpus calefacere cum est reducta ad actum, vel si est actualiter talis, ipsa sit in se valde plus calida, quàm sit caliditas quam inducit, & per consequens deuenire ad hoc, quòd ipsa approximata corpori valde plus calidiori, non habet illud infrigidare. Cum ipsi cōcedant, vt patet per Gentilem, quòd medicina primi gradus potest per quantitatem, vel longitudinem approximationis calefacere in tertio, præacerrimo vsque ad mortē perducere, & per consequens in quarto. Et ex hac conclusione patet etiam plus alia conclusio, quod manifeste est contra opinionem Galeni suprapositam, cum innititur exemplo vrinæ approximata homini existenti in thermis. Cum enim aqua calida perduxisset hominem ad calorem, in quo ipsa ponitur, esse non vltius eam calefaceret, quantumcunque longiori tempore approximaretur, vel in quacunque quantitate: & ideo reliquum est de medicinis, quæ tales sunt virtualiter, vt prædictum est. Decima conclusio etiam ex dictis sequens est, quòd medicinæ, quæ ab auctoribus reponuntur in gradibus, de quibus dicunt, quòd calida in primo habet sic corpus calefacere & calida in secundo sic etiam, nisi reiteretur, vel in quantitate augeatur, quia tunc aliter corpus transmutant, in gradibus reponuntur in comparatione ad omnem ho-

De gradibus medicinarum 165

hominem, & non solū ad temperatum. Cum iam deductum sit manifeste, quòd quælibet medicina calida, & sic de frigida cuiuscunque gradus ex sui virtute calefacere habeat omne corpus, siue naturaliter sit dispositum, siue præter naturam, immo plus quanto plus est calidum, et sic frigida plus quanto plus est frigidum: & licet vnus & eiusdem medicinæ calidæ, vel frigidæ, humidæ, vel siccæ in comparatione ad diuersa corpora naturaliter disposita, vel præter naturam, diuersa dicatur esse habitudo, quæ quidem diuersitas non facit diuersitatem in gradu, de qua modo loquimur, propter corpora ad inuicem non multum distare in comparatione ad distātiā medicinarum inter se, respectu corporum, vt declarauit tertia & prima cōclusio. Et istud fundamentum multum est in proposito notandum. Et prædicta diuersitas vnus medicinæ ad diuersa corpora æquiparatur ex quantitate diuersa, vt bene tetigit Plusquamcōmentator. Medicina etiam temperata ex sua virtuali complexione omni corpori dicitur temperata, quia nullum corpus calefacit medicina calida cuiuscunque gradus, nec aliquod infrigidat, sicut facit medicina frigida cuiuscunque gradus fuerit. Et si prædictæ medicinæ ad diuersa corpora sit æqualis diuersitas non variat latitudinem téperamenti in medicina propter paruam diuersitatem corporum inter se, in comparatione ad medicinas, vt dictum est, licet diuersitas multum magna appareat, corpora ipsa inter se solum comparando, & corporum diuersarum complexionū & æratum, & dispositionum, ipsa tamen multum parua existit in comparatione ad medicinas. Et ideo, quia medicinæ non calidæ, nec frigidæ etiam antequam reducantur ad actum, siue postquam sunt reductæ formaliter, quemadmodum corpora ipsa sunt, sed sunt agentia


Thomæ de Garbo

tia virtualiter habentia determinatas tales virtutes, & tales gradus, & respectu talis subiecti, & non alterius respectu. De virtutibus quarum, & gradibus, & operationibus notitiam perfectam habere non possumus per tactum, vt de iis, quæ sunt formaliter talia, sed experientia sola: quæ quidem si consideras manifeste cõformis est modo iam posito, plusquàm modo Galeni, vt per experientiam est contra eum allegatum. Et hoc patet. Nam auctores allegantes, & reponentes medicinas in gradibus, nullam mentionem faciunt de corpore temperato. Similiter etiam nulli dubium, quòd experientia de eis facta, vt plurimum non fuit in temperatis corporibus, cum illa paucissima reperiuntur & rarissima videntur, & in particularibus capitulis, & paucioribus, cum volunt medicinas etiã téperatas appproximare, easdem nominât medicinas, vt cum volût mitigare dolorem, non facientes diuersitatem diuersarum medicinarum secundum diuersa corpora. Et hoc dico de vere dolorem mitigantibus, quæ anodinæ medicinæ ab eis appellantur. Et ideo apud opinionem Plusquamcommentatoris sic determinatam pro vera tenemus. Et licet ipse confuse eam tangat, & non affirmet. Et attende ad hoc, quòd si perpēdis modo prædicto saluato, medicinæ possunt reponi in gradu, in comparatione ad hominem temperatum. Et hoc debet esse notum cuilibet, non tamen secundum modum positum in opinione Galeni, vt iam declaratum est. Huic autem inuestigationi restarent aliqua valde annexa declarare, quæ causa breuitatis omittimus: Vt utrũ sit reperire aliquam medicinam punctaliter alicui corpori temperatam, quæ ex sui complexione virtuali, nullomodo haberet illud corpus transmutare. Et quãtuncunque etiam in quantitate augeretur, vel multo-
riens

De gradibus medicinarum 166

tiens reiteraretur, quæ inuestigatio est satis difficilis, & huic proposito esset valde necessaria. Similiter etiam inuestigandum esset de comparatione medicinarum inter se, qualiter adinuicem se habeant transmutare, & habere. Et omnis perfecta comparatio medicinarum, & ad corpora inter se. De iis autem, aliàs dicemus, nobis gratiam Domino concedente. Huic autem Tractatui proposueramus annectere inuestigationem de alteratione diuersorum corporum eadem ægritudine ægrotantium, cui competant fortiora, an flegmatico, vel colerico eadem febre febricitantibus, in qua aliqua fortia dubia contra opinionem Galeni haberemus. Sed quia de hac materia latè scribemus in summa magna, quam actualiter disputantem super omnes partes medicinæ componimus, ideo hanc præfatam speculationem dimisimus. Et ego Thomas olim Dyni famosi Medici de Florentia de Garbo, hunc Tractatum composui in tertio anno nostræ lecturæ Flor. ordinariæ 1360. de mense Augusti, in diebus, in quibus exercitus Archiepiscopi Mediolanensis fuit circa ciuitatem Florentiam.

FINIS.



INDEX VXTA ALPHABETI

ordini ad legentium facilitarem
additus.

Diuiditur in duas partes a primam pagine par-
tem vero secundum indicat.

A

A ditio ad doses syruporum	fo. 88. 2
Aquæ dig. materiam colericam	fo. 2. b
Aquæ dig. materiam melanch.	fo. 3. 2
Aquæ dig. materiam phlegmat.	fo. 3. 2

C

C aput pri. de losi medicinarum	fo. 82. b
Caput secundum de digerent.	fo. 84. 2
Caput tertium de vnguentis & empla.	fo. 84. b
Côclusiones Bartholomei Mont. de do- sibus medic.	fo. 86. 2
Clysteres	fo. 12. b
Ceroti	fo. 14. b

D

D osis mannae	fo. 4. 2
Dosis castoreae	fo. 4. 2
Dosis scamoneae	fo. 4. 2
Dosis tamarindorum	fo. 4. b
Dosis alois	fo. 4. b
Dosis succi rosarum	fo. 4. b
Dosis agarici	fo. 4. b
Dosis turbith	fo. 4. b
Dosis colocynthidis	fo. 5. 2
Dosis emblicorum	fo. 5. 2

A Dosis

Index

Dosis bellericorum	fo. 5. a
Dosis euphorbii	fo. 5. a
Dosis hermodactylorum	fo. 5. a
Dosis succi cucu. asinini	fo. 5. a
Dosis serapini	fo. 5. a
Dosis oppoponacis	fo. 5. a
Dosis mesereon	fo. 5. b
Dosis lapidis lazuli	fo. 5. b
Dosis lapidis armeni	fo. 5. b
Dosis senæ	fo. 5. b
Dosis epithimi	fo. 6. a
De solutivis compositis cholerae	fo. 6. b
De solutivis comp. melancholiam	fo. 6. b
De missione sanguinis in morbo lateali	fo. 74. a
Difficile esse iustā medicamentorū quantitatē definire	fo. 100. a
De his quæ minori quātitate, sumēda sūnt	fo. 107. b
De dosi herbarū recentiu, vel siccarum	fo. 116. b
De florum necessaria quantitate	fo. 117. a
De fructuum mensura	fo. 117. a
De seminum dosi, seu quantitate	fo. 118. b
De frugibus, siue cerealibus	fo. 120. b
De leguminibus	fo. 121. a
De lignis, & corticibus	fo. 121. b
De cineribus	fo. 122. a
De dosi animalium, & partium eorum	fo. 122. b
De sanguine	fo. 124. a
De vrina	fo. 124. b
De sero lactis	fo. 125. a
De lacte	fo. 152. b
De coagulo, & butyro	fo. 126. a
De adipe, & seuo	fo. 126. a
De medulla	fo. 126. b
	De

Index

De resinis, & sibus	fo. 126. b
De oleis	fo. 127. b
De ceræ dosi	fo. 129. a
De aceto	fo. 129. b
De saccharo	fo. 129. b
De mellis quantitate	fo. 131. a
De sappa	fo. 132. a
De metallicis & mineralibus	fo. 132. a
De argento viuo & sublimato	fo. 132. b
De lapidibus	fo. 133. a
De terra	fo. 133. b
De quantitate laantiū medicamentorū tā simpliciū, quam compositorum	fo. 133. b
De dosi pilularum	fo. 136. b
De sirupis	fo. 136. b
De oxymelite	fo. 136. a
De pulueribus	fo. 136. b
De confectionibus	fo. 137. a
De trochiscis	fo. 137. b
De eclegmatis	fo. 138. b
De clysteribus	fo. 139. a
De antidotis, colicis, & arteriacis	fo. 139. b
De simpliciū medicamentorū collocaatione	fo. 140. a

E

E lect. calida confortantia caput	fo. 111. a
Elect. calida calefacientia splenem	fo. 111. a
Elect. calefacientia cor	fo. 111. a
Elect. calefacientia stomachum	fo. 111. a
Elect. calefacientia hep̄ar	fo. 111. b
Elect. calefacientia Matricem	fo. 111. b
Elect. calefa. iuncturas	fo. 111. b
Elect. infrigidantia pectus	fo. 111. b
A	Elect.

Index

Elect. infrigidantia cor	fo. 11. b
Elect. infrigidantia hepar	fo. 12. a
Elect. infrigidantia splenem	fo. 12. a
Elect. infrigidantia stomachum	fo. 12. a
Elect. infrigidantia iuncturas	fo. 12. a
Epithemata	fo. 14. a
Emplastra	fo. 15. a
Embrocationes & fomenta	fo. 15. a

F

F ebbris definitio	fo. 19. b
Febris ephemera	fo. 21. a
Febris putride	fo. 22. b
Febris tertiana	fo. 23. b
Febris tertiana continua	fo. 29. b
Febris tertiana notha	fo. 29. b
Febris caufonidis	fo. 32. a
Febris sanguinea	fo. 40. b
Febris quotidiana pura	fo. 42. b
Febris quotidiana continua	fo. 48. b
Febris epiala & liparia	fo. 49. a
Febris syncopalis humorosa	fo. 50. b
Febris syncopalis minuta	fo. 53. a
Febris diurna & nocturna	fo. 54. a
Febris quartana periodica	fo. 54. b
Febris quartana continua	fo. 57. b
Febris quintana, septena, & nonana	fo. 57. b
Febris hectica	fo. 58. b
Febris hectica senectutis	fo. 64. b
Febris pestilentialis	fo. 65. b
Febres compositæ	fo. 71. a
Febris hemitritæa	fo. 72. a

In

Index

I

In quibus meamētis magis religioſe
quantitas conſiderāda, & in quibus
minus fo. 104. b

M

Methodus ſan. ad tirunculos fo. 2. a
Medicinæ purg. coleram fo. 3. b
Medicinæ purg. hlegma fo. 5. b
Medicinæ purg. elancoliam fo. 5. b
Medicinæ ſolut. compoſitæ fo. 6. a
Medicinæ lenieres fo. 6. b
Medicinæ quibus commu. præſt. vtuntur fo. 7. a
Medicinæ compoſitæ ſol. phlegma fo. 8. b
Medicinæ compoſitæ ſolu. melanch. fo. 9. a
Medicinæ non ſuturæ fo. 10. a
Medicamentorum ſugendorum, vel minuendo
rum occaſio, vde petenda fo. 101. b

O

Oſeruatione onga, iuſtā medicamen-
torum præſcribendorum quantitatem
primū diſtinctam fuiſſe fo. 101 a

P

Potio Rhabarbari in infuſi. fo. 7. b
Potio rhabar. in ſubſt. fo. 7. b
Potio rhabar. in cura diſſenterie fo. 7. b
Potio rhab. alia in eadem cura fo. 8. a
Potio mirabo. in infuſione fo. 8. a
Potio mirabo. in ſubſtantia fo. 8. a
Potio familiaris & vſitata fo. 8. a
Potio alia vſitata fo. 8. b
Potio

Index

Potio agarici in infusione	fo. 8. b
Potio turbith in infusione	fo. 9. 2
Potio alia	fo. 9. 2
Pilule	fo. 9. b
Pilule coleram euacuantes	fo. 9. b
Pilule euacu. phlegma	fo. 9. b
Pilule euacu. melancholiam	fo. 10. 2

Q

Q uestio vtrum partus ante septimum mensem editus sit vitalis	fo. 18. 2
Quantitatem in medicamentis tampli cibus, quam compositis esse obseruanda	fo. 99. 2
Quando in medicamentis iusta proportio ne componendis, æqualitas miscelorum, vel inæqualitas seruari debeat	fo. 105. 2
Quæ quantitate, reliqua mendicamenta in compositione superare debeant	fo. 106. 2
Quibus mensuris, mensurarumq; nec ho die passim medicamenta præscribatur	fo. 109. b
Qua quantitate radices in quibuslibet re- mediorum formis præscribantur	fo. 112. 2

S


S yrup. dige. materiam cholericam	fo. 2. 2
Syrup. dige. materiam melach.	fo. 2. b
Syrup. dige. mater. phleg.	fo. 3. 2
Solut. composita coleræ	fo. 6. b
Solut. comp. melanch.	fo. 6. b


T

Trochisci	fo. 12. 2
Theriaces descriptio	fo. 142. 2

V

Vaguenta	fo. 14. 2
----------	-----------





266
Medica
(100)

pet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100